

2.
P H A R M A -

C O P O E Æ, I A C O -

B I S Y L V I I M E D I -

ci Libri tres, his, qui artem

Medicam, & Pharma-

copœâ tractant exer-

cētque, maximè

necessarij.

INDICE copiosissimo, quo quidem
lucusq; caruit, adiecto.

R E M M A X I M A M S I B I




P R O M I T T I T P R V D E N T I A .

L V G D V N I ,

A P V D G V L I E L . R O V I L L I V M .

M . D . X L V I I I .







T RECTE est uete-
 rum sermone celebrata
 sententia. Quam quis-
 que nouit artem, hanc
 exerceat unā atque ex-
 colat, & totus in ea uer-
 seatur, sic rectè nūc pro-
 muniari posse mihi persuadeo, quā quisque exer-
 cere artem constituit, hanc accuratè prius perno-
 scat. Id quod si hodie diligentius obseruarent ho-
 mines, non tam multi repente fierent medici, nul-
 lādum medicinæ parte illis probè peruestigata,
 nullius adhuc morbi curatione apud præceptores
 obseruata. Cum tamen esset è re ipsorum: sed ma-
 gis etiam ærorum, si nūllum omnino affectum su-
 sciperent curandum, quem non antè obseruassent
 à præceptoribus curatum. Quam rectè cū ægris
 ageretur, si hac etate qui medicinam faciliunt,
 si essent antè sub præceptoribus insiliui i affectus
 cognoscere, illis occurrere, futura prænuntiare.
 Non mediūsfidū per hominum mortes, experi-
 menta sic agerent imperiti adhuc, & rerū omniū
 suarum rudes medici: tam quæstus auidi, ut quid
 eos deceat ignorent, quid famam perstringat ne-
 sciant, ut interim animæ detrimentum taceam.

Vbi enim medicus nescio quas præceptiunculas memoria didicerint, ac medicamentorum certas quasdam scripturas, se medicos profitentur. Illis est satis scire antidotū, catholicum uerbi gratia, humorum omnium redundantiam uacuare, cum ignorent, quibus, & quanta singulorum mensura constet, quæ singulorū sit facultas, quæ horū cum illis sic mistorū: eadēque in cæteris medicamentis cōpositis utuntur, ignoratiæ impostura. Quid per deum immortalē hoc hominis portento, se medicum mētiente, est reipublicæ pestilentius? quod nota censoria dignū magis est facinus? Cur leges cessatis in hos carnifices, ut meriti sunt, animaduertere? An nondum extant quæ hanc capitalem inscitiam puniant, & nouo uindictæ exēplo coercuant? aut si hæc peccādi licentia impunē permittitur, cur non modo ex typographorū prælis, sed omni omnium hominū ordine in medicinam non conuolatur? Sed Deus optime maximē nobis largire meliora, & indoctis his carnificibus ignorantie suæ consciētiam oppone, ut facinorū tam indignor in pœnitētia confusi, in ordinē suum redigantur. Iam ab hac arena explosis circulatoribus istis, rem medicā sincerē tractaturo nō soli pharmacopœo necessariū esse hanc medicine partem quæ simplicia deligit, ad compositionē præparat, & denique feliciter cōmisset, docere aggredior.

aim pharmacopœi fides tibi suspecta est, ue-
 que ob id ipsi simplicia deligenti, præparati, mi-
 ati, adesse, quid ex hoc studio emolumenti conse-
 re, nisi hæc tu ut ille pernoscas? imò quam tibi
 amie notam imprudens inuris, dum ignarus ho-
 in simplicium medicamentorum, tanquam asinus
 dā ad omnia eius rogata auribus motis uelut
 quis. Quid quod tibi sæpe etiā uolens pharma-
 ceus illudit, & mea sententia iustissime, dum co-
 i nucamentum pro pipere longo ostentat, dum
 taurij magni radicem pro rha pontico, dum
 rum palustrem nostrum pro Indico & uerò por-
 it, sed uitia hæc tolerabilia sunt. Pro Hellebo-
 autē nigro, Arabum napellum, aconiti genus
 busdā, hodie propè ab omnibus pharmacopœis
 stitui quis ferat? an non communis est utrique
 dicorum & aromaticorum ordini ignorantia &
 pa? Venia dignior est impostura, cum aristo-
 hiam clematitim nobis frequenter pro duabus
 js rarioribus supponunt: indignior cum scāmo-
 m crudū pro cocto miscent, aut largius quàm
 iptura medicamenti postulet, medicamenti im-
 scent, aut etiā cum alicuius ex tithymalis lac-
 scent pro scammonio. Que errata cæteraque
 nia in medicamentorum mistione committi soli-
 si uellem persequi, longior Iliade nostra proce-
 ret oratio. At ut donemus medico ad cõponen-

dum nihil opus esse diligenti ista in simplicibus
 medicamentis deligendis, parandis, & miscendis
 exercitatione, iam pharmacopæo commissa: ad
 pernoscendum autem compositi uires, omnia hæc
 illi ad unguem sunt pernoscenda: si enim unius sim-
 plicis improbitas totam sæpè cõpositionē uitiat,
 ut abundè in methodo medicamenta cõponendi
 docuimus, an parui esse tibi debet singulorū sim-
 plicium delectus, si item præparationis ratio sim-
 plicium uires auget, minuit, abolet, nouas acqui-
 rit, ut libro secundo explicauimus: quã tu horum
 ignarus facultatem toti medicamēto tribues? Si
 denique mistionis modus ex eadem materia un-
 guentum, ceratum, emplastrum efficiat an tibi
 est negligendus? Crede mihi absurdissimus est, ac
 sæpè ridiculus, qui medicinam facit, harū rerum
 ignarus, non dico quoties medici imperiti enume-
 rata simplicium turba subscribāt, fiat emplastrū,
 uel aliud, cum tamen ad hanc medicamenti for-
 mam scripta illa simplicia nunquã ueniant. Quæ
 res medicum pharmacopæo ignorantiæ suspectum
 meritò reddit. Præterea multos me uidisse tam
 harum rerū imperitos, ut cum in officinas diuer-
 tissent pharmacopæorū, non modo simplicia usu
 ipsis quotidiano celebrata non agnouisse, sed ne-
 que composita medicamēta illis propè continen-
 ter in ore & calamo uersata nouisse mollia ne
 esse

nt, an solida, an non, id est ignorantia rerum
 imè necessariarum crassissima? Quam ne
 ut plerique à medici dignitate alienum pu-
 in medicamentarias officinas diuertere, ibi
 uidin sedere, quæ cõponuntur obseruare, quæ
 etudo, ut in Gallia Narbonësi est antiquis-
 utinam hîc saltem nunc inciperet ac proce-
 t, spectarent medici quàm sædè frequenter la-
 ur ob compositorum iniquitatẽ, & fortasse
 igitate, si sciëntia id minimè possent sua, in-
 os, aut improbos pharmacopæos à parua cõ-
 ione deterrent. Hæc prolixius à me scri-
 quàm rei natura postulet, fortasse ineptus
 is calumniabitur: cùm tamen res ipsa lon-
 nam efflagitet orationem, quæ profligata
 orum ignorantia, omnes medici nomine di-
 dos in id studium impellere posset, ne post-
 sset accusationi locus. Faxit Deus, ut quis-
 quam exercet artem pernoscat, & medicus
 eorum ignoret, quæ ad morbos citò & tutò
 ndos utilia, uel necessaria esse consueuerunt.
 rò medicũ omnia hæc intelligere oportet, nõ
 opus pharmacopæorum euadat (nisi si quan-
 rum desyderio cogatur aliquid huius artis
 ri) sed ut componenti pharmacopæo possit
 modò adesse, sed etiam præesse, nec huius
 plinæ ignarus quotidie describat simplicia

que in emplastrum cogi iubeat, cum ex his quid-
uis potius quàm emplastrum perfici queat, quo-
modo cum amphora caput formari, currente ro-
ta cur urceus exit?

*Viue, uale lector, siquid scis rectius istis,
Candidus imperti: si non, bis utere gratus.*

DE PHARMACOPŒI
officio.

QUANTQVAM plurima cum medico
habet cōmunia pharmacopœus, pruden-
tiam natura insitam, medicamētorum absolutam
cognitionem, diligentiam in his omnibus que
suarum sunt partium maximam, probitatem: ta-
men non pauca ipsi propemodum propria uiden-
tur, que tamen aliquando & medicorum fuerūt
cum ipsi medicamenta parabant, id quod Gale-
num fecisse passim scripta ipsius loquuntur. Eius
generis sunt medicamentorum delectus, ratione
& experientia summa quasitus: deinde seruandi
hæc modus, & tempus quo uigent, aut iam uiri-
bus effæta sunt ac exenimata. Item qua ratione
unumquodque sit utendum, siue illud, ipsum per
se, siue cum alijs coquendo & terendo, uel alia ra-
tione præparando. Sit præterea doctus gramma-
ticam, ut compositiones ueterum, & scripturas
med

icorum quotidianas intelligat, in quibus si
 interdum biscripserint largius aut parcius,
 ingratius quàm agro huic competere conie-
 pharmacopæus, medicum amicè admoneat.
 umus præterea pharmacopæum artē omnē
 icamenta deligendi, præparandi, & compo-
 di callere, cultu mediocri contentum, hila-
 facetum, diligentem in rem ægrorum: non
 rum, non libidinosum, non ebriosum, non con-
 iosum. Quæ iterum illi cum medico sunt cõ-
 ia, ut Hippocrates docuit libro de medici-
 io. Quibus animi & corporis, & fortunæ do-
 s si præditus erit pharmacopæus, nihil incon-
 o medico perito, cuiquam propinabit, præfer-
 magnarum uirium, sed neque quamuius par-
 um, cum horum uires nesciat: & plerunque
 ilia, hæc quamuis, ut uidetur, imbecilla, ta-
 quantitate, qualitate, tempore insalubria,
 gnorum sæpè morborum sunt occasio, & legi-
 am curandi rationem peruerunt, dum sub-
 uratum corpus remedia iam maiora, sed ido-
 non feret. Nihil etiam uel amore, uel odio,
 metu, uel pretio, uel ignorantia peccabit: ne-
 uenena abortum facientia, exoleta, adulte-
 a, aut suppositiua unquam exhibebit: sed me-
 um doctum consulat quodnam simplex, aut
 positum illius pænuria uolet substitui. Non

augebit medicamento alicuius ualentis quanti-
 tatem, ut uacuatione hinc largiore sequuta di-
 catur medicamenta habere præstantiora. Quam
 uellem huius ætatis pharmacopœos ad hanc se
 uelut canonem conformare, & medicos ad suum:
 Non esset cur hodie tam neglecta iaceret medi-
 cina, etiam multorum probris lacerata. Deum
 optimum maximum supplex oro, & obtestor, ut
 aliquando id studium in mentes medicorum &
 pharmacopœorū immittat, ut esse quisque quàm
 uideri aut dici malit optimus, uel medicus, uel
 pharmacopœus. Quod si diuinam illam gratiam
 neglexerint, faxit Deus, ut regia censura in
 eos aliquando animaduertatur, qui ar-
 tem prius exercent quàm pernoue-
 rint, hominum corpori tam sa-
 lubrem, cùm rectè obitur:
 tam insalubrē & per-
 niciosam, cùm in-
 scienter tra-
 ctatur.

E M E D I C A -
 ENTORVM SIM-
 LICIVM DELECTV
 RITE FACIENDO,
 LIBER PRI-
 MVS.



vos tres libros his
 mensibus proximis
 sum pollicitus ad mo-
 dū rectè medicamen-
 ta componendi perti-
 nentes, præstare ag-
 gredior. Primum sci-
 licet, de accurato me-
 entorum simplicium delectu: Alte-
 de legitima ipsorum præparatione:
 emum, de modo miscendi medicamē-
 nponi idonea. Quod verò ad primum
 em mihi propositum attinet, quan-
 rectè à Mesuæ tradita est methodus
 aimenta purgātia deligēdi, & quam fa-
 alia quoque medicamēta deligenda
 erre possit lector non indoctus: tamē
 visum mihi est eā methodū illustra-
 laniozem reddere locis aliquot com-
 us, à Mesue post Dioscoridē, & Gale-
 bseruatis, nostro autem cōmentario
 lat

latius effusis : quanquam & à me non pauca in hanc rem sunt dicta initio methodi medicamenta componendi : sed tamen quæ nunc trademus, neque bis dicta, neque ociosa facillè intelliges, si ea legeris attentius. Delectus itaque medicamentorum simplicium, ut aliarum rerum plurimarum præcipuæ sumitur ab ipsorum substantia, quantitate, qualitate, actione, situ, & tempore. Quædam enim ipsorum præstantiora sunt, si crassæ sint substantiæ: alia, tenuis: nonnulla, densæ: alia, raræ. Sunt quæ magis leuitas commendet, quædam grauitas. Nec desunt quæ friabilia magis probamus, alia fractu & puluere tu contumacia. Adhæc glutinosa quædam, alia fluxilia. Aspera item nonnulla præponimus, alia læuia. Postremò hæc mollia aliis præstantiora, illa verò dura iudicamus. Hæc enim propria qualitatum tactilium nomina substantiæ per se incomprehensibili & indicibili tribuuntur, quòd eius crassamentum & ex elementis mixtionē primæ sequuntur, & omnium post sapes (qui etiam ad has referri possunt, cum gustatus quoq; Aristoteli & Galeno quidā tactus sit) maximè demonstrant. Ad eandē plenius declarandam nõ leuiter conferunt sinceritas, impuritas : hepatis, ferri, aliarumq; rerum nobis notarum, in substantia similitudo. Prætereà substantiæ

icis in vnoquoque, si obseruari queat,
ia, penuria, mediocritas.

Quid autem hæc nomina qualitatum ra-
tum medico significant, licet abundè sit
dicatum libro secundo nostræ methodi
dicamenta componendi, hoc loco tamè
dispersstingere non fuerit alienum.

Crassum seu *παχυμερὲς*, quod ægrè in te *Lib. 10.*
s partes comminui potest. *simp. ca. 3.*

Tenuè seu *λεπτομερὲς*, quod facilè in par-
tues comminui potest, quod in siccis
ificat in puluerem tenuissimũ: in liqui-
erò, quod pròptè latius se spargit, & cor-
quáqua uersum citò imbuat, ipsumq; ve-
vanescit, vt aqua vitæ, oleum terebinti-
& oleum ipsum aquæ colatum.

Densum proprie quod poros, id est mea-
paruos per se totum habet.

Rarum propriè quod poros per se totum *Lib. 2.*
et magnos. *sanit.*

Densum per metaphoram & abusiue est *tuende.*
ctum in se, vt aqua, terra. Rarũ verò est
ũ, vt ignis, aër, quanquam hæc elementa
vnta, & ex similitibus natura, partibus
stent, nec vllos tales poros habeant.

Graue quod mole exigua, pondus ma-
m exhibet nobis, vel stateris, qualia sunt
uea, terrea præsertim densa.

Leue quod mole etiam magna pondus
ex

*Lib. II.
Meth.*

exiguum præstat nobis, vel stateris: vt igneū & acreum corpus, præfertim rarum. Aqua autē quæ cito calefit aut refrigeratur, Hippocrati leuissima dicitur: non tantum propriè vt definiuimus, sed etiam per abusum, quod hypochondriis non sit grauis, nec in his diu immoretur ob essentiaē tenuitatem: quæ facit vt cito alteretur. promptè in corpus distribuatur.

*Lib. 7.
Meth. in
melle.*

Γλαχρόν, id est, lentū & glutinosum in solidis corporibus quod fractu est contumax, humore partes terreas glutinante multò, & tūctioni cedēte, vt in sparto, salice, cornis, tendonibus, ligamētis, quæ tusa lateſcūt magis. Friabile quod promptè friatur, & in puluerem abit, etiam digitorum compressu, vt amyllum, cerussa, caphura.

*Lib. II.
Meth.*

Lentum autem in humidis est quicquid ægrè dissolubile adhæret, seu quod dū trahitur, aut digito vel alio tollitur, continuitatē longissimè seruat: non intercisum, nec abruptum, vt oleum, mel, adipēs, pituita.

ῥυτίκον, id est, detergēs, quod tantū abest vt adhæreat, vt etiam quæ adhærent detergeat. Alibi autem in Methodo, ipsi glutinoso in humidis opponit Galenus fluxile & liquidum. Asperum non solum tactu inæquale, sed etiā gustatu partes inæqualiter siccat, cōtrahens, humore terreo integens: qu

le acerbum, austerū, lene, lubricum, &
uale, in humidis verò quod linguæ, fau-
n, asperæ arteriæ, dētiū inæqualitatem
igit, vel replendo, vel modice tergēdo,
axando: quale dulce & vinctuosum.
solle quod cedit nostræ carni, Durū cui
t nostræ caro. De vtroque plura lib. 2.
t. tuenda, & lib. 5. simp. cap. 4.
d crassum reducitur terreū, lapidosum,
osum, astringens, epatum, crudum.
d tenue, aëreum, igneum, coctum, vstū,
rum, acre, per lucidum.
d densum, solidum, coactum, compa-
n, vnitum.
d ratum, laxum, fungosum, solutum.
d graue, plenum, dilentū: & si vis den-
succulentum, bene habitum, probè nu-
m.
d leue, iuane foraminulentum, fungo-
rugosum: & si vis ratum, exuccum, ema-
m, marcidunt.
d glutinosum, pingue, gummosum, resi-
m, mucosum, tenax, sibi fluendo con-
m.
d fluxile, liquidum pinguis expers.
d laxæ seu lenæ & politū, vel foris tan-
enode, spinis carens, depile, vel etiam
æ quale, sibi vbiq̃ue simile, homœome-
c simulate.

Ad

Ad asperum foris, spinis armatum, & his lōgis, breuibus, rectis, hamatis: hirsutū, lanuginosum, muscosū, capillatū. Vel etiā intus inæquale sibi, partibus quibusdā dissimile, anomœe mores ac dissimulare, grumosum.

Ad molle, tenerum, carnosum, succosum, fungosum, mucosum, pingue, lētum, & vitilium coriiq̃ue modo flexile, humidum.

Ad durum, firmum, osseum, lapidosum, lignosum, exuccum, solidum, aridum, friabile, rigidum, inflexile, fractu contumax, vegetum, adamantinum, refertur.

Secundo loco cum quantitas sit duplex multitudo & magnitudo, ab vtraque notæ etiam sumuntur: quibus intenti, hoc eligimus, illud reiicimus. Numerus enim singularis, dualis, multiplex, vel aliter pluralis, radices, stipites, ramos, folia, flores, fructus, semina, cortices, & reliquas plantarum partes, atque adeò plantas totas, vel optatiores reddit, vel contemptiores ac minus salubres, quod in colocynthide planta & fructu, & aliis quibusdam rectè Mesues commemorauit, & in multorum aliorū delectu clarè apparet, tum ex nostris simplicibus, tum ex hoc lib. i. Pharmacopœiæ.

Magnitudo autem latius patet, non modo quia magis ad deligendum pertinet, sed quia eius nomine interdum sola longitudo

ven

enit: vt Aph. vlt. lib. 2. Potest etiam latitudo sola intelligi, vel etiam sola profunditas: communquam longitudo simul & latitudo, vel longitudo & profunditas, vel latitudo & profunditas, vel tria simul: quo significatu ferè accipimus. Huc pertinet, quod in horum singulis contrarietas est, ratioq; maioris & minoris in infinitum extenditur, & longum, breue, latum, angustum, profundum, elatum, symmetrio sui generis collatum, aliud magis & minus alio dicitur, idque paulò vel multò magis vel minus. Et inter hæc contraria, præter dicta, est mediocritas quædam indiuisibilis, alia maioris & minoris ratione diuidua.

Ad huius loci communis vastitatem pertinent nomina mēsurarum nobis notarum, digiti, & eius parui, maximi, medii, pollicis, palmi, dodrantis, pedis, cubiti, & aliorum plurimorum. Hinc dicimus deligendum hoc illud vel fugiendum, quod magnum est, enorme, procerum, vastum, corpulentum, bene habitum, exiguum, gracile, strigosum, rugosum, marcidum, (nam hæc etiam quantitatem consignant (& item quod est præditum magnitudine digiti, pollicis humani, manus, palmi, dodrantis, pedis, semipedis, dimidii cubiti, cubiti vnius, duorum, trium, quatuor, quinque, seu digitali, pollicari, dodrantali,

pedali, semipedali, bipedali, tripedali, cubitali, bicubitali, tricubitali. In quo sermonis genere magnitudo lōgitudinē potius declarat, quanquā crassitiē & profunditatē significare possit: quatuor alterutra dum nobis apertius significanda est, exprimitur, vt humani digiti, parui, indicis, pollicis, cubiti, baculi, vnius, duorum, &c. vel digitali, pollicari, cubitali, &c. crassitie vel lōgitudine. Id quod in profunditate similiter facimus frequenter, vtranque dimensionem crassitieci nomine comprehendimus, dicentes, hoc tunc esse vsui, quando est crassitie digiti, pollicis, cubiti, baculi. Est quando altitudo quoque exprimitur, vt pro tensorum vtriusque hominis brachiorum altitudine est Solanum manicon Dios. & phoenix herba fedigitalis seu senum digitorum.

Eodē modo in contrariis, paruitate, breuitate, angustia & gracilitate, maioris & minoris ratio exercenda est.

Ex loco enim fertili plantæ & animalia; auctiora & pulchriora euadunt: eadem ob id vel deligenda vel interdum fugienda. Scillam nanque enormem (qualis terra feraci provenit) Galenus damnat: improbat & frigofam flacidamque: bene habitam verò, & magnitudine mediocrem commendat.

Qui autem locus communis in qualitate est,

notarum ad deligēda medicamēta neces-
 ſū est fœcūdisimus. Hinc probamus aut
 robamus medicamentū hoc, illud: cali-
 dū, frigidū: humidū, siccū: principio, me-
 fine: ordinis primi, secūdi, tertii, quarti.
 hæc, hac vel illa præditum facultate, se-
 da, tertia, & sapore, odore, colore, has
 litates primas consequentibus.

Sapore quidem vel nullo apparente, seu
 eo & fatuo, vel gustum astringente, seu
 acrobo austerove vel acido, vel dulci, vel
 styoso, vel nitroso seu salso, vel amaro,
 acro (ad quē feruidus linguam erodens,
 sticticus, id est, vrens reducitur: vt ad dulce
 illeus, suavis, iucūdu) vel ex horum qui-
 dam misto vt vinoso, medicato, vel rei
 cuius notæ vnicū saporem, & ob id insi-
 em, sed fere inexplicabilē nactæ, vt sapo-
 aloës, piperis: hoc illud est præstātius, vel
 terius. Sed dum sapore medicamenta ex-
 oras, præsertim acria, aromatica, amara,
 sa, ne gusta eodem tēpore multa, vt non
 imponat gustatoria qualitas linguæ ab
 tradita: quam tamē aqua pura gargariza-
 aut papyrus mansa delere putatur.

Odore verò, iucundo, suavi, bono, ingra- *Gal. lib. de*
 fœdo, tetro, acrobo, austero, acido (tot *nat. homi.*
 im sunt differētiæ odorū, quot saporum,
 d nominibus non designatæ) odore item

croci, bituminis, cucumeris, vel alterius cogniti, & odore eximio præditi, sed indicibili, & qui in ullam prædictarum differentiarum rectè conferri possit. Sic odore vinoso, aromatico, medicato, illud hoc commendante, iucundo. Hoc illud esse debet, non debet hoc grauitè odoratu, halitu, terram, hircum, picem, resinam pineam, bitumen, olente, viroso, aspero, est melius vel peius.

Colore denique nullo insigni, vel albo pallido, rufo, flauo, rubro, viridi, liuido, nigro, vel horum medio, vnde hoc illud *τρω-*

*Colorum
differentia
et in his
do gal. lib.
1. Criseon.*

λευκόν, ὑπὸ ἄχρον, ὑπὲρ ἰσρόν, ἰσρόξανθον & similia Græcis dicuntur, vt latinis subalbum, suppallidum, subrufum, subflauum vel albicans, pallescens, rubescens, flauescens, vel in album, pallidum, rufum, flauum, inclinans (vel ex horum quibusdam misto, vnde *χρυσάχρον, ὠχρόπιρρόν, ὠχρόξανθον, πικρόξανθον & similia* Græcis sæpè dicuntur: nobis ex albo pallidum, ex pallido rufum, vel in pallido flauum, ex rufo pallidum, vel pallidum in rufum, inclinans, vel cum rubore albescens, cinereus, ad ceruleum vergens, & similia. Sed id illustrius apparet in temotis coloribus quàm natura propinquis, hunc verò naturæ in coloribus propinquitatè ordo nobis Galenum lib. 1. cris. sequutis seruatus ostendit. Albo enim pallidus vt situ hic est proxim⁹,

sic

natura & aliis similiter.

Ad album verò reducitur color lacteus,
eius, fulgore & nitore alabaſtri.

Ad pallidum, cinereus, plumbeus, buxeus.
Ad ruſum, melinus. i. mali cydonii, fuluus,
lulus, igneus.

Ad flauum, aureus, luteus, croceus, diluti,
uæ croci color.

Ad rubrum, roſeus, ſanguineus, puniceus,
rpureus, vermiculus.

Ad viridem, herbaceus.

Ad liuidum cæruleus, glaucus, cæſius nō.
illis dictus, ferrugineus, & interdum cine-
is, plumbeus, buxeus, hæc enim ambigunt
in ſuis in artem medicam Galeni commē
is apertè demōſtrat Martin⁹ Akakia me-
cus longè doctiſſimus.

Ad nigrum tenebroſus, opacus, terreus, bi-
minofus, fuliginofus.

A figura quoq; nō leuis eſt ad medicamē
delectū cōiectura, quòd hæc ſint vtēda vel
tāda, quæ figura ſunt elegāti, ſpecioſa, cir-
cata ſeu rotunda & circulari, trigonia ſeu
quetra & triangula, quadrata, quadrangu-
la, multangula, mucronata ſeu acuta, obtu-
sa, recta, obliqua, tranſuerſa, ſolida, fiſtulo-
ſa, ſpōgioſa, multifida. Alia item figura, for-
ma, ſpecie, aſpectu, effigie, imagine, inodo, ri-
tu, oculi, oculi bubuli, capitis taurini, cernu

caprini, caudæ scorpionis, pulicis, ricini animalis, vitulinæ naris, citrorum polypi piscis, testiculorum canis, vel alterius, capillorum, linguæ, linguæ bubulæ, auriû maris, delphini, pennarum auis, geniculata raro, crebro fructicosa, iuncea, tuberosa, bulbosa, fibrosa, capacæa, pomi, pyri, cotonei, glandis, oliuæ.

Horum autem vel omnium vel plurimorum exempla postea leges frequentissima in particularium delectu, & in notis à similitudine sumendis.

Probantur prætereà aut reprobantur nunc similia, nunc dissimilia, vel inter se, & in aliqua plantarum specie, ut absinthium ponticum sit simile santonico: abrotonum mas, dissimile fœminæ.

Vt in aliquo genere superiore propinquo sumitur similitudo aut dissimilitudo qualitatum quarûdam prædictarum, atque adeò substantiæ & quantitatis, & actionis, ut in herbarum genere, absinthium seraphium est deligendum simile abrotano, sapore amaro, & foliorum habitu: vel in toto plantarum genere, ut chamædrys, camepitys herbe sunt similes quercui, pinui arboribus. Vel in genere diuerso, ut aloë optima sit similis hepatis: ascyri folium cribri modo foraminulentum, ambitu serratum urticæ foliû, illud
in

in arcum flectitur, vel anchoræ modo est,
 vel crescentis lunæ ritu incurvum: veneno-
 sum, gibbosum, dorso, elato: galeri, petasi,
 pileoli, lanceæ, lanceæ cuspidis, cultelli, se-
 curis, acetabuli, vasculi, calathi, disci, clypeo
 i, fusi, pali, clauæ, pistilli, iunci, festucarum,
 ceni, vitiliū modo formatū, inflexile, virga
 tum, velut lineis intersectū alarū cauis bi-
 nis pluribus, virgis arborescentibus specie
 capituli rotundi, verticillorum, pedū lecti,
 tellarum, tomentosa lanosaque pube obdu-
 citur dictamnū, bullæ in dipsaco spinosæ,
 los comicis personis hiantibus similis, radi-
 e hoc esse debet crebro geniculata vel ge-
 niculis duobus tribus crebris dissecta, turba-
 tum modo in se inuicem infartis radicibus,
 capitibus cōdyloꝝ modo tuberculis qui-
 busdam excrecentibus.

Horum nihil negligendū est ei, qui pro-
 è volet medicamenta simplicia deligere,
 quibus singulis aliqua ex dictis insunt accō-
 modatissima ad ipsa cognoscenda & deli-
 genda non mediocriter pertinentia, quod
 xēplis, quam verbis pluribus probare ma-
 ius erit operæ precium.

Quartò plantarum & aliorum simpli-
 um medicamentorum delectus sumendus
 est à situ & loco, non modo generali & re-
 gione, vt castoriū sit ponticum, cuminum,

Aethiopicum, glycyrrhiza cretica, sed etiā à particulari, in singulis regionibus, loco nēpe calido, frigido, humido, sicco, horum medio. Plantæ enim calidæ in locis calidis valentiores euadunt: præhumidæ locis siccioribus castigantur. Quæ ratio in animalibus quoque recipienda est. Sub loco autem & cælum, & flatus ventorum comprehendas oportet. Ob id ad locum calidum reducimus apricum, æstiuum, inter tropicos aut proximè ipsos, insolatum, qui in meridiem sit apertus austro perfletur, montes habeat septentrionibus obiectos, vt Galenus docet in secessu Tabiarum.

Ad frigidum vmbrosus, nemorosus: arboribus, sepibus, & aliis stirpibus confertus, quercetis, frutetis, dumetis defensus, muscosus, saxosus, montosus, opacus: parietibus, arboribus vel aliis: & item polo alterutri proximus, in parte Alpium aut Pyrenæi Septentrionem spectantē situs, niuosus, glacialis, aquis niuosis & glacialibus riguus, borea & aquilonibus perflatus, soli aduersus obiectu montium.

Ad humidū, quod in aquis viuit aut versatur, & ipsis dulcibus, salis, fluentibus, torrentibus, pigris, rapidis, stagnantibus, paludosis, paludibus æstate siccatis, lacubus, radicans, sine radice innatans, aut prope aquas
cal

eadem & scatebras, fontes, canales, fluuio-
rum ostia, alueos in conualle aquosa, loco
viliginofo, pratis, puteorū parietibus & mu-
ris aliis humentibus, saxi rofidis, stillicidiis,
fossis vrbium. Hinc fluuiales, maritimæ, præ-
tenses, aquaticæ plantæ aliis sui generis alio
loco educatis præstantiores sunt, vel dete-
rior pro varia ipsarum natura, & expetita
nobis earundem facultate.

Ad siccum, editus, montosus, tumulosus,
cliuosus, saxosus, petrosus, scrupulosus, to-
phaceus, pumicosus, salebrosus, fabulosus, a-
renosus, argillaceus, præruptus, scopulosus,
promotoriis altus, asper, tenuis sterilis, per-
flatilis, in semitis, viis, itineribus, in aggeri-
bus viarum & murorum, in ruderibus, &
ruinis, aut circa ruinarum rudera, domus in
parietibus, muris, murorum crenis & minis,
in tectis recentibus, vetustis. Quanquā ho-
rum quædam aliquando humectata esse pos-
sunt, vt petrae littorales, testæ piscium, qui-
bus muscus marinus innascitur.

Ad medium horum seu temperatum re-
ducitur locus regionū temperatarum, ver-
nus, & magna ex parte cāpestres, planus, pin-
guis, fœcundus, cultus: aruum, in segetibus,
tritico, hordeo, leguminibus, vinetis, hortis.

Ad locum item & situm connexo redu-
citur & vicinia. Plātæ enim maleficæ & ipsa

rum fructus sunt innocentiores, si multæ simul ex eodem loco venenosam, sed sibi familiarem substantiam trahant, & multi fructus malefici ex vna planta: ob id thymelæam, colocynthidem, scillā in loco aliquo solam rectè damnat Mesues, præfert quæ multas congeneres simul nutritas habet, & colocynthidis fructum si vnicus erit aut paucus improbat, numerosum præfert. Rationabile enim est, vt plantas benignas si paucae sint, vberiores succum benignum trahere, & ob id salubriores esse: sic maleficas venenosam loci malitiā exhaurire, & in se transferre: quem & largiorem & vehementiorem paucae, quàm multæ in se trahant necesse est. Sublimis quoque situs, infernus, dexter sinister, antiquus, posticus quidam est, sic misy, chalcitis, iory, situ diuersa, metallicam substantiam indicant & facultatem diuersam & tartarum in summo vase vinario melius, quam in lateribus, & cadmiabotryitis melior aliis, & pompholix, spodio præstantior: sic densi fructus quia conferti & compressi malè nutriuntur, malè coquuntur, malè dissipantur: contrarii, contrà: laxi enim & rari pertus plantarum, & animalium, vberius alimentum trahunt, ob id meliores sunt, si nobis salubre est id alimentum: peiores si in salubre, vt in colocynthide Mesues

obè docuit . Et plantarum partes humi
pentes rectis aliis meliores, vel contra: &
orbem circumacta radix, vel altera alteri
adens, vel sibi inuicem implexæ radices,
partes inuicem contactu inhaerentes, dissim-
plicitariae, profundæ . Cum verò tem-
peramentum medicamenti, vt aliorum, sic
est facultatis, & facultas actionis, & actio
est ipsius, vt docet Gale. lib. de faculta-
tibus. & lib. de vñ partium, quæ ex na-
turali cuiusque potentia, deligendi ratio
inueni potest, ea nobis ab actione tanquam
manifestiore sumitur. Ab actione igitur fa-
cultates, primas, secundas, tertias, quartas
consequente, delectus medicamentorum su-
muntur: estq; hæc nota maximarum virium.
Quoniam tamen de omni genere harum fa-
cultatum nobis abundè est dictum initio
lib. 2. nostræ methodi medicamēta compo-
nendi, necesse non puravi huc ascribere. Ha-
c autem differentiarum & notarum, vel
maximarum, vel omnium, vel saltem qua-
dam, in singulis simplicibus medicamen-
tis exempla plurima tibi Dioscorides suppe-
ditabit, non pauca Galenus, & qui post eum
de materia medica scripserunt.

Adde quòd vt tota substantia nobis ali-
mentum est familiare, sic plantis suum, quòd
est vt non omnis ferat omnia tellus, non
sol

solum quia calidior, frigidior humidior, siccior, aut per coniugationem, quam ipsius plantæ vel animalis naturæ conueniat: sed quia in ea alimentum plantæ & animali cognatum desideratur.

Nec tantum hæc in plantis totis, sed ipsarum partibus singulis sunt exploranda, (vt idem de animalibus, & ipsorum partibus, & terreis corporibus tibi persuadeas) quales sunt radices, trunci, caules, culmi, festucae, rami, virgæ, surculi, germina, fermenta, viticulae, adnata, capreoli, spinæ, cirri, pediculi, folia, flores, fructus, semina, siliquæ, vascula, capitula, calices, umbellæ, corymbi, comæ, spicæ, pappi, ligna, cortices, succi, liquores, lachrymæ gumosæ, & resinose, & si quæ sunt eiusmodi.

Quintò & vltimò tempus in deligendo medicamento multiplex obseruandum est, ætas scilicet, pars anni qua collecta sunt & reposita, ænis constitutio serena, pluuia, ventosa: his viuentibus aut repositis: pars diei varia: duratio & seruatio longa breuis. Quæ alia tempus indicent diximus lib. 2. nostræ methodi.

Virtus enim alia, vt & temperatura, est neophytis & teneris: alia adultis & senescentibus, vis item alia euphorbio recens collecto, atque alia veterato. Plantæ item calidæ,

da, sicca, si aër sit calidus, succus, sunt meliores. Ob id plantas Italicas aromaticas Cre-
ticis non cedere dicit Galenus, si aëre non
fuerint pluuio educata. In singulis tamen
partes deligenda sunt, omnium prestantissi-
mae & maximè medicamentosae, si his viri-
bus egetur. Est enim quando ignobiliori-
bus & imbecillioribus est opus, ob affectus
aëri, aëris naturam. Præstantissimæ verò,
tum ex prædictis conditionibus, tum ex his
quæ in singulis particulatim dicenda sunt
coniectantur, ratione eadem quæ in plan-
tis dicta est, in animalibus quoque & corpo-
ribus terreis seruata. De tēpore verò colle-
ctiōis Dioscoridis verba hæc sunt: Imprimis
curandum est, vt quæ in vsum reponenda
sunt medicamenta, suis temporibus singula
demetantur. Ex hoc enim fit, vt quædam vi-
ribus magis valeant, alia sint inefficacia. Pri-
mum itaque cælo sereno plantæ legantur.
Magni enim refert inter colligendum, si, vel
qualores & siccitates, vel imbres infestent,
quemadmodū si loca quibus hæc prodeunt
sint montana, excelsa, perflata, frigida, sicca.
In his enim locis vires habent longè valen-
tiores: contrā verò quæ in campestribus, ri-
guis, opacis, cæterisque locis à vento silen-
tibus, plarunquæ degenerant, & minus va-
lent viribus, præsertim si nō suo tempore le-

gantur, vel vitiata, & præ imbecillitate languentia, ignorandum nanque non est, multa pro soli & cæli natura ac tēperie, citius aut tardius adolescere: nōnulla vi propria, etiā hieme frondere & florere. Sciendum prætereā est, quædam in herbaceis medicamentis, vt veratrum vtrunque, multis edurare annis: alia post trinitum inutilia. Quæ verò herbæ sunt fruticosæ vt stœcas, trixago, polium, abrotanum, seriphium, absinthium, hyssopum, & alia id genus; dum semine prægnantia sunt, demetenda. Flores verò antequam sponte sua decidant. Fructus autem dum maturi sunt, vt semina dum ficcari cœperunt, priusquam defluant, herbarum & foliorum succos elicies, cum primum cauliculi germinant. Lac & lachrymæ excipiuntur caule inciso per summum adolescentiæ vigorem. Radices & liquamenta corticesque ad recondendum eximantur, cum primum herbæ suis foliis exuuntur. Si puræ sunt & nitidæ, siccentur & reponantur loco non vliginoso: quæ autem terreno aut luto sunt sordidæ, aqua prius abluantur. Flores, & omnia iucundum odorem reddentia, articulis tiliaceis ædium parte siccissima reponantur. Est quando chartarum inuolucris & folliculis suis semina vtilius & innocentius seruantur. Liquidis medicamentis densior

rior materia, argentea, vitrea, cornea conuenit: fictilis etiam modo rara non fit: & lignea, præsertim è buxo: ænea verò vasa oculariis medicamentis, & liquidis, & his omnibus quæ aceto, pice liquida, aut cedria cõponuntur. Adipem autem & medullas stanneis vasis, seu plumbo albo recondi conuenit. Hæc Diosc.

Finè labori propositio imponemus, vbi ocū Mesuæ, quo quædam medicamēta purgantia cælo & solo simili meliora euadere scribit, sed sine exēplis explicauerimus: sumpta ab animalibus analogia. Nā vt animalū naturæ, hoc est téperaturæ, & ætates, & mori calidiores ad hiemem, regionem frigidā, & victum refrigerantē, tanquam contrario excessu frigido, illorum caliditatem, & modicam corrigentia præsidia bene se habent, ad æstatē verò, regionem calidam, & victum calefacientem, seu intemperaturam agentes causas, malè: & contrà naturæ, ætatis, morbi frigidiores, ad æstatem calidam, & victum calefaciētem, benè se habent, quod ab his contrariis illorum attenuato recessus corrigatur, malè verò ad hiemem, regionem frigidam, victum refrigerantem, tanquam affectus illos propter similitudinem aucturas causas, & simili ratio humidiora hæc ad causas siccantēs & siccio

ciora ad humectantes melius habent: sic planè in plantis apparet, quibus vt animalibus insitum est alimento familiari nutriri, quibusque vt animalibus consueta victus ratio naturam seruat, si est victus illarum naturæ similis, aut nouam facit, si dissimilis. Ob id plantæ intemperatiores, id est, calidiores, frigidiores, humidiores, sicciores, solo & cælo & alimento ipsis contrario emendantur, & ad temperaturam mediam, quoad fieri potest, inclinant: nisi quas multum calidas, frigidas, humidas, siccas expetimus, tales enim solum & cælum & alimentum simile conseruant: mirum ni etiam intendant. Quæ verò animalium temperatura est omnium extremorum media, iniuriisquæ omnibus omnium maximè resistit, illa similibus temperatis seruatur, quod Galenus dilucidè lib. prioribus sanitatis tuendæ demonstrauit. Sic plantæ temperatæ cælo & solo temperato conseruatæ, meliores euadunt, nisi ad effecta alia, has calidiores, frigidiores, humidiores, sicciores requiris. Tunc enim solo & cælo dissimili, & à sua natura temperata diuerso, hoc est, calidiore, si calidiores vis: frigidiore, si frigidiores: humidiore, si humidiores: sicciore, si sicciores expetis, emendantur: & calidæ siccæ calido sicco solo & cælo. Ob id Creticas plātas plurimas ad thiriacam, & ali

alia medicamenta, & Italicas si solum & cæ-
 lum sicca fuerint, præponit Galenus: tamen
 in his est quodam prodire tenus, sed non da-
 tur ultra. Nam eadē ex India aut Aethio-
 pia fuerint deteriores, licet illi tractus plan-
 tas quasdā habeāt eximias, vt Aethiopia cu-
 minum, Trogloditæ myrrham, India nar-
 dum & malabathrum, & alia plurima, quæ
 inde largo prouentu Lusitani navigationi-
 bus ad nos cōuehant. Quæ igitur ad metho-
 dum simplicia deligēdi pertinent: vbi ex lo-
 cis prius dictis memoria tenebis, eandem in
 particularibus ipsis exercere oportet, ordi-
 ne illo, quem in simplicibus seruauimus. De
 radicū itaque delectu primū dicāmus, in
 quibus vt aliis plantarum partibus, propter
 quod nostrates communem quandam
 eligendi rationem sustinent, de his etiam
 cōmuniter scribemus: de exoticis verò sin-
 gulatim, tū quod hæ sunt cariores, & ob id
 ex teris adulterari solitæ: tum quod hæ,
 in infrequentes magis, etiam exercitatos
 sunt.

Radices autē omnes incipiente foliorum *Tempus*
 fluuio legēdas, & cælo sereno, cēsuit Dio- *colligendi.*
 orides, cui in quibusdā Galenus & Auicen-
 na & Mesues cōsentiunt, in aliis diuersa sen-
 tiūt, vt post leges. Sunt cōtra quibus placet
 magis, radices esse legēdas priuūquā in cau-

lem, folia, florem, fructum, semen, vis plātæ propè tota erūpat. Defluentibus autē foliis, eas esse fœtis animalibus similes, hoc est, velut semianimes ac multū imbecillas, nisi si quæ tantū habebāt viriū, vt etiam earum satis retineāt arefacto caule, vt scilla, quō valida animalia etiā fœta adhuc robusta permanēt: nisi dicas etiā in illis quæ viva & vereri radice repullulāt, saluā vitālē plātā velut sanguinē per caulē priusquā areseat in radices, licet nō totū, refluere, vt in arboribus fit, alio quouis tempore colligi possunt, quæ hominum cultu & satione crebra in omnē anni partem vegetæ incidunt, quales ferè sunt hortenses, alimentosæ, vt apii. vulgaris, buglossi vtriusque; betæ, lactucæ, intibi, oxalidis, raphani, napi. pastinacæ, fislari, cari. panacis, cape, porri, allii: & præter has erraticæ, dauci, gingidii, caucalidis, ari, dracūculi, cyclamini. periclymeni, cotyledonis: nam hæ quinque, vt bulbosæ quædam, aliæ etiam æstate siccatis foliis, plenæ sunt, & frequenter autumnō regerminant, alimentum pinguis & crassi eopia.

Quæ verò folius naturæ sponte crescūt, aut semel à nobis tempestiue feruntur, aut plantantur, ferè sunt optimæ, solo aut vere, aut (vt dixi) autumnō, paucissimæ æstate, aut hieme. Quin & hæ quas multis anni parti-

bus.

bus communes diximus, sunt præstantiores
 cum tempestiue satæ adoleuerunt, & vigēt:
 aliis verò temporibus ignauiores, quando
 vt quadam & holitoris opera & irrigatione
 coguntur adolefcere, sub cælo sibi parua
 propitio: quale æstium est, ac autumnale,
 & hiemale. Sic vere ipso, quando primum
 germinare incipiunt, nobis leguntur in an-
 tum, enula, althæa, iris, acorus, symphytum,
 asparagus, petroselinum, apium, fœ-
 niculum, bryonia, cyperus, rubia, saxifraga,
 valeriana, eryngium, tormentilla, pæonia
 & trache, polypodium, gramen, lilium: nisi
 recentibus aliquādo sit opus, sed quæ omni-
 no erunt imbecilliores, quam si quo tem-
 pore recentes colligi debent, in vsum ve-
 ssent. Omnes tamen integræ sunt, si sic
 potest, vellendæ & vnaquæque in solo
 & cælo suæ naturæ familiari, quod expe-
 rientia confirmat. Nam tunc bene habitæ
 sunt, nec enormes ob alimenti copiam: nec
 rigosæ, & marcidæ & tenues, & rugosæ ob
 usdem inopiam. Mox aqua lauandæ sunt,
 & radicula purgandæ, multæ etiam eligandæ
 & quædam verò crassæ & magnæ etiam
 & taleolas secandæ, posthæc siccandæ in so-
 le, vëto, interdum igni, vt in ficcatione lib-
 dicemus, nisi recentes sint vtendæ. Igni au-
 tem præcipue siccantur, quando cælum est

nubilum, aut hiems, aut quando mox siccatis opus est. Adde, quòd in his & aliis plantarum partibus non solum tempus colligendi legitimum est obseruandum, quale multis radicibus est plenilunium natura humidissimum, sed etiam repositio commoda & duratio. Non enim sunt reponendę nisi exquisitè siccatae, ne putrescant: nec loco humido, puluerulento, non perflato, reponendae.

Radices supra tres annos non seruantur Auicennae. Quae enim crassae & densae substantiae sunt tandiu seruari possunt, vt radix bryoniae, rha pontici, peucedani, mei, aristolochiae. Quae verò tenui & rara constant substantia, vt asari, apii, petroselini, saxifragiae, dictamni, tormentillae quotannis sunt mutandae. Radices autem legendas cum folia cadunt, etiam censet Auic. canone. 2. & Platearius in Aristolochia. Quaedam tamen aliis temporibus saladino leguntur, vt veris fine, aut aestatis initio, acorus, gētiana: aut mense augusto quādo etiam spina alba, vulgo bedegar, ruscus, bryonia, cyperus, iris, enula cāpana, dictānus vulgaris, paeonia, glycyrrhiza, vt septembri peucedanum.

Octobri cyclaminus, recēs & ficcus efficax. Decembri eryngium iisdem leguntur.

Efficaces autem illae quoque seruantur annum vnum, paeonia vtraque, peucedanum.

Duo

Duos, meum, iris, cyperus, maior & minor
dictamnus.

Tres, acorus, chelidonium, enula, saxifra-
gia, valeriana, pyrethrum.

Decem, costus, cenanthe, rha ponticum.

Daucus autem asarum & alia radices multe
ecentes sunt meliores: recondita autem pro-
e omnia, quia sunt essentia tenuis, parum diu
eruantur efficacia, praesertim puluerata.

Asari radix ampla, spissa, odore tenui, sapo-
re acri, & parum astringente.

Eryngii radix eligenda ampla, alba, tenera, *Mesues in
simpl.*

Radix satyrii plena & recens, non flaccida *Idem ini-
tio Anti.*

EXOTICAE verò radices sic deligantur. *Ibidem.*

Cori radix similis ireos radici. i. complica- *Dios.*

in obliquum, geniculis intercepta, candi-
gu gustu acri, & modice amaro, odore iu-
ndo, calida, sicca ordine tertio, densa ple-
carie non exesa, qualis à Colchide & Ga-
tia affertur: quæ à quibusdam galanga ma-
r vocatur, quod sit vtraque crebro geni-
lata, & odore aromatico: sed hæc iridis
agnitudine, illa cyperi.

Vulgaris acorus huic diuersissimus tota
a natura, non usurpandus, nisi medicus ad re-
igerandum & siccandum imperauerit.
Quod si qua huius generis in locis sicciori-

bus educata & calidioribus naturam acori prædictam aliquid induerit, vtraque acorus esto, ille indicus, hic nostras imbecillior.

Dios. Gal. Agaricus foemininus rectis intus venarum
Mesues. discursibus constans, sapore initio dulci, mox amaro, tandem etiam subacri & subastringente, leuior, rarior, mollior, albior, breuior, friabilior, splendidior quam mas, in fracturis suis, filiosus neruorum modo. i. grauis, densus, durus, niger, lignosus, longus, interdum rotundus, sed vbiq; compactior & obscurior, superficie non densa, sed rara, tota foemininus prætereà, sed de vero & radice semiuiliginosa & semiputriginitur in Agaria Sarmatiæ regione, & inde appellatur: hodie ex albis metitur.

Hæc autē *ἐπιφάνεια*, id est, superficies seu facies summa seu cum Mesue pars superior quanuis tota vndique superficies intelligi possit, tamen quæ pro situ in arbore variior est, agarici pars superior, vti à Mesue rectissimè dicitur, eapotentior videtur, quia magis aërea, & ob id leuior rarior, &c. cum aëreū ob insitam leuitatem sursum feratur, vt in eodem terrenum & aqueum deorsum: siue autē ea pars superior sola, siue etiā tota eius superficies optima est non est nobis purgantibus agaricum excidenda & abicienda quorundam more. Nec ita superficiem ad viuū
 int

intellige, vt sola velut cuticula fit vtilis,
 sed illæ partes quæ subsunt quo ipsi optimæ
 sunt propiores, eo meliores.

Aristolochiæ clematidis longa radix no-
 bis est perfrequens, longa, rara, rotundæ
 verò in agro Nemausensi plurima, etiã hic
 crebrescit, Effodienda est messibus, & des-
 quamato terreno seruãda. Legendã vtranq;
 plenilunio, vt alias propè omnes quidã con-
 tendunt: sic enim pleniores cum sint, siccan-
 do minus flaccescunt, alio tempore lectis ma-
 gna sui parte siccando vaporantibus, & mar-
 escendentibus. Eligenda vtraque bene habi-
 ta, & si est sicca, minus alte rugis striata, car-
 ne multa, firma, odore & sapore vegeto, sed
 non puluerulenta dum frangitur, nec si-
 u obruta, nec carie aut terredinibus exesa.

Quæ bonitatis note reliquis propè planta-
 rum partibus sunt communes. Pontica autẽ

Cretica est præstantior. Behen accipian-

r Armenia, calida, humida, odora, rubra *Scrapio.*

potius quàm alba: quæ verò hodie in Ita. *Manar-*

a & prouincia in odoræ reperiuntur radi- *cus.*

cs, & pro behen supponuntur, vel aliæ sunt

Armeniis, vel saltem his minus efficaces.

arum loco placerent magis radices eryn-

i, Behen rubrum folio lapathi rotundi pro-

Burdegalam locis aquosis plurimum, ac

de in alias Galliæ partes transportatur;

album in Prouincia crebrius.

*Dios.
Gal.*

Bryoniae radix foris cineritia, intus albicans, ampla, consummata, colligatur veris initio.

Calamus aromaticus, calidus siccus, ordine secundo, partium nonnihil tenuium, fuluus, intus albicans, odore fragrantissimo, dense geniculatus arundinis modo, cætera mollis tactu, lentus in frangendo, cõfractus autem in assulas dissilit, non totum raphani modo rumpitur, fistula intus plena araneorum, casia gustu, leuiter astringens, & cum quadam, sed minima acrimonia amarus, in mandendo glutinosus, ex India deferitur, terredinibus facile tentatur. Qui verò in officinis est, nõ calamus, sed radix est, neque ea calami, sed plantæ alterius: neque ex India videtur afferri, quia vili venditur, & sæpè recēs multum cernitur. Ob id inter radices eum recensui, iustius inter ligna locandum: si verus habeatur, triennio seruatur.

*Dios.
Gal.*

Centaurii magni radix, acris, astringens, subdulcis, subamara, rubescens, crassa, grauis, solida, tripedalis (si integra est) succo prægnans dum recens est ex solo pingui & aprico Licyæ Peloponesi, & aliarum multarum regionum, annos decem seruatur. Radix autem centaurii parui, medicamentis est inefficax.

Ibidem.

Cof

Costus subamarus, modicè astringit, acer
 adeò & calidus vt viceret, candidus, levis,
 extrema odoris gratia recens, abunde plenus,
 densus, siccus, à terredinibus non exelus, Ara-
 bicus. Post hunc indicus, tertius in bonitate
 Syriacus, grauis, colore buxeus, odore fe-
 tiens. hodie Lugduni frequens est Arabi-
 cus, non tamen quem Arabici scriptores dul-
 cem & amarum soli inuexerunt. Costi nigri
 mentio fit Dios. in rha pontico.

Dracūculi radix legenda vere, aut æsta- *Mesues*
 is initio, ampla, cōpleta, ex loco libero, hec
 tiā nostras est, rarò externa huc cōuehitur.

Dictāni radix Dioscoridi calefacit, aliis
 olia magis celebrātur calida, odorata, rotū
 , parua, densa, lanugine vtrinque intecta.
 Cretica metitur æstate & autūno. Quæ ve-
 radix dictāni ab officinis supponitur al-
 ba, tenuis, elignata, propè inodora, minimū
 nara, nullo exiguo ve caloris sensu, pseu-
 do dictamni fuerit potius, aut herbæ nescio
 ius, qua abiecta, potius pulegio vtēdū est.

Doronicum, radix parua, foris subflaua, *Serapio*
 tus alba, dulcis, calamo aromatico similis
 colore & figura.

Helleborus albus radicib⁹ nititur multis, *Dios.*
 enuibus, ab oblongo & exiguo capite ex-
 antibus, caparum modò fibratis, optimæ
 ant cādidæ, friabiles, carnosæ, mediocriter

extentæ, nec iunci modo mucronatæ, nec in frangendo puluerem emittentes: suntq; medulla tenui, gustu feruente, nec tamē id vehementer, nec saliuā subinde ciens. Quæ enim confertim eam cōtrahunt, strangulant. Laudantur ex montibus & asperis, Cyrenaicæ, Galaticę verò & Cappadocię & Italæ sunt periculosiores. Omnis albus est periculosus Mesuæ, non item Græcis autoribus. Eidem minus acer & mordax, nec statim initio albus quam niger, sed amarior est ac diutius seruari potest quam niger, cætera nigro similis.

Mesues.

Cortex radicū fibrosarū, asari colore, fractu facilis, medius crassi tenuis, antiqui recētis, grauis & leuis, aut potius leuior quā grauior, legitur vere & estatæ Mes.

Diosco.

Helleborus niger radicibus coheret nigris tenuibus à capitulo capæ simili, cōfibratis, vt albus, quarum est vsus. Optimæ sunt corpulētæ, plenæ, in quibus sit tenuis medulla, acres gustu, & feruentes, in collibus asperis, & sitiētibus locis, vt Anticyra, Helycone, Parnaso, Aetolia. Addit Mesues fragiles, leues, asperitatisq; expertes, leuiiores quā grauiiores, tenuium & crassarum, recentiu & vetularum medias. Salubrior est albo, colligitur vere & æstate.

Mesues.

Esule minoris radicis cortex eligendus
ten

tenuis levis, fractu facilis, rubescens cassie fistule modo post sex accoletur menses, ex loco libero collecta initio veris. In fine veris autem, lac eius colligendum est.

Galanga est radix subrubra, vel rufa, geniculata, intorta, grauis, sapore acerrimo, linguam admodum vellicante, calida sicca gradu tertio, odore & figura quadam cyperi. Unde quibusdam cyperus Babylonicus dicitur, in dicta priscis, alba, odoris, & saporis gratia carens, puluerabilis multum abiicienda.

Gentiana notis tantum communibus niti- *Actua-*
tur, ex Iura monte in Gallias totas distri- *rius.*
buitur, colore foris buxco, intus crocante, *Serapio.*
amarissima (ob id aloë Gallica dicitur) dura, parum rugosa, fragili cotumax, in hortos Parisienses translata, minus efficax adolescit.

Glycyrrhiza quavis in Galliis passim lu- *Dios.*
criet, laudatur tamen Galeno magis Cretica, aut saltem Hispanica, vel ex locis aliis minus humidis: colore est foris buxco, ligno-
ento & fractu cotumaci, intus multum cro-
ceo, sitimque mansa extinguente, sapore sub-
cerbo, dulci, quibusdam melior est nigricans
& lenta, quam buxea & fragilis. Improbatur
intus alba vel nigra, exucca, vetus, fragilis
s raphani modo, & inter fragendum puluerem
dens: quæ nota in omni partem plantæ, si
præter naturam adest vetustatem prodit.

Herm

Hermodyctylus Mesuæ probatur radice rotunda, ampla, foris & intus multum alba, mediocriter dura, ex loco edito lecta, calida & sicca initio gradus secundi: laxa verò, rara, levis, est imbecilla: rubra & nigra, mala. Quæ in officinis est, affirmatur mihi ab his qui legerunt frequenter in Gallia Narbonensi & Prouincia, esse folio nigro, porraceo, flore per autumnum croci sine croco tamen, foris nigra radice: quæ res declarat esse colchicum, innoxium tamen aut saltem innocentius experimur: forte quia siccatum est, nisi recens nobis vsurpatur.

Iris illiryca veteribus propè sola laudatur, parua, densa, frangi contumax, subruffa, intus albior, amara, sternutamenta dum tunditur ciens, odorata. Florentina tamen sola nobis hodie inculcatur, cum Gallica alba purgata laudetur Galeno lib. 8. c. ph. part. Ex locis apricis & siccioribus Illiris lecta ad me missa Venetiis à Marti. Grego. medi. præstantissimo in horti mei partem editam, & soli meridiano apertâ trãlata, iam pulchrè repullulat. Mesuæ verò laudatur radix ampla, dura, densa, velut in nodos breues collecta, ex albo rubescēs, odore violæ nigræ aromatico sapore, acri & mordaci, flore purpureo potius quàm albo, veris initio collecta.

Nardi spica cūm radice dodrantali, digiti parui crassitudine, astringēte, subacri & leuiter amara, odorata, calida primò excessu, sicca secundò. Mihi Lugduno delata est à Ioanne Horneo Parisiis. Pharmacopœo lōgè peritissimo, & fidissimo, latinè doctissimo, Græcè & Hebraicè mediocriter instituto, cum costo acoro, & aliis non paucis.

Pyrethrū radice est longa, pollicari crassitudine, gustu feruidissimo & igneo, à quo uomē habet, quæ mansa pituitā largā elicit. *Dios.*

Polypodium radice dulci, austera, digiti parui magnitudine, multū siccante, sed sine morsu, probatur subdulce, subausterum, gustu ad postremum subamaro, & nonnihil aromatico, solidum, cirris seu nodis plenū, & rubro nigrescens, colore intus herbaceo istacii modo, recens, quercum & arborum liarum glandiferarū truncis innatum: aliis aurale & saxosum magis probatur, nisi loca sint vliginosa & vmbrosa. *Dios. Gal. Mesues.*

Rha ponticū radix nigra, costo nigro flos, cētaureo magno intus similis, sed minor, effior, fungosa & laxa, aliquātū leuis, sine odore, quæ mansa colorē reddit pallidū, ad oculū inclinātem, terredinibus non exesa. *Dios.* In quo præter hæc legit Serapio, astringēs, si plusculū mādatur, subacris, &c.

Rha indicum & proximum ipsi rhabar. *Raued.*
bar

sceni Me- barū, laudatur subnigrū in rubrū inclinans,
sue dici- graue pro raritate sua: contractū, ex rufo &
tur Gal. glauco alternat, & croci modò tingit, recēs,
anti. lib. I. nō adulteratū, astringēs amarū cholagagū
 calidū siccum ordine secūdo, seruatur annis
 tribus, quatuor, in psyllio milio vel oblitū
 cera sola, vel ea cum terrebinthina.

Scilla sit bonæ magnitudinis (nō tamen
 admodū magna & enormis) benè habita &
 nutrita, alba, recēs ex terra sumpta, cū folia
 eius & caulis exacte aruerint, seu quādo tri-
 ticū metūt, quia tūc potissimū viget. Huic
 pancratiū simile gustu & viribus, sed imbe-
 cillius. Mesuæ præfertur, quæ sapore est dul-
 ci, acri, amaro, squammas delibrata, splen-
 dens ex loco libero propè aliàs educata.

Gal. lib. 8
simpl.

Turbith Arabibus laudatur, cortex al-
 bus, gūmosus lactis crassitie, vacuus, arūdi-
 naceus, fractu facilis, recens, foris autē cine-
 ritius & planus, ex locis siccioribus.

Mesues.

Zingiberis radix sit cādida, odorata, pi-
 peris sapore & viribus, nisi quòd tardius ca-
 lefacit: sed diutius, vti longum piper. Dāna-
 tur teredinibus exesum, puluerulentum, te-
 ctorio quouis circūlitum ad pondus & ma-
 gis ad exesionem tegendam. Terram meri-
 tam & columbinum, quod vocāt, malè zin-
 giberis loco supponūt, quoties puluere eius
 est opus: licet pondere, colore, & reliqua

nat

natura radices sint diuersæ.

Zedoaria radix aristolochiæ rotundæ
emula, sapore, & colore zingiberis, calida
in gradu secundo, eadem Serapioni dici-
tur zurumbeth: sed zurumbet sine, h, radix
est diuersa.

HERBARVM DELECTVS.

HERBÆ propè omnes sunt nostra-
tes, quamquam harum quædã ex aliis
regionibus sunt meliores, vt absinthiũ pon-
ticum, chamædrys, chamepitys, scordium,
Cretica chamædrys, cãpæstris potius quàm
suburbana, calaminthe mōtana melior quàm
domestica: tamen si nostrum hoc solum &
celum habeant persimile externo, vires
quoque non ita dissimiles sortiantur, qua ra-
tione plantas Italas Creticis non multũ ce-
dere scribit Gal. si pluuium non fuerit cæ-
lum, & herbæ acres digerentẽsque, quæ hu-
iores prauos afflictis partibus infixos vehe-
menter digererent, ex siccis & maritimis lo-
cib. eligantur, in empla. *σικαβοτὰν* initio li-
b. 6. compos. pharma. secund. genera.

Porrò ex herbis plurimæ solũ virides in
syrupum recipiuntur, dum hæ vel harũ succi in
syrupos coquuntur, & in apozemata, clyste-
res, fœtus, cataplasmata, & alia id genus,
quos vsus postremos quouis tempore le-
uantur: in syrupos autem, vel formam

aliam toto anno seruandā sunt legēde, quādo sunt efficacissimæ, cum scilicet florēt, aut etiā semine iam plenæ sunt vt fumaria, calaminthe, & aliæ ex sequētibus, in syrupos, vel alia cōposita diu seruanda recipi solitæ. Nā fumariam florentem veris initio, semine autem plenam veris fine legit Mesues.

Quòd si herbæ nec caulem, nec florem, nec semen edunt, vt adiantum omne, asplenium, legēdæ in foliorū vigore: quādo scilicet maxima & virentissima sunt, quædā vero dum florent, aut semētescunt, quia lignosæ sunt, & exuccæ: ante id tēpus in vsum trahuntur, vt beta, brassica, cichorium chōdri-la, eupathoriū, lappatha, plātagines, verbasum, verbenaca. In quo viriū vigore etiam sunt colligēdæ quæ ficcātur, & in vsus medicorū varios anno etiam toto seruātur, vt absinthium omne, adianthum omne nobis (quibus enim abūdat virens, & vigēs vsurpatur) anethi coma, betonica, carduus benedictus, cichoriū, cētaurium paruū, calamin-

Aneti & the, mentha, chamædris, camæpitys, eupato
byssopi co rium, eufragia, fumaria, hyssopi coma, mar-
mā floru- rubium, maiorana, organū, poliū, pulegiū,
lenta est. ruta, rosmaris, saluia (licet hæ duæ etiā sine floribus sint efficaces) scordium, splenium, thymum, thymbra, verbasum: aut saltem cum vigent folia magnitudine, odore, colo-
 rè,

è, præsertim quæ cacumini sunt propria.
 Absinthium autē vere legit Mesues, ad suc-
 um & aquam inde stillandam, flores eiusdē
 æstatis initio, hic autē æstatis fine, vel etiā
 autūno. Eupatorium quoque legitur, & ex
 eo succus exprimitur in fine veris Mesuæ.
 Siccantur autē in vmbra magis, nisi quæ sunt
 caule crassiore, aut folio humidiorē, & ob
 id apto putrescere. Vbi probæ sunt siccatae,
 reponuntur, vt radices, sed minus diu serua-
 ri possunt, ob id quotannis mutandæ.

Adiantum omne eligit Mesues bene ha-
 bitum, virentibus foliis: quod autem graci-
 e est immodice, & folio flauescente exami-
 natum est.

FLORVM DELECTVS.

FLORES vt plantarum partes reliquæ
 legantur cū maximè vigent, cælo se-
 reno: non autem vt Bulcasis & indocti alii
 tribunt hoc vel illo mēse: nam quibusdam
 regionibus & cæli cōstitutionibus celerius
 ut tardius plantarum partes perficiūtur, vt
 apparis in gemma, rosa expandi cœpta lega-
 tur, reliqui ferè aperti: sed haud ita pridem,
 & ex quibus vis nondum exhalauit, nec fo-
 lia tenuentur, & sint decidua. Siccantur sole
 vel aëre calido, magis, minus, pro varia
 eorum natura. Quidam siccandos volunt,
 donec ex ponderibus decem, vnicū supersit,

minus autem ex montanis floribus quam ex campestribus minuitur. Reponuntur ut alia, quotannis mutantur quauis sphœrnâ: hum etiam decennium seruari possit: chamaemelum item diu vegetum est, ob fortem partium suarum missionem. Quam virium constantiam etiam tum validus odor demonstrat. Flores absinthii, chamedryos, chamæpityos, hyssopi, anethi, eufragiæ, sumariæ, maioranæ, origani, rorismarini, saluiæ, thymi, verbasci in herbis ipsis commemorati sunt, reliqui nunc dicentur.

Balaustium flos siluestris punicæ, cytino flore satiuæ punicæ est astringentior, præsertim quod ex acerbis punicis est. Vterque hic flos punicæ, est ab arbore auellêdus quo loco tunc granatum nullum gignetur. Nam qui cecidit, sæpè id illi ob alimentum inopiam, augescente & protrudente succo contigit, aut ob vermiculum, aut aliam causam: ob id infirmior est, qualis agnoscitur facillè: quia vna parte nigricat, foliorumque capillamentorum ipsis non hæret, ut in eo quem auulseris, qui præterea in vinbilico ipso, ut foris rubet. Hispana, rosæ modo lata, & breuia præstantiora sunt Narbonensibus longis angustis.

Caryophyllum laudatur, frangi cōtumax, odoratū, ex plano tumidulum, recens, quod

quibus compressum humorem quendam
mittit, acre, & aromaticum, calidū siccum
du secundo, aut etiam tertio. Annos
neque seruari potest, loco tēperato: nam
humidiores putrescit, sicciores arescit, &
osius euadit ac imbecillius, vt quod in
est enormius, quod barbari antophillum
ant, interpretaturq; antefolium natum,
rox sit illis composita ex latina præposi-
ne, & Græco φύλλον folium.

Crocus Dioscoridi optimus ad medica- *Lib. I. an-*
ta, Corycius, recens, oblongus, integer *tid.*
nus, non fragilis, flauissimus, & qui cum
more tritus, suo colore manus saturet,
sitū nec cariem redolens, subacer. Gale-
ntem Corycius, à Coryco antro in quo
itur, licet aliis sit procerior, non tamen
robore odoris aut diuturnitate est præ-
tior. Eligendus verò est non procerior,
odoratissimus & flauissimus, & lōgo tē-
e in vigore suo persistens. Præstantissi-
m igitur aliquem crocum apto quodam
loco repositū obserua sæpè, vt per-
as. Nam id colorem odoremq; pristi-
diu seruabit: adulterati verò odor &
citò vanescit. Hæc Galenus.

Centaurii parui flores ex pallido flauos
o æstatis legit Mesues. Nostrates au-
sunt purpurascens.

Epithymum Arabum seu thymi cassutha amplexicaulis, cum ramulis thymi lecta minus citò marcescit, & à thymo esse non herbis aliis congeneribus cernitur. Sic flores cæteros & fructus cum ramis legendos Galenus docuit. Ex thymo autem montano est præstantius, quàm ex hortensi Cretense rufum præferitur à Mesue.

Epithymū Græcorū quid reuera sit, nōdū planè cōpertū habemus, nisi sit flos satureiæ, Picardæ vulgò dictæ, perpetuò virentis.

• Hyssopus colligenda Mesuæ quādo incipit florescere.

Nymphææ flos tam albus ex stagnis, quā luteus ex fluuiis, vere legitur, cū apertus est: siccaturque luteus ob paruitatem, integer, albus, conspurcatis aliquot externis foliis purgatus, & cauliculo capillamentisque crocatis. Luteus verò ferè hic in aquam etiā cum albo distillatur, rarò siccatus seruatur. Narbonenses alba sola vtuntur.

Rosæ sunt præstantissimæ quæ longè omnium suauissimæ sunt, & aliis rubicundiores, quales ex montanis, non autem conuallibus leguntur. siccandæ loco sublimi meridiano, quo solis radii penetrent, rosas tamen non tangant. Nam albæ, incarnatæ moscatæ, quāuis recentes odoratissimæ sint, tamen siccatae sunt inodoræ: rubræ cōtrā recent

tes parum odoris reddunt, ficcata iucun-
 simum & diuturnissimum iaculatur. Ex
 o montoso petroso Pruini vr̄bis, vn̄ius
 i itinere à Parisiis dissita in vniuer-
 n propè Galliam omnium præstātissimæ
 uehantur, in territorio tamen Parisino
 n insuaues præsertim vico cui fons Naia-
 n nomen etiam vulgò est, larga manu lu-
 riant fabulosis vinetis, quæ Vr̄bi toti sa-
 esset possint, vt Pestanas & alias priscis
 ebratas rosas non desideremus. Rubras
 nodum foliis paucis & planis præditas
 fert Mesues. Rosæ tardius collectæ pa-
 n diu seruantur, & citò nigrescunt, tem-
 tiue lectæ biennio seruantur: cum igitur
 diocriter sunt apertæ, mox integræ inso-
 tur, sæpè mouendæ, deinde folia auulsa
 æ terreo claudantur, ne odor aut color
 eat. Si quo die sunt lectæ sol non luceat,
 e disponantur, ne se corrumpant densa-
 Similiter alii flores siccentur.

Schoenanthū seu schoenu anthos ex Ara-
 rarissimè huc ad nos transfertur, sed eius
 ci tātū calami, si deferantur flores, solo
 oratus vigore deligantur. Nā odoris illius
 tia citò vanescit. Gal. lib. i. antidotorū.

Stœchas etiā exotica est, ex Creta enim Gal. lib. i.
 itior & melius nutrita, ob id melior. Pe Antid.
 r, multa tamē nobis domestica ex insu-

lis: stœcadibus Mafsilię afsidentibus, quibus
& nomen ipsa est sortita. Prouenit etiam
multa in Arabia, vnde Arabica cognomina-
tur, & à Mesue præfertur, flore præsertim,
pòst foliis: fit amara, modicè astringens: spî-
ca ex purpureo cærulea, odorata.

Stœchas verò citria seu flaua Dioscori-
dis heliochrysum, & Galeni amaranthus co-
ma floris aurea, densa in Gallia Narbonēsi
& Aquitania, agro Burdegalensi plurima &
præstantissima gignitur, odore abrotani ma-
ris, & etiam sapore, sed minus amaro.

Mesues.

Viola nigra vulgo martia & quadragesi-
malis, à Meſue laudatur quæ prima floruit,
neq; vim suā calore solis resolutam perdi-
dit, nec pluuia obtudit vel diluit & dissipauit.
Quæ iam diu aperta est, aut pluuiam sen-
sit, aut in siluestribus nascitur, odoris gratia
caret, ac viribus.

Flores vix annum seruari possunt effica-
ces, præter chamæmelum, stœchadem, cro-
cum, & alios paucos, qui annis post duobus
aut tribus, coloris & odoris gratiā retinent.

DE SEMINIBVS.

SEMEN à fructu quantum differat, abun-
de in nostræ methodi lib. I. docuimus.
Semina verò deligantur matura omnia, be-
ne habita, plena, & corpulenta, & quæ naturæ
sue vires proprias habeāt efficacissimas, &
odo

re, sapore, colore, sui generis perfectissimi
si odoris, saporis est particeps. Multa enim
sunt inodora & insipida, non modo semina
sed aliarum quoque partium genera: Sint præ
cipua, si fieri potest, delata ex regionibus, in
quibus celebratissima crescunt maiorum no-
rum testimonio. Sintque recentia, aut his
proxima. Quæ enim diutissime fuerunt re-
centia semina, & alia, vires habent imbecil-
les. Vbi autem pulvis ab ipsis diuidendo ex-
cesserit, terminum exceperit. lib. 1. alimentorum.
Anonum candidum vel fulvum, simpli-
tate colore non vario, laxius, in vasa par-
tem tamen plena, diffusum, non astri-
ctum coherens, sit præterea odoratum, nares vul-
sæ, acre, mordax recens, non cariosum.
Anonum Scythicum laudatur lib. 8. com. phi.
Anonum Illyricum vel Aegyptium.

Anisum Creticum.

Cuminum Aethiopicum, deinde Aegyptium.
Ligusticum ex Ligusticis alpebus unde
nomen.

Geseli Massiliense, alterum Aethiopicum,
Anisum Creticum Dioscoridi laudatur.

Sinapi Alexandrinum.

Thlaspi Cappadocicum vel Creticum, sed
minus & minus rotundum est præstantius
pleno. Vtrunque nobis est, à Bursa pastoris
bas frigida astringente, diuersum.

Diosc.

Cardamomum eligi debet frangēti contumax, occlusum, plenum, fartumque, gustu acre amarumque, odore caput tentans, exalfaciens: quod tale non est, exoletum iudicatur. Hæc Diosc. Nigrum passim cognominatur Galeno, Nasturcio minus calidū, sed suavis & fragrantius eidem dicitur. An verò semen quod hodie noster Ioannes Horneus Lugduno aduexit. minus & planius grano paradisi, colore & sapore propè eodem, in filiqua breui triquetraque largissimum, sit verum cardamomum, affirmare non ausim ob historiæ ipsius obscuram breuitatem: tamen tum ipsum, tum granum paradisi, & quod cardamomum minus vocant proferrunt officinæ, semina sunt non indigna recipi in antidota, ob virium in ipsis aromaticarum excellentiam.

Cnici semen sit amplum, plenum, medulla pingui, album, angulosum, læue Mes.

Psyllium elegit Mesues absolutum, amplum, tam graue vt aqua mergatur.

FRUCTVVM DELECTVS.

EX FRUCTIBVS quanquam non pauci nostrates in medicamenta recipiuntur: quia tamen externi quidam præstantiores habentur, ipsorum quoque bonitatis notas paucis attingere fuerit operæpretium.

Am

Amygdalæ tã dulces quam amaræ, promptur flauissimæ, plenæ, integræ, non con-
stæ, nec erosæ, tamen leues, duræ & siccæ
antum illis datum est, ob id fragiles, intus
issimæ. Ex his dulces, sapore delicatæ,
pè indicibili in castaneã tostam & panis
issimi bene cocti qualitatem inclinâtes:
ore, ante esum nullo, aut perquã exiguo,
er edendum autem iucundo.

Improbantur albescentes, nigrescentes,
rosæ, molles, tortiles, fractu contumaces,
quæ fractæ à candore illo ad pallorem re-
erunt, aut nigrorem, oleosæ natura aut
ustate, odore iácido, sapore ingrato aut
agino: quem omnibus vetustas affert..
quibus tritis etiam si plus olei exprima-
tamen olei amygdalini probatissimí
es non assequitur, quod ex prioribus ex-
atur, excorticatis cultello potius, quam
a calida, vt in oleis dicemus.

Anacardus, seu cum Paulò & Actuário
cardion, sit plenior & habilior, fuscus, re
in cortice multa, acri, nigra, nucleo in-
lbo: quo in melle cocto fit mel anacar-
i. Hoc etiam tuso potest oleũ exprimi,
longè diuersum ab eo quod coctis in
corticibus supernatat, & conchis colli-
r ad confectionem anacardinam.

Myrobalani citrinæ sint, flauæ, multũ in

Mesues. viride inclinantes, densæ, graues, in fracturis gommosæ, amplæ, cortice crasso, denso, os paruum complectente.

Ibidem. Cæpulæ amplæ sint, & quo maiores eo meliores, subnigræ, in rubrū inclinātes, graues, ob id in aquā prōptē mergi, cortice crasso.

Ibidem. Indæ, sint nigræ, magnæ, graues, substantia dēsa, sine ossibus. A quibus cōditionibus quāto longius abscedunt, tanto sunt deteriores.

Ibidem. Emblicæ, magnæ, graues, carne multa, densa, ossibus exiguis, rara verò carne quæ sunt, spiritu & vigore carent.

Ibidem. Bellericæ, magnæ, graues, carne multa & densa.

Notæ igitur in his cōmunes aliorū fructuū & præcipuæ sunt, vt sint bene habitæ, & corpulētē, carne multa & firma ac dēsa, & ob id osse exiguo, q̄b⁹ os datū est. Nā Inde sunt ex osses. Quæ verò notæ aliæ à calore ducūtur, & ossis figura, minoris sūt momēti.

Balanus myrepfica sit ampla, vetus, cortice læui, tenui, pleno, medulla læui, pingui. Parua verò ex albo nigricans, vetus, plena medulla alba, læui, pingui, est innocentior.

Conii seu strobili vulgo pineoli, pleni, recentes, albi, sicci, quatenus illis datum est. Vitentur flauī aut etiam pallidi, oleosi, rancidi. Id quod his citò, vt ferè sexto mēse accidit, nisi prius saccharo intecti hoc vitium

giant: præsertim si prius ex furfure frīgur, & sic probè siccentur: deinde cribrentur. quod remedium est, aliis quoque; in quibus condiendis, ne aut citra conditura aut etiam condita rancescant.

Supressi pillulæ, vulgo nuces, sint perfectiores, ob id molles, seminis plenæ, non in ipsis hiatibus.

Cydonia seu cotonia sint bene habita, et ascescentia, odorata, matura cum minus refrigerandum & refrigerandum est: cū verò immatura, ante maturitatem colligantur.

Eadem ratio est struthiorū, quæ nos cydonia fœminina vocamus, aliis maiora, minorcerba, carnosiora.

Citrium & aranciū malū, & quē vulgus citrū vocat, sint magnitudine quodq; in genere mediocri, odore valido & iusto, cuique; suo cortice tenui, raro: colore citrino pallido, in citro flauo, in arantio roseo: quamvis & arantia virida etiam ante maturitatem inueniantur: carne intus molli, firma, & succo odorato, acido, interdulci, est quando ex vtrisque misto.

Colocyntidis medulla cortice ablato sit mediocris in speciem conglomera- *Gal.*
ta, et immixta amara, matura, ampla, rara, ob
eius: & quāto leuior, tanto melior: alba
modum lenis, eadem fœmina, autumnō

legenda cum flauescit abeunte iam virore.

Mesues. Cucumeris agrestis fructus præfertur absolutus & maturus, & virore deposito flauus, amarus. Ex quo succus albus, subpinguis, Elaterium dictum, quomodo sine valenti

Dios. compressione extrahatur, docet Dios.

Mesues. Carpobalsamum sit flauum, plenū, grande, graue, mordax gustu, & feruens in ore, modice opobalsamum redolens.

Ast. Cassia fistula, seu nigra, seu cathartica, id est. purgatrix, eligatur foris & intus nigra, ampla, collucens, grauis, plenior, & quæ concussa clausis intus granis non strepat: pulpa intus pingui, splendente, succulenta, non fistulenta, nec putri: sapore prunorum delictato: calida humida primo gradu. Vtendi tantum tempore extrahenda: nam extra cannas, vt semen, sanguis, lac, extra propria conceptacula, prompte corrumpitur, & in vasis seruata peior euadit.

Cubebæ sint corpulentæ, plenæ, graues, acres, minus tamen quàm piper, subamaræ, admodum aromaticæ, subdulces, annis decem seruantur.

Coccum gnidium ex thimelæa eligendum, cui folia magna tenuia sint, quæ in locis liberis crescit propè alias multas thymelæas, foliorum vsum celebrat Mesues non granorum.

acalyli nobis, vt Græcis vulgaribus hō-
cuntur, fructus palmæ, à digiti figura.
antur magni, flauī, parum rugosi, mol-
eni tamen, & carne intus multa, subdu-
nucleum candicante, ad corticem ru-
nte, non pertusi, non vermiculosi, &
percussu nihil aut minimum sonent, sa-
uinoso. Deteriores sunt graciles, flac-
duri, quia excarnes, excusso pediculo
si: idem ferè vermiculis scatentes.

cus passæ seu caricæ habentur præstan-
næ, quæ in calathō spartaceo digitis,
ugnis vtrique pressæ, sic illis mollitie
edūt, vt mutuos partium dictarum mo-
bi propè obcurrētes sentias, odore sunt
ndo, non calorem putredinosum, aut
iculosum referente.

æ verò si particulatim explorentur, pe-
lo sunt breuissimo, colore incandidum
ente, molles, tractanti facilè cedentes,
tenui, molli, succo intus & semine fla-
t plane melleo sapore, odore ante esum
ter edendum iucundo, graves, paruæ
assiliotides (quæ etiam saporis gratia
ras longè antecellūt, siue albicātes tan-
sint, siue intus & foris albe, sed flauo se-
e) maximæ: si externæ sint, quales Hispa-
nittit musto mersas, vt dulciores sint,
ne cohæreant farina aspersas.

Vit

Vitiosæ sunt duræ, tum in massa, tum per se singulæ, vermiculosæ, graueolentes, foris nigrae, intus rubentes, vel alio præter naturam colore præditæ, cortice crasso, duro, sicco, intus alieno colore, odore, sapore. Quædam tamen sunt nigrae Prouincialibus & Narbonensibus dictæ, foliis nigrantes, intus tuberrimæ, omnium delicatissimæ dum recentes sunt: nam ficcatae liquefunt, aliæ eisdem cineritiæ, aquosiores quàm ut ficcari possint: hominibus ingratae, auiibus expetita.

Galla omphacitis, id est immatura, laudatur parua, seu magnitudine mediocri, nodosa, grauis, solida, nõ perforata: minus utilis magna, rotundissima, polita, levis, laxa, perforata, flaua, aut saltem rufa. Gallia Narbonensis & Lugdunensis præfert rosinarinas vulgo dictas, omniũ minimas, graues solidas, asperas, pretiosissimas.

Iniubæ zizipha vel zinzipha Græcis dictæ laudantur recentes, amplæ, oblongæ, passæ, tamen tensæ, carne intus multa, succulenta, laxa, dulci, vinosa: plenæ, graues: sapore dulci & delicato: nucleo paruo, foris rufo ac verius rubentes, intus pallidæ aut albescentes. (Nam foris albæ nobis nondum visæ) ossæ prunorum rotundioræ, paruo intus nucleo, dulci. Improbantur vetustate nigri-

es, leues, siccae, puluerulentæ, friabiles,
rnes.

Myxæ, myxæ, & myxaria, vulgo sebe-
à mucoso lentore, quo abundant dictæ
dictis affines, sed dimidio minores, acu-
atæ, parum rugosæ, graues, nigrae, carne
a ex rubro nigricante, firmiore, gluti-
, dulci & subacida, osse prunorum Da-
cenorum inæquali, nucleo intus exi-
dulci.

Malum punicum cortice seu corio inte-
ruso, duro, & denso, graue, maturum,
is intus rubris vel roseis, succo prægnan-
s vinoso plenissimum.

Myrti baccae recentes, plenæ, succulente,
rate, grandes & bene nutritæ.

Luces auellane præferuntur ligno soli-
on pertuso, rubente, rotundo: corpulen-
raues nucleo intus si concutientur so-
e: si fracta nuce gustetur, gratissimo, &
re castaneam referente: foris flauo, in-
lbicante, pleno duro.

His proxime sunt, france vulgo dictæ,
est legitime, oblonge, ligno simili,
intus nucleum vestiente rubentissima,
e dura & firma rubente. Infime sunt
estres, ligno & nucleo candicante. Im-
pantur, leues, perforate, quia vermi-
le, vetustate oleagine, rugoso nucleo

*In Gallia
Narbonē
si quatuor
locis inci-
se muria
dies ali-
quot ut itē
post om-
pha. io ser-
uantur.*

&

& exucco.

Nux moschata sit grauis, oleosa, odorata.

Nux indica aquam intus dulcem habet, si recens est. Quæ quidem vtenda, nõ cortex,

Oliuæ halmades, seu colymbades, quæ in sua muria conditæ innatant, præstantiores sunt, magnæ, ouales figura, pallidæ aut rufæ, plenæ, solidæ, carne multa, densa, sub-amara & subdulci: osse intus paruo longo, nucleum delicatissimum complexo. Quæ verò enormes aduehuntur, acuminatæ, carne multo largiore, sapore sunt minus delictato, vt armeniaca. Insita non insitis corpulentiora multò sunt, sed saporis iucunditate multò inferiora.

Gal.

Opiantes & rha, & ribes vua legenda matura, plenior, acinis paucis, bene nutritis potius quàm densis, & paruis & strigosis.

Piper longum sit, corpulentum, integrum, recens, linguam tarde, sed diu commordēs. improbatum perforatum, vel adulteratum.

Mesues.

Piper album ex hoc productum acrius longo, & nigro maximum, plenissimum, graue non rugosum.

Piper nigrum, alio maius, cortice tenuiore, & minus rugoso, graue admodum.

Pistacia sint recentia, nucleo intus herbaeco, sapore iucundo.

Thamar indi præferuntur subnigri, seu
fu

ci, lucidi, molles, recētes, pingues ceu vil-
 quibusdam, & radiculis intertexti, dulca-
 i, seu ex dulcibus acidi, & vinoso sapo-
 Improbantur sicci, carne prunorum ad-
 erati: in quibus nigredo est obscura, &
 norum odor & sapor.

Pruna passa, vel acida sunt, vel dulcia,
 aque sint ampla & plana: carne intus mul-
 succulenta, firma: osse exiguo, foris vel
 elle aërio incrustata, vel nigra, sed citra
 lutionem: non rancida, nec situlenta, nec
 uerulenta.

Damascena & armenia magis ad aluum
 ducendā, & dulcia alia humidaq; sunt eli-
 nda Mēsua quā acida, vel horū media.

Senna folliculo (cuius præcipuus est vſus)

Mesues.

subnigro, in viride inclinante, modice
 iaro & astringente, à natura completo, re-
 ati, semine intus amplo compressoque.

terior est subalbus, nondum iustæ ma-

itudinis, aut maturitatis. Folia secundū

rent locum si viridia sint, & plena, non

alba, aut tenuia: surculi inutiles purga-

ni, ob id abiiciēdi. Mirum est hodie tam

litos sui & Mēsua pharmacopolas, vt fo-

pluris & faciant & vendant quā folli-

los. Nostras verò hortensis senna ineffi-

rior est orientali, vt vocant, tamen non

utilis vſu quotidiano exploratur.

Vuæ passæ, pingues, carnosæ, cortice tenui sunt præstantiores libro. 2. alimentorum nobis sunt Damascenæ. Corinthiæ vulgares.

Damascene sunt deligendæ amplæ, fuluæ, transparentes, carnosæ, feminibus paucis, paruis, sapore vinoso.

Corinthiæ omnium minimæ sine seminibus, colore purpurascente, sapore delicatissimo, rare, & prætiosissimæ.

Vulgares huc afferuntur, vel ex Provincia capsulis abietinis, vel ex Hispania calathis spartaceis. Provinciales omnium post dicta duo genera Damascenas intelligo & Corinthias præstantissimæ, præsertim quæ prunellatæ vulgo indigenis vocantur, opinor quod acino sint pruni amulo, hoc est nigro, sed quem ros cæruleus intexit. Non incelebres fuluæ, Picardatæ iisdem dictæ, Damascenis toto habitu proximæ, nisi minores essent, & carne parcior, minusque solida. Ambæ in palmitibus siccantur intorto pediculo, hæc si pinguescant immodicè & ob id digitis hæreant, farina aspersa vitium indigenæ regunt. Qui dolus est frequentissimus in Hispanis omnium ignobilissimis. Quæ enim habet Hispania optimas sibi seruat: viles in alias septentrionis regiones transmittit.

Del

A GALLOCHVM lignū, sit maculatū,
odoratum, gustu astringens, & sub-
amarum, cute verius quā cortex aliquan-
tum versicolore, halitum mansu. coumen-
dans, suffimentis expetitur thuris vice, eius-
que modo in igne liquecens, sed tardius,
& aquæ injectum mox subsideat, & bullu-
las edat. Xylaloē dicitur Actio & Actuarius,
idest lignum aloēs arboris, non herbae, cu-
ius tamen succum nigredine & amaritudi-
ne pauca, & succo intus gummoso nonni-
hil repræsentat: vnde opinor illi nomen
hoc accessit. Crudum vbiq̃ Mesues re-
quirat, quod enim à quibusdā est expedien-
di odoris gratia, vim amisit. Quod verò Dios.
ostendant officinæ, verius est aspalathum:
quod si optimum sit, graue & detracto
cortice rubens aut purpurascens, densum,
odoratum, gustatu amarum: alterum de-
terius candidum, lignosum, inodorū, Sunt
tamen qui eius loco oliuæ arboris matri-
cem substituant.

Lignum Gaiaci, siue ebeni species est,
vt mihi videtur, quia ebum toto habi-
tu & viribus à Galeno scriptis refert, siue
aliud lignum sit, eligatur colore fuscum
& flauum, cortice ipsi ligno firmiter hæ-
rente, densum, graue, bene habitum ex

arbore ætatis mediæ, si potest recentissimum (quo enim recentius, eo est succulentius & vegetius) aut alioqui gummosum, ac in eo nõ excorticato rami mediocres præferuntur, si verò vetustus est truncus, (modo nõ sit putris aut cariosus, vel aliter vitiatum, ut sæpe videmus) quia ob crassitiem & duritiæ dissolutioni sui magis resistit, pinguior manet quàm rami, cortex verò siccior. Contrà verò recentis cortex internus pinguior, & succulentus magis, quia alimenti plantæ vehiculum ferè fuit. Eligatur item sapore dulci, amaro, acri ex insula meridiana sancti Ioannis, temperata, irrigua, resinosius: ex insula autem sancti Dominici in zona torrida aridius.

Paulus sanctus quibusdam videtur ramus gaiaci, cui lignosarum fibrarum implexu vario, matrice nigra hodie in ebeni locum substitui solita, viribus denique proximus est, sed valentior si recens est: imbecillior verò & ob tenuitatem citius exicatus, si vetus, ut in aliarum plantarum ramis, & præcipuè surculis. Aliis diuersus videtur quòd albescat magis suo cortice, & aliis quibusdam de causis. Iudicium his permitto, qui arbores ipsas cædunt, viribus certè ambo sunt proxima.

Santalum citrinum, optimum, & maxime

mè aromaticum, sed inuentu rarum etiam Plateario.

Album pessimum, rubrum medium. bonitate est: frigida omnia gradu tertio, sicca secundo. Quæ tamen sunt in officinis acri sapore linguam mordent, præsertim citrinum, ob id non vtenda.

Xylobalsamum probatur recens, sarmen *Dios.* to tenui, fuluum, odoratum, opobalsamum non nihil spirans.

Calamus aromaticus, quæ officinæ ostendunt, radix videtur & rei alterius quàm calami, tamen viribus proximis pollere odor & sapor indicant, subalbus, odore & sapore aromatico, non puluerulentus inter frangendum, triennio seruatur.

CORTICVM DELECTVS.

CINAMOMVM deligatur tenuium par *Galenus* tium, odoratissimū, seu indicibili qua *locis uarijs.* dā suauissimi odoris gratia super alia omnia præditum, gustatu acre, & valde mordax, admodumq; calidum non tamen adeò vt molestè rodat, mansum verò rutam oleare videtur, color illi est lacteus, cum giluo & cyaneo mixtus, seu cineritius, virgultis gracilibus, nodis frequentibus, læue, confrigifacile. Leptocinamomum. i. tenue cinamomum pro optimo vocatur Actuario. Quod verò cannellam vocamus, vel casia

est, vel pseudocinamomum, quanquam principum cinamomorum sex ipsi sint differtentiarum generales, annos triginta seruatum fit imbecillius, nec putes diutius seruari posse. integris viribus toto habitu corticisque tenuitate.

Casia quo cinamomo est similior, ac odore & gustu proprior, eò est præstantior. Est autem rufa, rosam, expirans, & vinum olens, gustum dulcem præferens, & aromaticum inodo vehementer odora, vnde casia syrix, id est fistulosa & casia syrix fistula sæpè apud Galenum dicitur, à purgatrice & Aegyptiæ res diuersa, vt prius in fructibus admonui, illa corticem exteriorem, quem & fistulam dicunt, odoratu & gustatu valentem habet: quod autem intus est maximè imbecillum, ob id inutile.

Macis sit rufum aut flauum, aromaticum, odore suauis, sapore subacri, & minimè amaro: quoque recentius & succulentius, eò melius, ne putes cum quibusdam annos decem efficax seruari. Succus ex hoc expressus gummi hæderæ figura, quam ipsum macis est valentius. Macer hodie desideratur.

Tamaricis cortex sit verus ex Gallia Narbonensi potius quam ex fonte bellæ aquæ paradiso regia propè Melodunum. Hic cum sit nostras & passim luxuriet, vel lippis & tōsōrib

ribus notus est, vt cortex radicis capparis.

Thuris cortex sit crassus, pinguis, odoratus, retens, lævis, non scaber, sine membranis, adulteratur misto cortice pini aut nucis pineæ, sed hi sine odore fumant non incenduntur, sed thuris cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporem iaculatur, ferè in glebis thuris mistus inuenitur. Dios.

SUCCORVM DELECTVS.

OLEVM ex oliuis maturis expressum colore rufo, purum, perlucidū, tenue, odore exiguo sed grato, sapore dulci, subacri, & indigestibili, recēs, aut non ita vetustū, nisi vetusto egeatur. In quo trigenarium trimo, & quadragenarium quadrimo est plurimo valentius, vbique crassius, graucolentius, calidius, acrius.

Oleum virgo quod vocatur, est præstantissimum: paucum fit, ob id pretiosum. Dios.

Oleum omphacinum ex immaturis vuis expressum ad viride inclinat, recēs fit, odoratum, morsus expers, sapore acerbum. Huius penuria ablutum capiendum est.

Vinum deligitur varium pro scopis medicorum variis. Colore autem, odore, sapore, consistentia ferè probatur.

Acetum album tenuius ob id valentius nigro & medio, præsertim si æquè sit acre & vetustum.

*Mel sit
uernū aut
æstiuū nō
hibernum
Auic.*

Mel optimū sit purū adeò, vt totū perlu-
ceat, odorū, flauū, accerrimū, dulcissimūq;
gustanti & iucundissimum: consistentia nec
crassa nec liquida, sed tam sibi cohærens, vt
continuitatem suam quasi linea longissima
non intercisum seruet, si digito attollitur.
Idem coquendo paucam spumam emittit,
nec thymum immodice olet.

Album etiam colore si fuerit, modo no-
tarū bonitatis aliarū nulla desit, nihilo dete-
rius fuerit. Quin Hispani & Narbonenses
mittunt albisimū, & longè præstātissimū,
idēque prædurum, quale etiā flauum hīc
præferunt liquido: quippe quod humore ali-
quo est vitiatum.

McFues.

Aeromeli autem .i. mel aërium seu māna
Arabibus dicta, siue liquida sit, siue granu-
losa, eligatur alba, recens, dulcis, pura, & ex-
crementorum, quo ad licet experts ex plātis
odoratis & huiusmodi salubribus collecta,
qualis laricea hodie probatur, anno serua-
tur. Sola prope granulosa in v̄su est, liquida,
inuentu rara, quæ in lapides incidit deterior,
& hac peior cineritia: pessima fusca cœno-
sa, antiqua, saccharo & folliculis senne adul-
terata: sed hæc tempore mollescit, & lique-
scit, dolūque prodit.

Cera sit flauissīma, odorata, pinguis, co-
acta, leuis, pura, & aliena omni materia ca-
ren

rens. Maurica tingendis flauo colore aliis
quanquam nigricat: expetitur alba, vel natu-
ra, vel ablutione: fit viridis mista ærugine:
rubea immissa anchusæ radice, cinnabrio ta-
men sæpe tingitur.

Saccarum est præstantissimum, quod du-
rum, solidum, & mutuo metarum allisu so-
norum est, ligni sicci & solidi modo, tamen
ob siccitatem & imperceptam raritatē leue,
dulcissimū, candidissimum, & niuis in mo-
rem scintillans, cohærens, quale Valétinum
in metas pyramidum æmulas (panes vocāt)
coactum, paruas, ponderis libræ vnus & di-
midia, vel circiter, charissimum, & cōfectu-
ris siccis aptissimum, penidiis ob siccitatem
nimis friabilem, ineptum.

Illi dotibus istis & pretio est proximum
quod Madere appellāt, sed in metas ponde-
ris librarū. 6. 7. 8. 9. decem formatur, confe-
cturis expetitur, quia minus pretiosum, non
multò tamen imperfectius.

Tertium statuitur lentile, album quidem
sed pinguius, ob id vilius neque confectui is
siccis aptum, sed penidiis idoneum.

Quartum ex Canariis nunc dictis insu-
lis, olim Fortunatis, aduehitur, etiam intus
albicans, bonitate inferius prædictis, præstā-
tius sequenti, metis constat maximis, pon-
dere lib. 10. 12.

Quintum ignobilissimum sancti Audo-
mari dictum, foris albidum, intus lubrubrū,
tanquam alio factum, & foris dolo tectum,
metis æqualibus, omnium glutinosissimum,
condituris ficcis ineptissimum, liquidis fer-
uit & syrupis, opiatis, conseruis, & similibus,
quia vilissimum, & vilitatem tegit alio-
rum mistura. Id si mare sentit (nam eo na-
ues ob gravitatem saburrant) rubrum vul-
go dictum sit, quanquam sunt qui rubrum
spumam & spurcitiam omnis saccari se co-
quendo purgantis existimant. Ex micis ho-
rum collisu elisis etiam metas hic quidam
cogunt, quæ simplicium naturam sequuntur.
Ex his quod generosissimum minimam
coctionem sustinet ne puluerescat, ignobi-
lissimum contra: cætera pro accessu, aut re-
cessu variant.

Acacia nostras modo non putruerit, aut
situlenta evascerit, bona adhuc fuerit vetu-
sta, nisi recetem medicus exigat ob scopum
aliquem.

Dios.
Mesues

Aloë optima sit pinguis, glutinosa, friabi-
lis digitis, facilè liquefcēs, ex rubro ruffa, he-
patis modo, coacta & intus foveata, proinde
minus grauis, bono odore, myriham æmu-
lante, licet planta tota odore sit retro exi-
miæ amaritudinis, sincera, nitida, transpa-
rens, arenularum & calculorum expers, qua-
lis

lis est indicat. Adulteratur Mesue & aliis, & notas istas non habet.

Elaterium, & Glaucium & Lycium si habebuntur notas ex Dioscoride require.

Glycyrrizæ succus ex Creta optimus, hoc est, dulcissimus, mollis, recens, purus, tenax, & qui contractus splendet, nigerri-
mus, & qui linguæ subditus tandem totus eliquescat.

Hypocisthis licet quædam flaua, alia vi-
rens, alia candida Dioscoridi dicatur, ante præparationem intelligitur. In offas enim conformata est nigra, lenta, sapore astringente, odore non ingrato.

Ladanum probatur odoratum, subuiri. *Dios.*
de, facile mollescens, pingue, resinofum, quod arenas non collegit, nec squalore ob-
fitum est, quale Cyprium, sed Arabicum & Libycum est vilius.

LIQVORVM DELECTVS.

Opos est liquor ex plâta vulnerata, te-
rebrata, scarificata, castrata, sponte de-
fluens, sed suauis gustu.

Opus Cyreniacus sit acer, mordax, mo-
dice rufus, non porraceus colore, translucens,
myrrhæ æmulus, odoratus, & qui dilutus
cito albescat. Ex Taprobana insula in ma-
ri Indico maxima hodie à Lusitanis con-
uehitur, belzoe indigenis dictus, & nobis
ind

inde belzoin. (Nam indicus etiam Mesuæ laudatur) corruptius bencoin. Assa aromatica & odorata, quibus corruptæ etiam dicitur, nomine à lasere herba detorto, à qua planta hic liquor defluit, ut etiam assa foetida à lasere Parthico & Persico, & cum Mesuæ à Medico & Syriaco, cuius liquor virus & putrilaginem olet Dioscoridi.

Dios.

Opium dictum, quod nigri *μακρον* .i. pauperis, fit opos. i. liquor, ut meconiū eiusdem succus, laudabatur olim Thebaicum & Hispanum, nunc Apulum in usu esse frequentiore audio. Opium habetur optimum, grave, densum, gustu amarum, odoratu, soporiferum, quod facile aqua diluitur, læue, candidum, neque asperum, neque grumosum, quodq; inter colandū non ut cætera coëat, & in sole diffundatur, deinde ad motum lucernis non atra luceat flamma, extinctum denique odoris vim servat.

Dios.
Mesues.

Opobalsamum probatur recens, validi odoris, sincerū, non ad acorē vergens, dilui facile, læue, astringens, mordens gustu modice, in laneam vestem effusum, nec maculā facit, nec si eluatur notam relinquit, lac coagulat, in aqua, aut lacte celerrime liquatur, & colore lactescit. Idem senescēs crassescit, deteriusque habetur Diosc.

Opopanax. i. panacis heraclii radicis incif

cisæ, vel caulis liquor, candidus, dum recens est, dum aruit, colore foris croceo, aut subflauo, intus candido, odore graui, seu cum Mesue odore bono, sed succo amarissimus, læuis, pinguis, friabilis, tener, facile in aqua liquefcens.

Damnatur niger admodum, & mollis.

Dios.

Gal.

Euphorbium fit lacteum, causticum, & vrens, tenuium partium vel orobi magnitudine, sarcocollæ modo emicans, vel in ouillis aut hedinis ventriculis exceptum & concretum, vitreum, translucens, acre, recens, albissimum, vbi calore multo & igneo egetur: vbi modico, luteo & vetus. Recens enim albius est, & calidius; & leui gustatu os accensum diutius sic tenet, vt cætera gustata euphorbium resipiunt. Color autem hic caducus est, & citò evanidus, fitq; vetustate cineritium, pallidius, aut flauius, & modice calidum. Bimum aut trimum adhuc mediocre viribus est, & interdum quadrimum: quinto autẽ aut sexto anno exoluitur, prodeunteq; tempore totum elanguescit, ne putes cum vulgò annis decem posse integrum seruari, etiã cum milio, lentibus, fabis. Recens verò quia viribus est violentis, nõ vten dum, nisi medici optimi consilio, præsertim sumendo remedio. Mesue verò optimũ est. leue, fragile, pallidum clarum acerrimum, odor

odore mordax, annotinum, nam recentius igneum est & venenosum.

Galbanum laudatur ligno purū, aliquid tamen seminis mistum habens, odore graui, sapore abominabili, pingue, in Ammoniaci aut thuris similitudinē chartilaginosum, humidi & aridi medium.

Ammoniacum probatur purū, ligno, arenis, terra, fordibus, bene coloratum, odore castorii, sapore amaro, prædensum, & in thuris masculi similitudinem minutis glebis chartilaginosum.

Gaib. 1.

Antid.

Sagapenū laudatur perlucidum, foris rufum, intus candidum, acre, odore porri, seu medio inter laseris liquorem & galbanum, quibus adulteratur, galbano albiore est simile. Nam spumosa, coherens, albior, le-

Ibidem.

uisque pars galbani in sagapenum degenerat. Altera densior, & multo quàm aliud galbanum constrictior, sit galbanum optimū, sagapenum respiciens, eaque tanquam præstantissima utendum, si verum est, vino aut aqua statim soluitur, adulteratū non liquefit. Mesuræ verò optimum sagapenum censetur ex albedo rubescens, odore porri, non omnino laseris, nec galbani, quibus adulteratur, spissum, sed tamen leue, facile in aqua resolubile.

Scammonia vel scammonium, ex Myfia

A6

Asiatica defertur laudatissimum, hoc est, nitidum, rarum, fistulis tenuibus, fungosum, leue, taurino glutini, vel gummi colore simillimum, & clarum linguam parum vehementer vrēs, lingue saliuosæ tactu vel humoris alicuius albescentis in fragmētis, & lactescens, tenerum fractu ac pulueratu facillimum, odore bono sed suo, non autem foedo. Syriacum & Iudaicum graue & densum improbantur: tamen Antiochenum Mesues commendat: si verò linguam vehementer exurat, thitymali succo vitiatum iudicatur.

RESINARVM DELECTVS.

MASTICHE laudatissima fulgore quodam ignis splendida, candore ce Diof. ræ Tyrrhenicæ, ampla, retorrída, friabilis, Gal. fridens friando, odorata, minimum acris, Chia, id est ex Chio insula, calida sicca ordine secundo, parum astringens.

Deterior est viridis & nigra, Aegyptia dicta aut pontica, bitumini nigredine similis. Est autem lenzisci arboris refina.

Terebinthina refina ex terebintho arbore defluens, optima est alba, vel cerulea, vel colore vitri, perlucida, odorata, terebinthū olens, subamara, chia, asperæ arteriæ & ori mordax, liquida. Huic primatum inter resinas dat Diof. secundas tribuit mastichæ, cō-
ura

tra Galenus, ob id eam statuimus primam.

Hodie ex Cypro insula & liquida, & per siccationem coactior aduehitur non cōtem nenda. Huic proxima est larix dicta seu laricea ex larice arbore, in qua mannā ferē colligunt: larici bonitate & tota natura est affinis abietina, quæ hodie prope sola pro terebinthina, ab omnibus officinis supponitur magno errore, cum sit multò inferior terebinthina. Quod si Galenus nō modo terebinthinam exigebat, sed Chiam tanquam omnium præstantissimam requirebat, quā nō dico ignominia sed pœna multatū sunt rhopopolæ, qui sciētes abietinā pro terebinthina vendunt, vsurpantque non sine medicorum id permittentium infamia & culpa.

Præter has picea, pinea, strobilina, cyparissina, Dioscoridi & Galeno memorantur, & liquida ē pinu & picea, quæ quod olim à Colophone vrbe Asiæ minoris petebatur, colophonina vocabatur: nunc nescio, quā ratione fecem terebinthinæ distillatæ solam vocent Colophoniam.

GUMMIYM DELECTVS.

GUMMI ex acacia Aegypti spina, Arabicum, vulgo dictum, & gummi absolute, laudatur vermiculorum in speciem cōtractum, vitri modo perlucidum, purum, refrigerat, densat.

Canc

Cancamum Arabicæ arboris lachrima vulgo gummi lacha, præstātius est ex Dios. legendum.

Caphura Indicæ arboris ferulaceæ lachrima, solis arabibus & græcis recētioribus cognita, eligatur quæ igni vel sole ex rubro albescit, perlucet, friabilis est. Ea enim est melior & tenuior & durantior, eadem pani calido imposita madescit si sincera est: arefcit verò, si spuria.

Deterior est crassa, fusca, nigra, assulis ligni sui implicata, vase eburneo cum semine psyllii aut lini, annos quadraginta seruari posse quidam affirmant.

Gummi oleæ Aethyopicæ corruptè elemi dictum, melius est scammonio simile, fuluum, stillis exilibus constans, mordax.

Dānatur Ammoniaco vel gummi Arabico simile colore, nigricans, morsus expers. Quod proferunt officinæ est resinæ picæ aut pinus, quam Burgundicā vocamus, colore & consistētia & odore primo, deinde tamen valentissimo & multis graui.

Gummi iuniperi vulgo Vernix, quia vero tempore exudat & legitur, bonum est recens, perlucidum, pallidum dum veterauit, flauescit, & fit friabile mastiches modo: quam toto habitu multum mentitur: In vsu frequentiori tamen est scriptoribus

Dios.

& pictoribus quam medicis, præterquam in suffitibus, qua autē ratione non video, cum ipsum vt & thus caput grauet, & vapore craſſo & calido repleat.

Myrrha arboris Arabicæ lachrima eligēda, recēs, ſquallore & ſiru obducta, leuis, tota concolor, & quæ contractas vnguitum modo & læues venas ostendar, glebis minutis, amara; acris, odorata. Omnibus antefertur Trogodytica ex Aphrica, viridis, perlucida, mordax, odoris gratissimū, nullo vitiatā liquore. Post hanc secunda est tenuis, bdeliū modo facilē sub digito mollescens, odore grauiuscula, apicis nascens. Mala, nigra, aut colore picis, grauis, retorrīda, maturitate maximē exoleta.

Omnium peſſima, pingui carens, cano ſitu obducta, acris, ad gummi is imaginē vergens, & viribus eius proxima. Ob id adulteratur gummi macerato aqua, in qua myrrha maduit. Vera enim est rara inuentu. præcipuē ſincera. Nā in optima myrrha opocalpaſon innenitur ab optima myrrha diuerſum, vt in noſtris ſimplicibus abunde docuimus: propter quod & alia, myrrhae in ſumēdiſparum tutus est vſus.

Myrrha ſtaſte, id eſt, ex myrrha recente, pingui, & ſolo lætiore nata exudans & ſtillans, cum ex aqua pauca tuſa, deinde machin

china exprimitur, colore pallido, amaritudine præcipua, odoratissima, pretiosissima, minima portione efficacissima, multò rarior ipsa myrrha. Nam quæ styrax liquida vulgò dicitur, si verax esset, myrrha fuerit stacte: sed cum odore sit teterrimo, à myrrha alienissima res est.

Quod stillis illis expressis manna myrrhæ superest, vulgò quoque styrax rubra dicitur.

Bdellium lachrima arboris Sarracenicæ vel Sembrachenicæ cum Hermolao, optimum est carens cortice, ligno, sordibus, vt taurinum gluten, translucens & clarum, odore vnguis marini incensum, gustu, amaro, intus pingue, & si tactu subigitur mollescit.

Scythicum est atrius, resinofius, molliès magis. Arabicum resinofum, liuescens, lucidum, magis siccans, nisi recens sit & humidum, & tundendo facilè mollescens. Indicum, sordidum, nigrum, grandioribus glebis in offas conuolutum.

Adulteratur gūmi, sed id minus est amarum, & mitius suffitu odoratum.

Styrax lachrima arboris Syriacæ probatur flauus, pinguis, resinofus, sordescens, albicantibus grumis, acer admodum, & amarus, quamplurimum in sua odoris fra-

grantia permanēs, & qui subactus melleum reddat liquorem. Deterior, niger, fursutosus, friabilis, cano situ obductus. Adulteratur multis modis Dioscoridi, sed dolus his notisprehenditur. Pretiosissimus erat & paucissimus Galeni aetate, qui ex Pamphilia in calamis & in arūdmibus afferebatur. Unde opinor quivis alius calamites hodie quoque dicitur. Accipe autem quod calidissimum, & odore & gustu valentissimū est.

De styracis duobus aliis generibus supposititiis in myrrha diximus.

Sarcocolla arboris Persicæ lachrima, polini thuris similis, rufa, emplastica, subamara sine morfu siccans Melux. Item valentior est flava quā alba, & quo amarior, eō melior.

Dios.

Adulteratur gummi misto, puluerata etiam suspecta est adulterii. Vera enim rara est inuentu.

Succinum vel Electrum est lachrima ex pinei generis arboribus exudans autumno, ex Germania septentrionali & insulis maris Germanici, larga mitti solita, incensa pineā aperte olet, charabe vulgō & embra dicitur: medicis in usu raro.

Ambar verò seu ambrū seu ambra Arabibus & Græcis recētionibus est odoramētigenus cineritio colore. Arabica, subalba. Indica,

ca,

ca, rufa, pinguis, odorata, succinũ orientale dicta Hermolao. Nigra omnium pessima.

Thũs lachrima arboris Arabicæ, pinguis, albius, emplasticũ, flavius, est siccius, & antiquatũ magis. Quod fœmininũ vocat resinofum magis est ac molle, citò ardēs: quod masculũ, primũ albicat, tandẽ etiã rufescit & flauescit. Perlucidũ est, si præsertim guttarum formã retinet. Adulteratur resina picea & gummi, sed thus ardet, gummi non inflammat, resina in fumum abit.

Mannam seu maluan thuris Græci propriè vocant micas thuris, ex magnis fasciculis concussu elisas cum fragmentis quibusdam exiguis corticis thuris arboris.

Tragacantha laudatur alba, perlucēs, gracilis, lævis, sincera, subdulcis. Saliva, in ore diu lentescit. Quæ verò est antiquata, magis pallescit primum, deinde rufescit, tãdem etiã flauescit: quod lachrimis prope omnibus commune est: fitq; tragacantha hæc annis amara, ob idq; calidior, dulciũ cæterorũ more. Ob id etiam vulgus tragacantha flavam antidoto aureæ Alexandri, antidoto Hadriani & diacucurme maiori & aliis quibusdam cõpositis miscent, quæ calida sunt præsertim vbi cocta sunt, & vt dicũt fermẽtata, post annum scilicet dimidiũ: aliis verò frigidis aut tẽperatis albam aut pallidam.

METALLICORVM ET TER-
reorum *delectus.*

AVRVM & argētū indice lapide explo-
rātur & probantur, colore scilicet fla-
uo in lapide relicto. Igni quoq; & aliis ex-
plorantur fabris aurariis.

Lithargyros auri omnium optima, præci-
puè foliata, aureo colore. Liquatur vt cæra
sed non mox, vt lib. sequente in liquatione
audies, materiæ solius in emplastris rationē
obtinēt, seruatur vase vitreo, plumbeo, stan-
neo, argenteo, siquidem aliam omnem ma-
teriam exedit, & desuere facit Diosc.

Lithargyros argēti & plūbi deterior. Est
autem horum metallorū se igni purgantū
vitium, seu fumescentium sūma.

Arsenicum, id est auri pigmentum opti-
mum est, aureo colore, nulli materiæ per-
mixtum, crustosum, & in squāmas tanquam
bractæolas fissile. Alterum globosum, glan-
dis effigie, pallidum, & colore sandaracha
imitans, vtrunque causticum est. In eisdem
metallicis fodinis quibus sandaracha gigni-
tur, in Ponto & Cappadocia.

Sandaracha arsenico affinis natalibus &
natura, quin & in eam arsenicum vstione
degenerat: ob id auri pigmentum & arseni-
cum rubrum quibusdam dicitur, probatur
colore rufo, saturatior ceu cinnabaris ru-
bro,

bro, sulfuris virus redolens, friabilis, aliena materia carens, causticū est. Ne ergo post-hac sandarachæ nomine gummi iuniperi ac ctipias in compositionibus Græcorum.

Aes vstum probatur rubrum, & quod tri-
tum colore cinnabarim imitatur, nigrū ve-
rò plusquam decet exustum est. *Dios.*

Squamma æris laudatur crassa, rufa præ-
sertim si aceti respersu æruginem cōtrahat. *Ibidem.*

Flos æris ære fuso & aqua effusa exilit subito, milii effigie & numero, optimus est-
brevis, grauis, splendens, cum teritur rufus,
friabilis, adulteratur æris squamma aut lima-
tura, sed hæc dentibus dilatatur.

Diphryges quasi bis coctum, est perfecti
æris velut fex subsidens & cohærens imæ
fornacum parti, ablato ære visitur, acre
est vt æs vstum, præfertur quod saporem
æris & æruginis habet, astringens & ve-
hementer siccans linguam, quod exusta
ochra sibi non vendicat, quæ tamen di-
phrygis vice venditur, adulteratur enim
ochra vsta.

Scoria est metallorum omniū velut ster-
cus, scoria plumbi optima est, densa fractu
contumax, cerussam plane repræsentans, ni-
hil plumbosum habens, ad luteum colorem
accedens, vitri splendorem imitatnr.

Aerugo est æris velut rubigo, acris est &

mordax & caustica.

Flos æris Guidoni & sæpè idiotis aliis male dicitur.

Aerugo sincera cōpressū digitorū diffunditur, dentium quoq; appressū cedit, laevis est ac æqualis & sine asperitate post fossilē præfertur rasilis nobis hodie sola in vñ.

Sori, chalcitis, misy, & ex transmissa per hæc aqua & siccata, chalcāthum acris sunt, & vrendo escharas inducunt.

Sori in fodina infimum, crassissimum, lapidosius, vehementius compactum, in humore nō liquefcit, friando nigrius ceu melanteria apparet ac scintillat vt misy, in multa foramina dehiscit, olfactu & gustatu virus olet, subpingue astringens est.

Misy summum grumosum & frustulosum magis est durum, auro simile, & friando auri colorem repræsentans, & stellæ modo splendens, ægre liquefcit. Cypriū ad ocularia medicamenta optimum, ad cætera remedia Aegyptium efficacius. Diosc.

Chalcitis situ & natura horum media, æri similis, friabilis, non lapidosa, nec inueterata intercusantibus oblongis venis splendētib; promptissimè liquefcit.

Chalcanthū optimum est molle, concretum, graue, cæruleum, translucens, quale est stillatiū cōcretitio & coctili præstantius.

Me l

Melateria præstat sulfuris colore, lævis, pura, æquabilis, aquæ contactu confestim nigrescens, misyos modo caustica. Diosc.

Cadmia fornacaria melior est botrytis, id est, racemosa, in summo fornacis ærariæ affixa, densa, modicè grauis, in læuitatē magis inclinans, colore spodii, & quæ fracta cinerulenta & æruginosa est.

Cadmia, lapis calaminaris vulgo dicitur, cuius puluere æs rubrum pallore tingunt & augment etiā hodie fabri ærarii. Is alieno sapore madēti est, & in farinā tritus, aceto subactus, in sole siccatus coit in lapidē, in igne manet & fuliginem edit luteam vel æream, quæ lapidi cuidam in lapidum fodinis inuenito à nonnullis male pro cadmia supposito non conueniunt. Diosc. Id quod dum fit, pompholyx ceu fuligo quædam alba, tenuis summæ fornacis cameræ adhærens parietibusque ac tectis & spodos illi persimilis, sed grauior, in pauimentum recidit. Vtriusq; magnam nobis copiam suppeditant fornaces ærariæ Parisiis, in via diui Martini, propè Budæi, piè vita functi, ædes.

Cerussa olim Rhodiaca Corinthia, & quæ Puteolis in Italia fiebat, cæteris albior, leuior, tenuiorum partiū, ad emplastra alba maximè commendabatur.

Sulfur viuum est optimum præsertim si-

nitedulæ seu fulguris modo splendeat & per luceat, nec sit lapidosum, vltum verò est melius virens ac præpingue.

Sulfur enim ignem expertum, quo virentius, oleosius, pinguius, eo melius.

Alumen scissile non in fila tantum sed digitis friabile, vulgo plumæ, omnium substantia est tenuissimum & pretiosissimum, aquæ innatat linguæ, & cui integræ mordacissimum, igni liquatur vt alia alumina: quibus notis tribus ab amantho lapide proprio supponi solito facile secernitur. Liquidum maximè crassarum est partium & vili simi pretii, quia in omnibus regionibus inuentu est facile, crustè & lateris figura: quia facile opinor liquatur, liquidum dicitur.

Rotundum & astragali figura in medio est amborum.

Gypsum vtendo seu vt vocant coquendo, vt petra in calcem vrendo coquitur. sit emplasticum: vltum verò prætereà vt cùm in fornace & camino lapides iungit, aut calcinatum vt vocant, minus est emplasticum.

Spuma nitri, aphrolitum, nitrum videri desierat, nec probo salei petrae ipsorum loco medicamenti misceri: mallet nitrum candidum, quod mihi ex agro Nauarræ datum est, minimum, salsum.

Nitrum præstatius est album rubro per.
mi

mistum, lucidum in fracturis laminosum, fragile, læue, spongiosum, salsum, mordax, naturale.

Sal fossitius, vulgo sal gēma, quibusdam videtur, sed Mesuæ sal naphthicus, omnium valentissimus, secundo loco sal gemma, tertio mineralis, infirmissimus est marinus.

Sal armeniacus, Ammoniacus quoque Dioscoridi & Galeno dici videtur, subacer est ac leuissimus.

Stinmi vel stibium vulgo antimonium, *Dios.* optimum, splendidissimum, & modo nitedularum emicans, confractu crustosum, terræ & sordium expers, friabilè.

Chrysocola laudatissima est armeniacæ, colorem porri quàm similitimum redens, pura, terræ & calculorum expers. *Dios.*

Cyanus, in cuius fracturis velut stellæ quædam aureæ scintillant, vnde lapis stellatus Mesuæ dicitur, & vstione fit ceruleus magis: probatur maximè saturatus colore nominis sui Diosc. Mesuæ verò est colore viridior & ceruleus, maculis aureis interceptus, grauis, metallorum expers.

Armenius lapis præfertur læuis, perquam equabilis, calculi expers, colore ceruleo friabilis Diosc. colore ex viridi obscurus, terreus, & indus, maculis viridibus & nigris distinctus, attactu læuis, & asperitatis expers

nondum exacte lapis, sed friabilis & pulueratu facilis Mesf.

Ochra eligenda leuissima, & omnino lota, friabilis, non lapidosa, vritur & lauatur vt cadmia. Diosc.

Lapidum in medicamentis Græcorum rarissimus est vsus.

Iaspidem viridem Gal. omnem iaspidem medicamentosum tradit Diosc.

Arabes quoq; compositis quibusdam cardiis saphyros, hyacinthos, granatos, sardines, margaritas commendat. De his Albertus magnus, Serapio & alii plerique multa prodiderunt, quam vere æstimato.

Diosc. Hæmatites probatur friabilis, saturato colore, niger, durus, & suapte natura aqualis, nulla sorde admista, nulloque zonarum discursu.

Diosc. Magnes ferrum prompte trahat, sit colore ad cæruleum vergente, densus, nec admodum grauis.

Lapis iudaicus metæ striatæ forma, tener & friabilis.

Corallus lapis Actuarius dicitur, aliis arbor lapidosa, ruber & niger est Diosc. Nobis etiam albus & aliter coloratus. Visus mihi foris albus, intus ruber.

Sigillum Lemnium, in placentulas quoddam exiguas formatum characteribus turcicis

cis signatum, colore nunc pallido, nūc rufo, sapore parum astringente.

Bolus armenia colore ochra idest pallida vel lutea, prōptissimē in summū lauorē calcis modo soluitur pistillo, aut quouis liquore, arenosa substātia caret. Tā calide hęc vt sigillū Lēniū & alia pleraq; adulterātur hodie vt pro veris recipiēda nō sint, nisi ab eo qui collegerit, fides sinceritatis fiat.

PARTIVM AB ANIMALIBVS

sumptarum delectus.

SANGVIS hirci quadrimi, bene habiti, aliquandiu nutriti vino albo & herbis, calculum frangentibus, vt fœniculo, seseli, lauro, augusto mēse iugulati, medius effluēs eligatur: nā primus tenuior, postremus crassior putatur. Vase vitreo receptus, linteo raro tectus, sole siccetur.

Sanguis draconis veterum, hodie ignoratur. Qui verò ostenditur, factitius est ex hirci sanguine, bolo armenia, & succo sorborum vel aliis.

Lac vaccæ, capræ, asinæ iuuenis, aliquandiu post partum exercitæ, & bene pastæ præsertim idoneis sibi pascuis, vernum largius sed humidius, aut autumnale partius siccius, & butyro diu seruando aptius, sit autē quatenus lacti datum est, dulcissimum, albissimū,

nam, cōsistentia mediocri, si vaccinum est: tenuiori, si alinum vel caprinum.

Serū lactis capræ iuuenis nigra, salubribus alimentis nutrita paulò antè siccæ præfertur Mesuæ, secundas tenet serum lactis ouini.

Adeps ex animali floreute autumnoletus, reponitur vel incuratus, lotus, siccatus in umbra, vel exemptis pelliculis fusus sole vel igni, in vase duplici.

Alii tosto in verni animali cadetē excipiūt.

Medulla ut adeps sumiatur à fine ætatis, ad huius initium, ex floreute animali: & reponatur loco sicco & edito, & septentrionē spectante: reponatur cum foliis lauri siccis, ne putrescat, aut situm ducat. Recens etiam tenerorum animalium usurpatur.

Cerebella passerum vere & autumnocaptorum reponuntur, cum vitello oui & melle, vel sole aut cinere siccata legitimum.

Cornu Rhinocerotis eligatur.

Mumia Serapionis, cum sit Dioscoridis pissaspalum, id est pix & bitumen, ex horum notis noscitur. Quod verò nobis homodie est mumia, liquamen est hominū aloē, myrrha, & si datur balsamo in sepulchrocōditorum. Carnes enim cum humanis ossibus retorridæ ad nos afferuntur.

Cunicum interiorem ventriculi gallinarum

rum quia inutilem confirmat Galenus, de *Dios.*
illa ne labora.

Iecur lupi si potes florentis, & bene habi-
ti, aut etiam teneri potius, & recens quam
siccatum est præstantius. Potest tamẽ sicca-
tum in multos dies seruari, vt pulmo vulpis.

Renes scincorum, qui crocodili sunt ter-
restres, siccati seruentur, corpulenti & non
strigosi.

Castorium elige, id est castoris testes, *Dios.*
qui ex vno principio committuntur, & qui-
bus est intus liquor cerosus, friabilis, odore
gravi, & virus olente, gustu æri & morda-
ci, recens tamen melius veteri quibusdã est.
Nigrum autẽ foetidũ, rancidũ, die vno ne-
ce sumptum affirmat Auicenna de venenis.

Oesypus, id est succidarum lanarum pin-
guitudo seruetur purus, ex ouibus integris
non scabiosis. Hyssopus humida ineptẽ vul-
go dicitur.

Ambra quam habeat originem ignora-
tur adhuc: præstantissima tamen fuerit rara,
leuis, habitu rha Barbari, sed fusca magis in-
terdũ & cineritia & alba, odoris gratia mul-
tũ commẽdabilis, nigra autem reicienda, &
quam vulpes deuorant & vomuerint.

Moschus melior est subflauus quã nigri-
cans, & qui pelui humectatẽ immixtus leuior
euadat, quam qui grauior. Ex Catay tamẽ
nig

niger præstantissimus hodie affertur. Ferrugineus fere est noster, non quem Auicenna probat citrinus, Alexandrinum vocans, est odore in opum Cyrenaicum inclinare sed valentiore, præter summam aliam in eo fragrantiam glebulis exiguis constat, seruat melius pyxide plumbea cera obturata per se, si autem odoris gratiam perdidit, reponere vase vitreo aperto, & suspende in cloaca, sic enim recuperabit, si Plateario credimus.

Dios.

Cantharides probantur in frumento inuētæ, versicolores, & quæ luteas in alis trāsuersas habēt lineas corpore lōgo, crasso, præpingues. Sed inertes ac imbecillæ quæ vnius sunt coloris. Capiantur vere, & phiala seruentur: necentur autem vt iubet Diosc.

Mesues.

Gallus ad ius purgatorium, eligatur, rufus, plurimum annosus, sed tamen adhuc ad motum, pugnam, coitum, alacer: & in dimicando validus, macri & pinguis medius hoc est bene carnosus præparatio autem eius ex Mesue repetenda.

Vnguis odoratus, Blatus Bizantis A Ctuario, blatta bizantia vulgo, conchyli tegumentum est odore castorium referente, ad suffitus idoneum, ipsa enim testa mox liquatur igni bituminis modo, quod etiam improbe ipsa olet, quidam albicantem odoratam

tam

tam magis commendant.

Vniones seu margaritæ ex quodam concharum genere auulsi, sint corpulenti, integri, non perforati. Sunt qui à natura perforatos præferant, quod per foramen excrementis sint purgatæ.

De viperarum delectu lib. 4. nostræ methodi in theriaces compositione, quantum satis est diximus.

Ladanum sit nigrum, molle, glutinosum, graue, odoratum, friabile autem vetustate elanguit.

Ex prædictis aromata sunt, amomum, cinamomum, cassia, calamus odoratus, nardus Gallica & Indica, partes, balsami, crocus, folium, folium malobathri, ladanū, aspalathū, xylaloë, macer & recentioribus Ambra, moschus, vnguis odoratus, caphura, cubebæ, doricum, galanga, caryophyllum, macis, nuxmoschata, santalum triplex, cornu monocerotis, cedoaria. In his quæ odorata magis sunt, in suo genere sunt præstantiora. Saporem autem si explorabis, permulta continenter ne gusta, sed vel os interea ablue, vel papyrus mande, vel tempus interpone, donec prioris aromatis sapor exoleuerit, vt non prioris reliquæ iudicium tibi falsum afferant posterioris aromatis. Hæc cū sint essentia tenuioris, celerius examinatur, præfer-

rima aëre calido, parum fideliter operculata & inuoluta, aut etiam iam comminuta. Ob id vtenda cum vigentissima sunt, nondum verò cariosa, foraminulenta, exoleta, exanimata, emortua.

Ex his item purgentia sunt agaricum, colocynthis, cucumer agrestis, helleborus vterq;, rithymali, daphnoides, opopanax polypodium, sagapenum, sarcocolla, dracunculus, scammonium, euphorbiū, cassia fistula, myrobalanus quintuplex. Hermodactylus, lapis cyaneus & armenus, manna, rha barbarum Thamar indi, turbith, senna, & alia quædā Mesuæ & alius tardita.

Quæ maiore cura & studio sunt deligenda, reponenda & seruanda: & quæ vi malefica sunt prædita, castiganda, vñ libro, sequenti diceraus.

Adulteria, quod in primis ad delectum conferant, ob id in hunc librum reieci, eaq; simplicibus ipsis dolo mentis ascriptis, ne longius lectori disquirenda essent: fusius tamen hæc ipsa persequi non placuit ob dictas à nobis causas libro. 3. methodi inedicamenta componendi, vnde in hunc librum si qua de adulteratorum notis desiderabis, transferre potes.

Super est in hoc etiam primo describere, & analogæ quæ vocant, & antiballomena, quæ

quòd hæc ambo non parum ad medicamen-
torum delectum commodare existimem,
vt libro sequenti agamus tantum de multi-
plici pæparatione medicamentorū simpliciu
ad compositionem vtili, vel etiā necessariā.

Cum nomē alicuius simplicis medicamē-
ti commune multis scribitur sine additione,
quod ex illis intelligēdū sit, quia insignitis
vel rei propositæ aptius, vt ammi, anisum,
anethum, apium, cnicus, cuminū, gith, lybittū
cum, nasturtiū, psylliū, seseli, staphis agriā,
semine sunt efficaciora. Ergo apiū, ammi,
anisum, anethum, id est semen. Ad hæc, ani-
sum Creticum, ammi Illyricum, melius.

Aloë optima qualis Gal. Indica, Mesue suc-
cotrina.

Acetum ex vino: Nam ex hydromelitæ, cer-
uisia, & aliis fit, sed inefficacius.

Agaricum, album & scæmininū, & qui notas
omnes optimi agarici à nobis prius scri-
ptas habeat, & in cæteris similiter.

Agnus, flos aut etiā semen.

Alumen scissile, quia præstantissimum.

Aristolochia rotūda. In vnguentis verò cle-
matitis.

Amomum scythicum, & cum notis scriptis.

Balsamum, opobalsamum.

Bryonia alba, potior quam nigra.

Buglosum vtrunque, id est, folia & flores.

Cassia vel cassia in libris Græcorum, nostrū
vulgare cinnamomum, quæ in libris Ara-
bum cassia lignea dicitur.

Cassia verò fistula ponitur quando medica-
mentum Arabum est purgatorium.

Cardamomum, minus.

Capparis, cortex radiceis.

Coriādrum, Cuminum Aethyopicū, semē.

Centaureum, in purgantibus, minus: in aliis
maius.

Calaminthe montana: quia efficacior do-
mestica.

Costus cum reuera vnus sit generis ambi-
guitatem nō habet: Radix autem eliga-
tur: Nam dulcis costus arabū ignoratur.

Cypressus, pilulæ eius seu nuces recentes.

Cinnamomum, optimum & cum notis ante
scriptis.

Daucus, agrestis. Nam satius est pastinaca,
alimentum potius quàm medicamentum.

Helleborus albus Galeno, Niger Mesue.

Eruca, si luestris quia efficacior.

Epithymum Atticum Græcis. Arabicū Ara-
bicis compositionibus vsurpandum.

Fœniculus, semen: sed in colyriis, succus fo-
liorum aut radicum.

Galla, solida: quia efficacior, quā perforata.

Granatum, acidum.

Gummi, Arabicum. Id enim omnium per-
fec

fectissimum.

Gluten, ichthyocolla his, aliis taurocolla;
aliis mastiche intelligitur.

Hyssopus, montana hortensu melior. Cili-
ciam Dios. creticam alii laudant.

Hyoscyamus, albus seu album eius semen.

Iris, radix ireos Illicicæ. Græcis, neotericis,
florentinæ.

Lupinus, amarus, Nam dulcis esculentus est.
Laurus, folia.

Ligusticum, semen.

Lactuca, semen: sed in victus ratione, folia.

Lapathum, oxylapathu efficacius rotundo.

Lithargyrus, auri, quod aliquando tamen
exprimitur.

Mastiche, Chia: aliis etiam Aegyptia.

Marrubium, album præstantius nigro.

Mel apum, Alterum æromeli, seu manna.

Margaritæ, solidæ meliores pertusis, nisi
etiam sint flauæ, obscuræ: quia tunc soli-
dis sunt pares.

Medulla ceruina in valenti medicamento:
in mitiori, vitulina.

Nuclei pini: aliis oliuæ, dactyli Auicenne.

Nux iuglans, vsualis vulgo & communis.

Nasturtium, semen.

Oleum, oliuum, ex oliuis expressum.

Ozimum, in arabibus Caryophyllatum.

Opum, Thebaicum, Tamen Apulum etiam

hodie celebrari audio.

Petroselinū, Macedonicū: & in hoc aſtreo-
ticum, à loco in Macedonia vbi creſcit
optimū in præruptis: & huius maxime
ſemen.

Pruna, ſi aluus deicienda eſt, ducta: ſi aſtrin-
genda, acerbata vel aſſetera.

Papauer album, ſemen.

Piper album, quia acris.

Pix liquida in ſuppurantibus & tergentibus
medicamentis, ſicca: in ſiccantibus epulo-
ticis, glutinantibus.

Pæonia maſ, ſeu ipſius radix, vel ſemen.

Polypodium quernum, murale alii.

Polium, in antidotis, minus ſeu montanum
quia acrius, amaius, ob id efficacius.

Quatuor emollientia, malua, althæa, viola
nigra, acanthus.

Quatuor ſemina frigida maiora, melonum,
cucumeris, cucurbitæ, citruli.

Quatuor ſemina frigida minora, laſuca,
poſtulacæ, Intybi, eichorii.

Quatuor ſemina calida maiora, cumini, ca-
ri, aniſi, fœniculi.

Quatuor ſemina calida minora, apii, dauci,
ameos, amomi.

Quinque radices vreticæ, id eſt vrinam mo-
uentes, apii, petroſelini, aſparagi, grami-
nis, ruſci ſeu apii, veri & eleoſelini.

Ref

Resina, Galeno mactiche: Dioscoridi terebinthina.

Ruta, folia rutæ agrestis, sed fere à Grecis exprimitur, aut alio nomine vocatur. scilicet molybesa hermolao.

Raphanus, siluestris radix.

Rosmarinus, flos aut folia.

Rhus cortex fructus, sumach dicti.

Stœchas, stœchados Arabicæ flos.

Styrax calamites, si habere possit, aut saltē calidissimus & vegetissimus.

Santalum, flauum, quia odoratius.

Spica nardi Indicæ.

Sulfur vinum, & igni non exustum.

Tragacantha alba, in frigidis compositionibus: rufa in calidis miscetur.

Tres flores cordiales, violarum, buglossi vtriusque.

Thymū Atticū, aut ex locis editis & siccis.

Viola nigra, seu purpurea: vulgo martia & quadragesimalis: recens si haberi potest, folia: si emolliendum est, flos: si corroborandum, semen: si purgandum.

Viscum quernum, ipsius baccae recentis, aut recentis summa germina cum foliis & cortice.

Zizipha seu iuiubæ, recentia & bene matura, aut saltem integra, non putria aut vetustate exucca.

In summa, intelligantur omnia suis notis
prius dictis omnibus absoluta inter quas
etiam ratio regionis ubi medicamentum
educatum est habebatur, Ob id,

| | | |
|----------------------------|------------|-----------------|
| Alumen, Mileſium | Aniſum | } Cre- ticū. |
| Agaricus, Ponticus | Thymum | |
| Caſtorium, Pōticum | Daucus | |
| Miſy, Cyprinum | Amaracus | |
| Nitrum, Berenicium | Glycyrriza | |
| Sinnon, Syriacus | Organum | } |
| Cuminū, Hiſpanū & Diſtanus | | |
| Aethiopicum | | |

Meum, Hiſpanum & Macedonicum

Ariſtolochia, Pontica vel potius Cretica

Phu, Ponticum

Erugo, ceruſſa, æs, æris ſquamma, ex Puteo
lis vrbe Italiae.

Lithargyros, optima Romana & Sicula.

Antiballomena ſeu medicamenta in locum
alterius deſiderati ſuppoſititia, magis cō
ſentanea rationi ſunt loco

Aquæ pluuiæ, aqua fontana pura,

Acaciæ, ſuccus & caro prunellorū agreſtiū.

Aſari, acorus vel carpeſium.

Abſinthii, Abrotanum.

Acāthæ Arabiæ ſeu Aegyptiæ herbæ (quæ
ſucaha dicitur Serapioni) acantha leuco
noſtras, eidem dicta bedegar.

Alcacabi, ſemen ſolani.

Aſp

- Asphalthi, pix liquida Brutia.
Aethyopicæ oleæ lachrimę. i. gummi elem-
nii, gummi acacię seu gummi Arabicum.
Anchusæ, hyacinthus.
Amyti, sicca farina.
Arsenici sandaracha.
Amygdali amari, absinthium.
Aristolochiæ cuiusuis, vna ex tribus.
Adipis vulpini, vrlinus.
Adipis ceruini, anserinus.
Aluminis, sal fofsitius.
Balaustii vice, malicorium.
Buccinorum, ostreorum testa vsta.
Balsami liquoris, myrrha stacte vel caphu-
relæon.
Cinamomi loco, casia optimæ, vel carpe-
sii, vel amomi, vel seminis cardamomi,
sabinæ duplum.
Casia, seu casia corticis, cinamomū etiam
ignobile, nisi optima casia requiratur
quæ cinamomo est proxima, vel nardus
indica, vel malobathri solum.
Chamæmeli florum, duplum foliorum &
radicum,
Costi, pyrethri dimidium, vel baccæ cedri,
vel radix helenii vel ireos.
Cimoliæ terræ, retrimētum ferri & molæ.
Cerusæ, spodium, pompholix.
Caphuræ rei incognitæ & sapore ingrata,

santala alba & rubra.

Cardamomi maioris, minus : Calaminthe
omnis, mētastrū, pulegiū similia sunt facul
tatibus: ob id invicem sunt antubal lomena.

Croci, crocomagma:

Cyperī, juniperus maior.

Cumini semen, ruta vel agni.

Colocythidis, semen ricini.

Capparis radicis corticis, cortex radicis Ta
maricis vel erice:

Di&ammi loco, salvia, vel nepitha, vel pule

Doronici, caryophylli dimidiū. (gium.

Dauci, pastinaca.

Elateri vice, succus foliorū cucumeris agre
stis.

Ebeni, lignū gajaci.

Eupatorii Mesuæ, asari & absinthii ana di
midium.

Folii loco, folium caryophylli, vel nardus
indica, vel casia, vel macis.

Ferruginis, squamma ferri.

Fimi palumbis, fimus columbæ.

Fellis suilli, fel perdicis, vel piscium.

Gentianæ loco, asari & radicis capparis ana
dimidium.

Glycyrrhiæ succi, pulvis radicis.

Gnidii cocci, semen lathyridis.

Galbani, sagapenum.

Ammoniaci loco, propolis.

Her

Hermodactyli, folium anchusæ, & dimidium bdellii foris adinouetur dolentibus iuncturis.

Hederæ, gummi perfici.

Iridis Illyricæ loco, helenium odoratum.

Lapidis Afsii, gagates.

Lapidis phrygii, magnes, pyrites.

Libyftici feminis, semen dauci.

Lanariæ radicis, radix Veratri nigri.

Lycii, succus radicis centaurii magni.

Mellis loco, saccharum.

Malobathri, cāfia, nardus Indica.

Myrrhæ, smyrnium.

Myrrhæ Troglodyticæ, calamus odoratus.

Marrubii, melissophyllum.

Mespili tricoccia, id est, azaroli, mespilum

nostras quinque ofsibus præditum.

Nasturtii feminis loco, folia eius sicca.

Nucis moschata, spica nardi.

Nardi syriacæ, iuncus odoratus seu schœ-

nanthum.

Opopanacis loco, ammoniacum, galbanū,

sagapenum, bdellium.

Opii, meconium.

Ozimi caryophyllati, melissa in affectibus

cordis.

Olei laurini, oleum cedrinum, vel cicinū.

Olei omphacini, ablutum oleum dulce.

Olei rosati, violatum, amygdalinum.

Ole

- Olei cicini seu ricinini, raphaninum.
Opobalsami, apocalpason, vel myrrha sta-
cta.
Orizæ, farina hordei.
Oesypi, medulla cerui.
Omphacii, succus rhois, id est sumach, vel vi-
num austetum.
Piperis longi loco, album.
Piperis albi nigrum optimum, id est graui-
ssimum.
Petroselini Macedonici in Theriaca, alte-
rius regionis petroselinum.
Pompholygis, spodium & antispodium.
Rubiginis loco, scorïa ferri.
Raphani seminis, succus.
Rosarum, flos ipsarum.
Rhois coriarii, rhus obsoniorum.
Staphydis agriæ loco, pyrethrum.
Struthii in sternutamentis helleborus albus.
Spodii antispodium aliquod, pompholix.
Syracis, castorium, nisi odor quæratur.
Salis indi, saccharum candefactum.
Sagapeni, ammoniacum.
Spumæ nitri, nitrum, aphrolitrum, modo
non sit in corpus recipiendum.
Sulphuris viui, coctum & vstum.
Satyrii, semen erucæ, scincus.
Sinapis, cardamomum, vel cardamum.
Scammonii, ricinus.

Stibii contusi , squamma æris , stannum
vstum.

Sepiæ ofsis, pumex.

Scillæ, pancratium.

Terebinthinæ loco , larix seu laricea re-
sina.

Thapsiæ succi, cardami vel erucae semen fo-
ris, adhibetur.

Veratri albi loco, nigrum.

Vini salerni, quoduis fuluum, tenue, perlu-
cens, odorum vehementer.

Zingiberis loco , pyrethrum foris adhi-
betur.

Quia autē ratione pro desideratis istis,
alia hic ascripta supponi possunt: ita & con-
trā si quod horum suppositiorū desidere-
tur & aliorū est potestas, in horū vicem po-
nētur, potest quivis alia multò plura pro va-
riis locis & effectibus & hominū proprieta-
te facere antiballomena, sed nolim pharma-
copœo licere vel clementissimum mutare
sine docti medici consilio, ne audaculus fiat
etiā in aliis. Quomodo enim pluris est rex
ipse quam prorex: sic maiorū est virium &
cōpositioni propositæ aptius simplex quod
à maioribus est ascriptū, quàm quod illius
pœnuria supponitur. Sit itaque religiosus &
formidolosus in his permutationibus tam
medicus quàm pharmacopœus.

De

DE MEDICA- MENTORVM SIM-

PLICIVM PRAEPARA-
TIONE; LIBER
SECVNDVS.



AE C. pharmacopœe
pars vilis & hominis
eruditi ingenio indi-
gna nemini debet vi-
deri, cū medicamēto-
rū cōpositorū faculta-
tes propemodū totæ
ab hac proficiscantur.

Quæ enim vis, q̃s vsus simplicium medicamē-
torū citra triturā, coctionē, infusionē, & alia
pluraq; post dicēda esse possit: Quæ nūllto
ad cōpositionē omnino necessaria sine his
præparationū modis fiat: Quā autē faculta-
tes nō simplicium modò, sed etiā cōpositorū,
variēt, vel sola præparādi ratione tā apertā
postea cōdisces, vt neq; testibus, neq; demō-
stratiōe lōga opus sit. Quoq; difficilius fuit
rē à nemine hactenus notatā ceu nouā exci-
tare, & in hominū manus & animos ponere:
ed mea sentētia erit & præclarior. Quāquā
enim Hippocrates, Galenus, aliiq; celebres
medici, vt interim empiricos taceā, leuiter
fimo

simplicium medicamentorum quorundam præparationem attigerunt, & nonnullos se priores medicos de præparandi ratione quædam scripsisse testetur Galenus: tamen nullus hodie extat quæ sciam, qui hac de re aliquid memoria dignum absoluerit: præterquam quod pauca quædam, sed tamen legi dignissima, de quatuor præparandi generibus, tritura, coctione, vitione, infusione, Mesues in sua methodo deligendi medicamenta purgatoria & castigandi perstrinxit. Nam quæ seruator nescio quis partim ex Dioscoride deprauauit, partim ex indoctis collegit quis seruat?

His nos rationibus commoti ex Hippocrate, Dioscoride, Galeno, aliisque permultis quorundam simplicium præparationes passim dispersas, in ordinem congeessimus, multas ipsi & inuenimus, & experti sumus, & à doctissimis hac ætate pharmacopœis didicimus. Quæ dum à nobis stilo mediocri scripta legis cædide lector, tecum reputa nos rudibus introducendis hæc scribere, quorum captui seruire, malui res nudas docere, quam singulorum rationem prolixius asserre: quauis & id ad rem propositam felicius absoluendam, plurimum pertinere videatur. Porro præparationem exequi statui medicamentorum simplicium tantum, non aliarum etiam rerum per quas omnes, præparationis ratio & virtus spargitur: vt
nib

nihil à natura gignatur, augeatur, aut alio quouis modo moueatur citra præparationē: nihil artes tã mechanicæ, quàm aliæ omnes tentant non adhibita prius præparatione aliqua, per quam ars sæpè naturam vincere videtur.

Medicamenta præparare est, ipsa per artem vsui vel cõpositioni cõmodiora reddere, hoc est vel mitiora, vel valentiora, vel graviora, vel salubriora, vel magis miscibilia, & vt paucis dicam, meliora vel ad vtendum vel ad componendum. Quædam enim vbi à nobis sunt præparata, etiam citra compositionem mox vsurpamus. Plurima autẽ præparata ante vsum ad compositionem veniunt. Ad præparationis quoq; vim (de qua paulò post dicam fusius) reducendum putamus cum vnam medicamēti facultatem nobis in præsens noxiam tollimus, vel optatã detegimus, vel nouam acquirimus.

At verò medicamēta omnis generis metallica in quã plantas, animantia, vel ex iisdẽ sæpè alimēta, paramus interdum adhuc viuētia frequētius emortua. Terrã enim lemniã (quæ dum adhuc in colle est ex quo effoditur, velut in matre viuere videtur) sacerdos Dianæ dum sumit sparso tritico & hordeopiamēta ritu patrio faciens præparare videtur, vt hinc magnam virium suarum parte,

nisi

*Lib. 9.
simpl.*

nisi etiam vires suas omnes consequi putetur. Nonne arsenicum in sandarachā & fori in chalcitin, chalcitis in misy promptius in vena ipsa transibit si specum ipsum soli meridiano aperueris? Ratione eadē vomica hydragryri si in solem erumpat tenuior euaserit, & sulfur in vesuuiο vel alio mōte vstum minus quidem oleosum sed tenuius euadit. Annon longa & asperrima hieme, qua ventres ac viscera terrae plus calidi habēt, metalla omnia largius gigni & plenius augeri recipimus? Nam & mihi aureae quaedam velut arbores in durissimis quibusdam lapidibus visae sunt, & velut quaedam arbores ex auro & argento rudimenta, vt non ambigā quod doctē Augerellus in chrysopoeia scripsit, metalla in momenta gigni, nutrirī, augeri, perfici, etiam si puteus Hannibalis, & metalla Iluæ Tyrrheni maris insulae inexhausta, & alia pleraque huius rei testimonia dare, fidemque facere poterant.

In fossam super collem in Cypro pluuia *Lib. 9.*
recepta per venam misyos, chalciteos, so. *simpl.*
reos transfusa in specum subditum, quaedam est chalcanthi praeparatio aut verius generatio.

Viuentem raphanum insertis in eius radicem fibris aliquot hellebori nigri, purgatricem facimus, & fructus arborum purga-

torios scarificato ipsarum cortice quo tempore salua conscendit & immisso in plagas canonicis scammonio ceraque super vulnus data & uniuersa de ligata.

libus.

Tempus prætereà expectamus idoneum donec matura sint vel vigetia, vel sicca quæ lecturi sumus, & cælum plantæ præcipitium, sæpè etiam lunæ quadraturas spectamus, vt efficacior sit planta tunc collecta. Dum arbores ablaqueamus, dū vites putamus, propagamus, sarrimus, decacuinamus, festucamus: harum plantarū fructus non modo vberiores, sed etiam meliores reddimus.

Idonea victus ratione nutricis lac præparamus, vbi nutritius affectu aliquo laborat, quomodo & asinum Galenus libro, 7. Meth. & vaccinum recessu Tabularum lib. 3. a. bro. Meth. quinto. Porcos, capros, arietes, tauros iuuenescitramus, vt eorum caro sit suauior, plenior alimenti, coctu faciliior.

Lib. 3. a. 4.

Glandulæ mammarum præsertim vaccinarum & suillarum dum lacte suo tument, meliores quam exucae: vnde & sume porca: recens foetæ à ganeonibus laudatum legitur.

Ibidem.

Coagulum in primo ventriculo animalium lacte nutritorum ex lactis corruptione genitum venatu animalis efficacius euadit,

dit, vt animalium p̄ope omnium, non solum ferorum caro.

Gallum veterem venatu quoque exerceamus, & meliorem ad purgandum clementer suo succo nitroso reddimus. Vulpes ætate florentes venatu multò fatigatas si bene habitas, si oleo incoquimus, multo digerentius oleum efficimus. Si verò eas vuis impinguatas post vindemias capimus, esu sunt iucundiores.

Porci segetibus nutriti firma fiunt carne, glandibus verò præsertim faginis, laxa & fluxili & promptè liquabili.

Hircum quadrimum dum mensibus aliquot antequam iugulemus, herbis nutrimus calculum frangentibus, & vino albo generoso potamus, hoc modo sanguinem eius ad calculos in renibus præsertim comminendos efficacissimum paramus.

Cancros dum Aeschrion capiebat & vrebatur post canis ortum, sole leonem ingressò, die verò lunæ eius decimo octauo, contra rabiem hac ratione efficaciores sperabat, hocque modo præparabat.

Viperas nō mox vbi latebris erepserāt, sed iam exercitatas, iam consueto ante hiemē alimento recreatas, iam suo exiuiō inter lapidū coagmēta deposito, velut rediuuias Galenus vult capi, sicque præparare incipit.

Pullas & capos iure & carne viperarum cum pane subactis nutriuit Matthæus Gradi. ad vsque deplumationem curaturus horum esu elephanticos.

Lib. 3. ali. Gallinacius pane in lac acidum & ferosum merso si ante nutrimus quā iugulemus, vt testes habeant gratissimos & præstantissimos, & si ante coctum ne virus ex femine oleant. Sic enim boni sunt succi, valide nutriunt, facillè coquentur ibidem.

Hepar *ouo 7^{ap}*, id est ficatum præsertim suum ficis siccis multis nutritorum est præstantissimum, sic pastum iecur anseris albi, seu iecur anseris nutriti alimentis lacte imbutis suauius, coctū facilius, melioris succi.

Ibidem. Capra aut aliud animal scammoniū aut tithymalos depastum, lac reddit phlegmogogum, & quod aluo pituitam deducat.

Stercus pueri ad anginam idoneis alimentis, & sterus canis ad alia esu ossium in viuis ipsis animalibus præparamus, & alia in his generibus plurima. Sed ad hæc rem hæc sufficiant ad probandum quædam nos cum natura viuus adhuc medicamenti præparare. Cū verò hæc præparandi ratio, licet sit efficacior, tamen haud ita crebro in vsum venit, vt fortasse quis etiam præparationis nomine non esse accipiendam contendere possit: ob id de altera eius specie agamus,

Ibidem.

Lib. 3.

aliud.

Lib. 2.

simpl.

mus, quæ omnino latissimè patet in singulis medicamentorum simplicium generibus. Fit autem hæc generatim quidem additione & ablatione, nunc substantiæ nunc facultatis, nunc vtriusque, particulatim verò tritura, coctione, affatione, vstione & cæteris post scribendis.

Ad ablationem verò reduci volo separationem partium nunc simul inanentium, vt in tritura, nunc à se inuicem abeuntium vt in despumatione, destillatione, succorum & liquorum extractione.

In singulis autem differentiis quæ additio aut ablatio, aut additio & ablatio, vel substantiæ vel qualitatis, & eius vel vnius vel multiplicis fiat, abunde postea docebimus.

Nunc hæc omnes præparandi differentiæ quam facultatem habeant, & quibus modis perficiantur, singulatim dicamus, primumq; de tritura omnibus prope communi non simplicibus solis, sed etiam aliis præparationibus, postea de his quæ calore perficiuntur, deinde frigore, post hæc siccatione, Hinc humectatione & cæteris post elencho comprehensis.

DE MEDICAMENTORVM

simplicium tritura.

MEDICAMENTA teruntur, hoc est *Mesues* in comminuuntur, percussu vel friatu *canonibus*

idoneo, vt simul misceri exactius possint, vel vt facultas ipsis noua conquiratur, vel vt malefica tollatur. Quos tres terēdi sco- pos in methodo medicamenta componendi fusius explicauimus. Terendi autem mo- dus plurimum est varius. Primum quod plu- rima pistillo ferreo, æreo, plumbeo, vitreo, ligneo vel alia constante materia in mor- tario fere simili materia conflato teruntur: sed pistillus ferreus & æreus mortario fer- reo & æreo magis seruiunt: iisdem & lapi- deo & vitreo mortario etiam ligneus, sed plumbeus plūbeo, vitreus vitreo est aptior.

Secundo loco multa teruntur diu du- ra super lapidem durum, & marino-reum, porphyrium vulgò dictum: marinum, quem maris squammam vocant. Ducuntur autem simili lapide sed paruo & manu concepto, quem molulam vulgò vocamus, quodd mo- læ paruæ is effigiem habeat, vt lapis suppo- situs, magnæ.

Tertio teruntur medicamenta quædam molis, trusatilibus vel versatilibus, vt quæ- dam etiam mole trinarum molis, qui mo- dus Lugduni est frequens in terendis aro- matibus, quibus constant puluis minuta- rum specierum, & puluis selectus, quem fi- nem vocant, & alii permulti suo cuique more commisti. De hoc non sum dictu-

rus, sed de primo præsertim, & pauca de secundo.

Nec omittendum mortarii operculum saltem simplex aut etiam duplex, quale veteribus in usu fuisse in nostra componendi medicamenta methodo commemorauimus, præsertim puluerantibus. Nam humida hoc non indigere videntur. Ad trituram quæ præparandi species reducende sint, ceu ipsi affines, posterius audies: vt quod quædam rapaci serrâ comminuuntur, alia minutim conciduntur, vt promptius teri possint, vel humori cui incoquantur vires suas tradere.

Non modo autem instrumentis variat terendi modus, sed etiam ipsius percussioneis vigore & tempore, & rerum terendarum situ, & connexionione, & futura consistentia. Quædam enim per se omnino sunt terenda, alia cum aliis quibusdam, ipsorum trituram sæpe etiam facultatem iuuantibus: alia tum per se, tum cum quibusuis teri possunt, & hac omnia tenuissime vel crassius. Item quædam diu terenda sunt, alia trituram breuem vti & decoctionem sustinent. Item alia valenter tundenda, alia tantum clementer frianda, ducto per mortarium molliter & nunc celeriter nunc segniter pistillo, interdum & valenter.

Præterea attrituſq; moderato nō autē
vehementiore aut immodico ſunt verbe-
randa. Violento enim iſtu & nimis diutur-
no examinātur, viribuſq; diſſolutis lāguet,
magis tamē tenuia, rara, facultatem imbecil-
lē aut ſuperficiariā ſortita, minus contraria.

De his autem omnibuſ agam ſingula-
tim, vbi docuero quibꝯ horum modis, &
quot ſingula medicamentorum ſimplicium
genera terantur initio à radicibꝯ ſumpto.

*Communiſ-
nitritura
radicis.* Radicis ſi craſſæ ſint nec adeò ſiccæ in
particulas ſectæ, & aliis ſiccioribus partien-
latim adiectæ, multis ſcilicet pauca; pulue-
rantur cum ipſis: ſi autem ſicciores ſunt, aut
per ſe aut ſimul puluerari poſſunt ſed ante
vel cultello conciſæ, aut forſicibus aut mani-
bus fractæ, niſi ſiquas ante ad ſiccandi neceſ-
ſitatem conſyderamus in taleolas.

Diutius autem terendæ ſunt quæ craſſæ,
duræ, ſolidæ, denſæ; neruoſæ, membrano-
ſæ, & fractu contumaces, ſi in puluerem mol-
liſſimum comminui conſilium eſt. Inter-
dum enim minus teri volumus, præſertim
dum ad coctionem tantum eas apparamus.
Tales fere ſunt radix acori vtriuſq;, omnis
ariſtolochiæ, althææ, bryoniæ, coſſi, he-
nii, gentianæ, polypodii.

Parum diu verò terantur cōtrariæ, etiam
ſi leuiſſimum puluerem requiris: quales ſunt

radix calami odorati officinarū, hellebori
vtriusque, hermodactylorum, pyretri, &
mediocriter quæ in harum sunt medio ra-
dices, vt apii, asparagi turbith, behē vtriusq;,
dictamni vulgaris, doronici, fœniculi, galan-
gā, glycyrrhizę, graminis, ireos, petroselinī,
pœoniæ vtriusque, R ha barbari.

Herbæ item teruntur, nunc virides nunc
ficcæ, & ambæ vel crudæ vel coctæ, vel *Herbarū.*
crudæ semel, iterum post coctionem, id quæ
in vsus varios. Nam virides ferè teruntur
in succum vel cataplasma crudum, coctæ ve-
rò teruntur, vt vel in apozema expriman-
tur, vel in cataplasma cernantur, præsertim
si quid durum aut lignosum sint sortitæ.
At ficcæ teruntur nunc in coctionem sed ne-
gligentius: nunc in puluerem, diutius. qui-
dem crassæ, duræ, densæ, lignosæ, lentæ
minus contrariæ. Quæ dum ad consisten-
tiam qua cerni possint cribro hoc, illo pro-
scopis medicorum variis, peruenerint, teri
desinunt.

Herbæ tamen propemodum omnes an-
te vel secantur, vel manibus franguntur quàm
terantur: terunturque ferè mediocriter, &
cum foliis interdum, etiam cum floribus.
Sed tunc paulò minus diu terendæ, vt &
adiatha omnia, calaminthe, maiorana, ori-
ganum, rosmarinus, thymum, præsertim cum

hæc postrema sunt florulenta.

Florum. Flores prope omnes siccati, parum diu terendi, quia cito puluerantur, & facile puluerando exanimantur ac exhalant.

Ut crocus Nymphaeæ utriusq;

Epithymum Græci Perichymen

rum & Arabum Rosarum omnium

Genistæ flos, Schœnanthos

Leucotozum omniū, si ipsum haberi

Meliloti, possit.

Rorismarini;

Si verò cum herbis ipsis expetantur, flo-

res paulò diutius propter herbas & harum

furculos, quibus hærent adhuc, terēdi sunt,

quam si ab his essent secreti, ut absinthii co-

ma, anethi coma, abrotani coma, chama-

drys, chamæpitis, eufragia, melilotus.

Adde quodd floris nomine hoc loco ve-

nit non modo quod in medio est, magna ex

parte croci capillamentis simile, sed etiam so-

lia id ipsum ambientia, nunc alba, ut in cha-

ma melo, nymphaea alba, rosa alba & mo-

schata nunc lutea, ut in nymphaea lutea, chry-

santhemo: nunc rubra, ut in rosa rubra, in ba-

laustio: nisi quodd croci nomine tantum ca-

pillamenta (quod ea in usu sint sola) intelli-

guntur: uti & Galenus sæpe in comp. ph. p.

florem rosarum appellat, non folia illa am-

pla, sed in medio capillamenta.

Ma

Multum autem terenda sunt chiamame-
lum: quanquam id essentiae tenuis sit, quia
tamen densum est, & odore vegeto ac diu-
turno: ac etiam stœchas Arabica vulgo di-
cta, vt etiam cum primis, vt Turbith, coëpta
teri, ad postremū adhuc tenuitrita appareat,
& item heliochrysos, stœchas citri vulgo
appellata, & spica nardi, in quacunque plan-
tarum partem reponatur, etiam si prius mi-
nutissimè incidatur.

Balaustium quoque, diu teri debet ob li-
gnosam suam folia, quod autem intus est fibro-
sum si per se terendum sit, promptius mul-
tò dissoluitur.

Capparis flos, siue adhuc gemma sit, siue
iam apertus, siue iam in fructum seminis ple-
num excreuit, ferè mūrā conditus in vsum
venit, & eius loco flos genistæ aceto & sale
conditus.

Si tamen ficcatur, mediocriter diu terre-
tur, & flos lupi salictarii foliosus, qualis etiā
vlmo est.

Caryophylla crassæ substantiæ agre te-
runtur, siue flores sint, siue aliud.

Rosæ igni vel sole inter papyros sicca-
tæ, forpicibus minutim concisæ, per se aut
cum aliis teruntur: cum aliis autem etiam ci-
tra siccationem illam, atq; aded recentes so-
lum sectæ, quomodo & quosdam incidere

non

non terere tamen, vt saccharum rosatum fiat, scribit Mesues. Cum verò specimen edis, ne sicca: sed cum alijs tere, vt vites calumniam.

Fruſtum & femin. Semina prope vniuerſa medio inter radices & herbas modo puluerari deſiderāt. Ob id cum omnia hæc ſimul terendā veniunt radicibus iam cœptis comminui, ſemina iniiciantur, quibus etiam abunde iam comminutis, herbæ minutim concisæ adiiciuntur, & omnia ſimul conteruntur.

| | |
|---|----------------------------------|
| Talia ſunt | Eruum |
| Agnus, Apium | Eryſimum |
| Amomum | Fœnum Græcum |
| Aniſum | Linum |
| Anethum | Lithoſpermum |
| Ammi | Lupinus |
| Baſilicum | Lens |
| Carum | Melanthium |
| Cardamomum | Pſyllium |
| Coriandrum | Papauer |
| Cuminum quando autē vreticū volumus mul- tum territur | Seſeli Staphyſagria Sinapi |
| Coccus baphica | Thlaſpi |
| Eruca | Vrtica |

Et ex fruſtibus pilulæ cupreſſi, colocyn-
thidis medulla ſiccata & minutim ſecta,
Carpobalaſamū, cubebæ, galla, nux moſcha-
ta,

ta, piper, & præter hos dactyli, iuniperi bac-
cæ, ficus, zizipha, mixa, pruna passa, vuæ pas-
sæ: quanquam fructus hi molles sint, purga-
ti tamen nucleo & incisi cum aliis quo dixi
ordine teruntur, si in compositionem ve-
niant: & in puluerem abeunt, si pauci siccio-
ribus multis miscentur, aut triti cernuntur
per cribrum magnum, aut cochleari ad mol-
lem medicamenti formam, vt dactyli in dia-
phœnico.

Myrobalanos verò omnes multum te-
nuer conteri iubet Mesues, quando ea-
rum substantiam in corpus rapi volumus, &
viscera ipsa astringere, & contrahendo ve-
lut obstruere consilium est. Eadem ratio-
ne rha barbarum.

Siccata diu in sole semina cucumeris, cu-
curbitæ, melonum & similia, quæ postea cul-
tello concidi docebimus, per se in farinam
puluerantur.

Ex seminibus autem coriandrū, carda-
momum iam maius, id est, granum paradisi,
quam minus, lithospermum, & cuminum, vt
fit vreticū, & ex fructibus myrobalani Ara-
bum omnes vt nuper dixi, ac folliculi sennæ
tam diu quàm radices ipsæ teri postulāt: ob-
id cūm ipsis inicienda.

Quæ verò seminum vel fructuū medul-
læ sunt oleosæ, vel cultello super papyrum
ide

identidem mutandam incidantur, vel cum saccharo purissimo & siccissimo pauco seorsum terantur. Tales sunt medulla seminis cucumeris, cucurbitæ, citreoli, melonis, bombacis, enici, staphylos agriæ, & fructuum medullæ, amygdalarum, anacardorum, balani myrsinæ, pineæ, nucleorum, pistatiorum, castanæ, ouellanæ.

Nux autem moschata ferè postrema iniicitur, ut in puluere minutarum specierum. Nam si prima iniciatur, reliqua puluerari prohibet, suo lentore oleagino.

Semina prædicta incidi solita, si humidis miscenda sunt, per se teri possunt, si siccis, cum horum multacopia semina hæc pauca teri possunt, ut succus glycyrrizæ, bdelium, saccharum, liquores prius particulatim concisus, possunt etiam (ut diximus) insolati per se puluerari.

In diapruno quoque semina frigida maiora & similia si addantur, cum saccharo multo hæc pauca teri possunt: sic in diaphonice amygdalæ possunt incidi, vel cum saccharo teri. Sic papaueris semen quidam per se parum prius in mortario quassant, ut verberatum excipiat cultelli. Deinde cultello, ut prædicta incidunt.

Hæc verò medullæ si compositis cardiacis sunt miscendæ, utendi tempore incidantur & mi

misceantur potius quàm cum alijs terantur. Nam vix bene mensem vnum seruantur integre, sed rancescunt, & compositum viti-
tiant, nisi parcum sit compositum, & innox
absumendum.

Succi siccati, liquores, gummi, resinæ si *Succorum*
recentes sunt, ob id humidi & moles, electa & aliarũ
riis mollibus, catapotis, vnguentis, ceratis, *plāta* par
emplastris per se misceri possunt, vel cum *tium tritu*
alijs mollita & subacta, vel aliquo hīs reme *ra.*
diis idoneo humore soluta.

Vbi verò iam paulò mediocribus siccio-
res euaserunt, vt iam comminui possint, in
mortario, interdum quidam horum frian-
tur magis attritu blando pistilli, præsertim
calfacti clementerque ducti per fundum &
latera mortarii, quàm verberando tundan-
tur. Nam sub violento ictu latefcunt, mor-
tarioq; contumaciter hærent lentore omni-
bus communi, his tamen maiore quàm illis,
ac exhalant, exanimanturq;. Quod si immo-
dicè siccata sint, quanquā tunc facilius pul-
uerantur, tamen velut exanimata, & viri-
bus priuata reiciuntur.

De moderate siccis igitur aut paulò sic-
cioribus nobis sermo est futurus.

Scammoniũ igitur (est enim id aliquan-
do succus, vt i etiam Mesues docuit, sed mul-
to inferius scammonio liquore) & si qui simi-
les

les succi ad consistentiam tam corpulentam
siccando ducuntur, per se friando in morta-
ria teri possunt: sed ferè longius requirunt
tempus, & si parua sit copia, bonam sui par-
tem mortario affixam relinquūt: quod da-
minum in magna mole negligimus, tamen
multò satius est in eo mortario prius amy-
gdalas triuisse, præsertim vetustate oleagi-
nas, quæ suo lentore liquido succos adhære
re prohibeant. Id quod pistillus oleo intin-
ctus, vel oleum paucum mortario infusum
& aliquandiu pistillo ductum per mortarii
fundum, & latera præstabit diutius & feli-
cius. Sit autem oleum vel dulce, vel amy-
gdalarum dulciù, nisi succus astringens om-
phacinum magis postularit. Id verò oleum
succos adhærere non modo prohibet, sed
virtutem ipsorum exhalare, & pollinem te-
nuissimū euolare nō permittit. Adde quod
trituram & breuiorem & commodiorem
& faciliorem reddit: Qualem vim Galenus
opobalsamo tribuit in terenda Theriace.
Acacia tamen nostras etiam sicctor frangi
contumax est, vt minutim sit potius con-
cidenda, & particulatim miscenda pulue-
randis aliis.

Aloë verò cum friādo teratur, percutien-
do autem hæreat mortario, verum est Me-
sue de ipsa dictum quod friabilis sit simul
&

& tenax ac glutinosa, quod etiã digitis explorabis. His enim friabilis est, ac his hæret ante & post friationem.

• Succus glycyrrhyzæ, & hypocistis, & lyciũ nostras pistillo calfacto siccatur & friatur, nisi admodum sint recentia & præhumida, vel minutim secta: tunc additur, cū aliis puluerisatur, cum ea sunt iã cerni apta, alioqui semitrita in composito apparent.

Ex liquoribus quoque qui sunt sicciores ac minus glutinosi, per se friari possunt, vt opus Cyrenaicus, euphorbiũ, thapsia, & (vt dixi) scammonium cum oleo amygdalarũ dulcium friatur, non teritur.

Opium verò cum aliis siccioribus particulatim iniectum conminuitur, vt cum humidioribus dissoluitur, quomodo opopanax, galbanum, hanimoniacum, sagapenum, si pauca quantitate multis aliis siccioribus particulatim coniiciantur, cum his puluerantur, vt in hiera diacolocyntidos sicca, alioqui humore aliquo idoneo, vt aceto, vino dissoluenda, & calfacta colantur, post percoquantur ad competentem rei propositæ consistentiam.

Purgata eadem à lignis & cæteris excrementis pistillo calido quibusdam molliuntur ad fingenda cata potia, & emplastra: sed hoc modo ferè impuram reddunt compo-

sitionem. Vel dissoluuntur humore idoneo, & colantur per stamen. Sed tunc quantum excrementi colando sit abiiciendum coniecta, & ob id largiora quàm scriptura postulat dissolue.

Lachrimæ denique tam resinosa, vt mastiche, terebinthina, pinea, laricea, abietina, strobilina, colophonia, quàm gummosa, vt gummi Arabicum, tragacantha, cancamum, myrrha, bdellium, styrax, succocolla, thus, succinum, gummi, amygdalorum amborum, cerasi, pruni, hederæ, iuniperi, multum siccata, si modo per se, aut cum aliis excepta mastiche & pinea, puluerantur: vt ex plura quoque, siue ea sit gummi, siue succus, siue factitium aliquid: Eadem verò lachrimæ recentes aliis liquidioribus, excepta mastiche, mistæ dissoluuntur, vel medicamenta alia paulò sicciora dissolunt.

Quod si lachrimarum aliquæ suo lento re mortario hærere, oleo paulo ipsum prius illinendum est, vt si myrrham veram nec vetustate ita exuccam teris: nobis enim consuetior myrrha, maximè est per se puluerabilis. Adde quod mastichæ sicciori ne exhalet aut euolet, aquæ rosæ paululum affundi potest, & aliis horum c. siccitati maximè siabilius. In emplastra tamen satius est mastichæ & myrrham puluer

uer

uerare.

Ad hæc gummi Arabicum & tragacantha, si prius pistillum & mortarium calefeceris, multò promptius friando puluerantur. Citius adhuc si paucam aquæ vitæ immitas.

Thus teritur, solum non resoluitur quibusdam, sed aqua & aceto resolui in emplastro consistentiam & oleo, sed tunc coalescere grumis non potuit.

Mastiche teritur cum paucò oleo in catapotis Hermetis ex trociscis colocynthidis.

Myrrha vera primo die crassius teritur, post die tenuissime pulueratur: sic bdellium, thus, vtrunque siccius, sarcocolla, styrax, euphorbium, ladanum tempore aut pistillo & mortario calido siccatum pulueratur, recens verò soluitur oleo calente, vel alio liquore idoneo.

TRITURA LIGNORVM

et Corticum.

LIGNA vt agallochū, aspalathū, gaiacū, santala, xylobalsamū, & lignorū cortices, vt cinamomū, casia, cortex radicis oxyacanthæ, tamaricis, capparis, quātū radices teri postulant: stipitum eadem ratio est & malicorii, quod est mali granati cor-

tex lignosus, sed macis: moschatæ nucis cortex mediocriter diu terendum est.

Corticis autem radicis apii, petroselinii, fœniculi, raphani, similium herbarum tritura in herbis ipsis est declarata. Turbith medio criter terendum. Mesuæ est.

Ne mireris autem cinamomum omnium æque calidorum tenuissima substantia præditum, diu terendum. Id enim fit, quia interno cortice multum fibroso & nervoso est fractu contumaci.

METALLICORVM ET TER-
reorum Tritura.

Lib. 3. c.
ph. g.

METALLICA omnia quia terrestris sunt substantiæ ob id crassarum partium, in profundum, ut ad punctum nervum penetrare non possunt.

Quapropter illis tenuitatem comparamus, subigentes diu in sole æstiuo cum aceto vetustissimo, acerimo, tenuissimo (quod fit ex vino non austero) vini qualitatem, nihil vel minimum gustu referente: quæ quanto pluribus diebus teruntur, tanto sunt tenuiora, ob id melius purgant, tenuant, siccant.

Ex vino autem similiter trita, dein sicca ta sole, vel si aliud est tempus, igni, sunt meliora ducendis cicatricibus.

Lithargyros friatur, non tunditur, ne plumbum eius si chrysis est parcius, si argyritis la

largius lateſcat, quod cernendo per pannum rariffimum remanet: ſcoria autem eius lotionem ſeparatur, & ſic emplaſtra fiunt alba.

Lapis armenus ſi inuenitur, ad lotionem teratur in mortario lapideo, idque diu ſatis: ſed lapis cyaneus ſeu ſtellatus longiorem ſuſtinet trituram Meſuæ. Teruntur in mortario marmoreo albo prius per ſe vniones, corallia, ne odorem, colorem, ſaporem, alie num trahant. Lapidum precioſorum ſapphyri, hyacinthi, granati, ſmaragdi fragmenta poſtea ſuper lapidem porphyrium affuſa pauca aqua roſarum, vel borraginis vel bugloſſi tenuiſſime friantur. Sic enim fit vt promptè diſtribui poſſint, nec obſtruât, adhæc nullam mortarii partem terendo deradunt, quæ puluerem augeat. Qua de cauſa etiam Galenus ſimplicia ad theriacam in pila Aegyptia duriffima conteri iubet. Per ſe etiam teretur vnguis odoratus.

Partes animalium, aut animalia tota ſi Tritura affatione, vel uſtione, vel aliter multum ſic partium catae ſint, puluerantur aliorum modo: ſi hu- animalis. midæ & molles ſunt, paucae cum multis ſiccioribus teri poſſunt, aut ſine his teruntur, & per cribrum cochleari cernuntur. Quædam etiam liquari poſſunt, vt adipēs, me-

dullæ cœsypos, deinde colari.

Stercus canum, luporum, infantum siccatum etiam puluerabile est, & cantharides repositæ & castorium siccior, sed inefficacius, & canceri fluuiatiles vstri, hirundines vstræ, lepus vstrius, renes scincorū sicci, iecur lupi siccatum, polmo vulpis siccatus.

Fel autem ferè aliis siccioribus dissoluedis miscetur, raro siccatur.

De vniombus qui sunt velut concharum quâradam partes dictum prius est, & de vngtæ odorato: Sanguis hirci siccatus facillè pulueratur.

Dentes apri, lucii, elephantis limandi aut radendi, post terendi potius quàm vrendi, si vtrès eorū integritores postulas: sic ossa alia & cornua, vngulæ. Tamen hæc vrenda interdum, vt in vstione audies.

Ambra interdum minutim concisa iniicitur in humorem calidum, vt in eo liqueatur, vt in Anti. diacoccu baphices interdum teritur, deinde dissoluitur affusa aqua rosarum, vt in Anti. alepto moschata, & in aliis multis, interdum prius in mortario teruntur duæ tres amygdalæ, sic moschus caphura.

Os à corde cerui, ebur, pudendum cerui, tauri, cornu cerui, rhinocerotis, & similia prius rasa, post concisa minutim cum aliter

ter

teruntur, quædam etiam vsta promptè pul-
uerantur.

N V N C A D I D Q V O D I N I T I O

proposuimus reuertamur.

Terenda

P E R se terenda sunt primum metallica *per se.*
omnia & terrea, vt lithargyros, arseni-
con, sandarachia, æs vstum, squamina æris,
scoria æris, ærugo, chalcitis, fori, inisy, me-
lanteria, chalcanthum, cadmia, pompholix,
spodium, si hæc duo non sunt satis læuia, plū-
bum vstum, cerussa, sulfur, alumen, nitrum,
sal quiuis, stinmi, chrysocolia, gypsum, pu-
mex, cyanus lapis, armenus ladis, calx, lapis
spongiæ, iudaicus, smyris, aetites, magnes,
hæmatites, amethystus, amianthus, gagates,
iaspis, sapphyrus, hyacinthus, pyropus, era-
nus, sigillum lemnium, terra Cimolia, Cre-
tica, Armenia, corallium quoduis. Potest ta-
men simul metallica multa aut terrea tere-
re, non autem cum partibus plantarum, aut
animalium. Hæc autem ferè teruntur super
marinoreum lapidem, aut porphyrium, aut
marinum, aut alium similiter durum.

Possunt tamen & in mortario teri par-
tes plantarū similiter duræ, anacardi in con-
fectione anacardina Mesuæ.

Aloë, scammonium, saccharum & sac-
charata, penidia: nam alia reddit glutinosa

saccharum, & ea teri prohibet mastiche.

Rha barbarum.

Spodium Arabum. Caphura.

Gummi Arabicum & sarcocolla.

Tragacantha, thus magis, sed tragacantha
incisa etiam cum aliis teritur ne euolet.

Ambra, moschus, Schœnuanthos & festuca-
go, crocus.

Semina pusilla, vt papaueris.

Hyoscyami, maioranæ, portulacæ, amo-
mi vulgaris. Hæc enim si cum aliis terentur,
pistillum eludūt, præsertim quæ cum parui-
tate sunt lauia, & propè integra manent. Il-
lorum autem pars bona, si cum aliis duriori-
bus & teri contumacibus terantur, euolant
& exhalāt, priusquam sint propè cōminuta.

Animalium partes duræ vsitæ, vel rasæ
vel limatæ, ossa, dentes, cornua, vngulæ
ebur, spodium vulgi vel est ebur, vel os ele-
phātis, vel alterius grandis animalis vstum,
ventriculus interior gallinarum, res Gale-
no damnata, cerebella passerum siccata, ie-
cur lupi siccatum, pulmo vulpis siccatus, ster-
cus canum, & luporum & infantis, mumia,
pissasphaltum Dioscoridis putata, sanguis
hirci siccatus, sanguis draconis dictus, can-
tharides, sericum vstum, vel incisum, mo-
schus, margaritæ, testæ ouorum, ostræorum
vsitæ, vel limitæ per se teruntur.

Cum

Cum aliis quibusdam sæpe ipsorum trituram, sæpe etiam facultatem, colorē, odorem stuuantibus teruntur simplicia plurima, & composita quædam, vt moschus, ambar, mastiche sicciior, & alia eiusdem generis ob siccitatem friabilia, teruntur aqua rosacea pauca affusa ne portio tenuior euolet. Sunt qui & mastichæ oleum nucum affundunt, vt in catapotiiis Hermetis apud Mesuē.

Cummi Arabicum & tragacantha citius teruntur aqua dulci, rosata, vini, seu vitæ pauca affusa si affectus non repugnet: aut pistillo & mortario calefactis ad promptiorem siccationem, hincque albio-
ra euadunt.

Tragacantha etiam, vt os à corde cerui, rasura eboris, cornu cerui & similia minutim concisa, etiam cum aliis sicciioribus teri potest.

Tragacantha verò & penidia si mortario & pistillo bene siccis cum aliis terentur, minus eorum perit & exilit.

Myrobalani siccae quales ad nos ferè aduehuntur, affuso pauco oleo meliores redduntur, non exhalant, promptius teruntur: vuæ item passæ & mel cum ipsis tritum ne ventri hereant & ipsum corrigent, impediunt.

Scammonium cum oleo amygdalarum dulcium friatur.

Colocynthis medulla prius modice pistillo fracta, vel potius minutim forpicibus incisa teritur affuso paulatim oleo paucodulci, vel amygdalarum dulcium, vel rosato. Sunt qui ipsum pistillo vel mortario alibiunt, alii amygdalas aliquot prius in mortario terunt, alii papyro inuolutam sole ardenti vel igni è longinquo parum diu siccant, vt crocum, rosas. Postea etiam per se facilius puluerant, vel cum alijs siccis siccata forpicibusque sectam terunt. Alijs in trociscos prius fingunt, quales allandal Arabes vocant priusquam puluerent.

Quæ necessitas agarico adest, prius enim ferra quadam rapaci negligenter separatur, post cum vino albo paucio quo zingiber purgatum sit maceratum in trociscos formatur, siccatur in umbra, pyxide vitrea reponitur, & cum opus est friando lauissimè pulueratur.

Caphura teritur in mortario, cui duæ aut tres amygdalæ prius fuerint astrictæ, aut in eo tritu, aut ipsarum oleum pistillo & mortario paucum sit illitū ne terendo euolet ac exhalet.

Turbith quia per se tritum latefcit (est enim gummosum si legitimum est) vbi est mod

modice confractum, alia ei sicciora sunt miscenda cum quibus teratur, vt piper, zingiber, & caetera in diaphcenico & electario Indo vtroq;. Per se autē cum amygdalis, vel oleo amygdalino pauco teritur ne exhalet.

Sericum crudū, incisum facilē teritur mixtis tribus aut quatuor amygdalis, ipsum ne subterfugiat lentore suo retinentibus, & pistillo sistētibus. Sunt qui papyro inuolutum sole vel igni parū siccant, post minutim cōcidunt, & cum aliis leuissime terunt.

Cinnamomum cum paucis amygdalis terunt quidem in hippocraticum quod vocāt vinum, ne odoris gratia expiret.

Rha barbarum cum amygdalis facilius *Florum.* quidē teritur, nec euolat nec exhalat, sed minus fit purgatoriū: vt crocus iura minus tingit si ex oleo teratur, id quod quibusdā pro secreto est. Crocū enim ad iuriū, catnium & aliorū ciborum cōdimentum, vel etiam ad frontes librorū tingēdas nouo quodam modo terunt. Papyro enim interpositum, vel sine hac sartagini impositum ignique admotum longule, sed parum diu, vel soli diutius siccāt, vt villosa eius natura prōptius terēdo rumpatur. Ne verò exhalet, ac vt promptius teratur, & coloratior euadat, olei dulcis pauxillum vt guttas. 4.5. in vncias singulas affundunt, vel pistillo illinunt interdū tā largit

giter vt improbè rubeat, ob idque ab archi-
pharmacis damnatur. Sed vs fit coloratior,
minus tamen tingere putatur quàm qui sine
oleo tritus sit.

Opulenti, verò cum saccharo paucò
potius teritur, si verò humorem alium
olei loco acceperit, etiam coloratior eu-
dit, sed humore in vaporem soluto flui-
diorem nativam repetit, & minus vulgo pro-
batur. Verumtamen croco nostrati hoc
mangonio ad coloris gratiam opus est, ceu
parum cocto ob soli & cæli naturam fri-
gidiorum. Qui verò crocus à Galeno lau-
datus est colore flauissimo, odore vege-
tissimo, etiam diu postquam seruari cœ-
pit, acquisitio hoc colore non indiget.

Crocus verò vt spica, macis, colocynthis,
sericum, rosa, & alia plurima ante trituram
inciditur.

Euphorbium dum teritur per se pului-
sculo acerrimo in nares euolante & oculos,
has partes valenter mordet, sternutamen-
toq; implacato hominem torquet, ob id ea
molestia nouitios fatigat, vt sæpe illis nares
sanguine fluant plurimis caput vehementer
doleat. Has autè ab euphorbio noxas prohi-
bebis, si oleum paucum aut amygdalas mi-
scueris, quæ lentore suo etiam puluisculum
illigent ac retineant.

Sun

Sunt qui myrrham, bdellium, cancamum, gummi hederæ etiam ex oleo terant, ne tenuior portio euolet ac virtus exhalet, neue mortario hæreant.

Opopanax, galbanum, ammoniacum, sagapenum, bdellium, ladanum, acacia vulgaris, opium, hypocystis, asphaltum, ficior terebinthina, qualis frequens Venetias conuehitur, & alia non pauca succorum liquorum & lacrimarum genera, vel minus siccata, quam vt per se puluerari queant, vel neruosa & velut membranosa & coreacea, & fractu contumacia cum aliis siccioribus teruntur, sed prius incisa, vel aliter in portiones paruas redacta, quantitate tamen parua multitudini aliorum sicciorum immista paulatim cum illis puluerantur, vt in hiera diacolocyntidos, & alijs compositionibus multis, sic Crocus, flores etiam recentes buglossi, vtriusque, rosarum & cæterorum. Sic Trocisci Galliæ moschatae & alii, sic Dactyli intus & foris purgati, ficus, vuæ passæ, myxa, zizypha passa, baccae lauri, myrti, iuniperi, oxyacanthæ, visci quercini, anacardi amygdalæ, auellanae, strobili, pistacia, nucum reliqua genera & glandinum, semen cucurbitæ, cucumeris, melonum, citreoli, citri, cydoniorum, Sinapis, Cannabis, Cnici, xyli, cerasi, pſillii,

Lin

Lini, & similia. Sic sericum, Lana, Pili minutim concisa cum aliis siccioribus teruntur potius quàm vsta eadem per se: Nam vrendo vires amittunt priores & nouas ab igne, & iis quibuscum vruntur acquirunt, ob id non vrenda, nisi medicus doctus iusserit, vti nec ebur, cornu Cerui, capræ, rhinocerotis, pudendum Tauri, Cerui, siccatum.

Hæc enim vel in longū rasa & incisa, vel etiam limata, vulgari lima, aut rapaci ferra cum aliis siccioribus puluerantur.

Adde quòd quædam aut per se, aut cum humore aliquo teruntur, & cum eodem bibuntur vel aliter vsurpantur, vt vinca, comma amatanthi, cum vino, fesceli, satyrion, pœonia gnaphalium ex vino austerò teruntur & bibuntur.

Aristolochia rotunda ex aqua lupini cum posca bibuntur, aut cum melle linguntur, & alia per multa eius generis exempla apud Dioscorideam & Galenum in medicamentis simplicibus & compositis inuenies.

Sic bdellium salina matutina & hominis ieiuni subactum digitis in emplastri consistentiâ vsurpatur, & alia alio modo in vsum veniūt cum humore aliquo trita, vt in compositis latius leges.

Lib. 3. c.
pb. p.

Ad aurium vlcera vino, vel dulci, vel aust

austero, vel veteri, vel medio ætate, vel aceto, & eo acido, vinoso, acri, pro scopis variis ipsorum, remedia non simplicia solum, sed & composita teruntur, sic ad oculorum affectus collyria sicca ex humore idoneo teruntur, & applicantur & in aliarum partium affectibus similiter.

Clementer frianda in mortario quorum virtus attritu violento promptè exhalat, aut substantia sub ictu valido latefcit & mortario hæret, aut quæ multum sunt friabilia vt caphura, ambra, moschus, mastiche, myrrha, bdellium, thus, gummi iuniperi (vernice vocant) cancamum, sarcocolla, opus cyrenaicus, euphorbium, aloë, scammonium, styrax calamintes, bolus Armenia, terra lenia, & terrea propè reliqua, & metallica, amyllum, cerussa, quin hæc duo sæpe tantum cribro affricamus, saccharum, sanguis draconis, castorium, radix ari, draconii hermodactylorum Hellebori vtriusque, turbiti, rhabbarbarum, spodium, Arabum, troiscichi agarici, dum scilicet quæ aliquando humida fuerunt, iam siccata sunt.

Quorum siqua adhuc sint paulò humidiora, pistillo & mortario calefactis, mox siccantur, & simul puluerantur, friando continenter. Quod auxilium succis liquoribus gummis, resinis etiã mediocriter fluidis

confert: sed eò frequentius & diutius calefacienda & terenda quo illa fuerint humidiora, vt spes sit etiam oleum ipsum & terebinthinam venetam hoc ingenio pulueratum iri, atque ad eò argentum viuum cum saluie succo.

Sed lapides præciosi & metallica foelicius puluerantur super lapidem marmoreum porphyrium, aut marinum per molulam ducta, liquore idoneo pauco, ne puluisculum euolet, idētidem affuso qui post eā euaporet.

Argentum viuum sublimatum & præcipitatum, cinnabrium vulgare, alumen scissile, quia cæteris tenuius sic puluerantur, vel etiam in mortario metallicorum aliorum modo.

Valenter tundenda reliqua vt quæ obduritiam, crassitiem, lentorem, densitatē ægrè separantur vt radicum, corticum, lignorum, herbarum, seminum plurima.

Qualia sunt radices althææ, apii, asparagi, aristolochiæ, asari, asphodeli hyyonix, behen, centaurii magni, cyperi, cyclamini, costi, calami aromatici, cucumeris agrestis, dauci, doronici, dictamni vulgaris, hælenii, eryngii, fœniculi, filicis, galangæ, gentianæ, glycyrrhyzæ, graminis, iridis, mandragoræ, nardi, petrosellini, pyrethri præoniæ
vtri

utriusque, polypodii, zingiberis, cortex radicis capparidis & tamaricis, & alii, & ligna omnia, herbae item omnes praesertim siccae, flores chamæmeli, schoenuanthos, & eius fistucago nobis consueta pro flore, spica nardi, balauustum, caryophyllum, & flores reliqui tam recentes quam sicci, semina anisi anethi, cari, cumini, coriandri, fœniculi, fœnigræci, lini, lupini, & reliqua, folliculi senne & fructus reliqui, succi, liquores, gummi, resinae in particulas sectae, & aliis inter terendum particulatim adiecti.

Limaturæ & rasuræ, & rapturæ ossium, cornuum, pudendorum.

Quædam parum diu sunt terenda quia rara, tenuia, friabilia, virtutē superficiariam aut imbecillam sortita, quæ paucam sustinere trituram vulgus ait, viribus scilicet integris, de quorum quibusdam sic Galenus scribit lib. 4. c. ph. g.

Quæ ex succis & liquoribus, & lachrimis resiccatis proueniunt: ut myrrha, aloë, acacia, scilicet vera, & quæ his sunt finitima, *ιωλίωτα* sunt, & faciliè laxia fiunt, ac promptè in puluerem mollissimum abeunt, ob id non diu terenda, ne ipsorum & virtus exhalet, & substantia tenuior euolet, ut caphura, ambra moschus, & alia propè vniuersa, quæ clementer terenda scripsimus.

Quin & euphorbium parum diu terendum Mesuz est, & spodium Arabum ex cannatum vltis radicibus: nam ex ebore vltio spodium, quod vocant, mediocriter terendum. Quod autem Graecis est spodium, id est cinerula, & huic affinis sed praestantior pompholyx non teritur, tantum linteo cernitur per lotionem, aut etiam sine lotionē.

Adhuc quæ acia & facillè inflammabilia sunt, vt resina, liquores, gummi, quædam parum diu terenda.

Nam tenuem horum substantiam calor motu accensus dissipat, & reliquum inflammatur.

Sunt præterea quædam tam friabilia, vt etiam digitis attrita læuigentur: vt agoricus bonus, ari, & dracunculi radix siccata, asphodeli radix vltia, quanquam illas multam coctionem sustinere dicat Mesues. Nam recentes intelligit non siccas. Sic amyllum, cerussa, calx, ex teneriori lapide. Nam ex duriori vix hora post vna, etiam affusa aqua solui incipit, ea quæ ad lithocolam multò præstantior iudicatur, quanquam minus multò alba est.

Quædam multum diuque terenda sunt, vt compositioni sunt apta, & quæ crassa densa, dura, lenta, virtutem profundam aut

validam, & ægre solubilem sortita, quæ multam sustinere trituram dicimus, vili-
bus seruatis, vt metallica, lapidosa, ligno-
sa, neruosa, membranosa: quæ tamen ob
scopos medici varios nunc crassius, nunc
in pollinem mollissimum terenda sunt, vt
cum oculis applicanda, vel vreticis miscen-
da. Sic enim asarum, cuminum, & alia per
multa leuissimè terenda sunt, cum per hæc
obstructa expedire, distributionem alimen-
ti in corpus iuuare, vrinas mouere consi-
lium est.

Myrobalanos quoque omnes quando
per earum substantiam viscera contrahi &
roborari volumus, mollissimè teri iubet
Mesues. Eadem ratione rha barbarum,
quanquam tunc etiam magis vreticum est,
vt purgatorium magis, si crassius teratur.
Quod autem purum est ac probatissimum
intellige: nam rarius & laxius à vehemen-
ti & diuturna contritione resolutum exani-
matur, virtutemque perdit Mesuæ. Sic
radices aliæ etiam aromaticæ vt exacte
puluerentur, diu terenda sunt, acorus, ari-
stolochia, bryonia, centaurium maius, cy-
claminus, cucumis agrestis, Mesuæ, costus,
cyperus, enula, galanga, iris, præonia, pyre-
thium, polypodium, zingiber. Pauca au-
tè tritura fiunt leuia, agaricus trocischatus,

& radices alia clementer friandæ.

Metallica quoque (inquit Galenus libro quarto. c. ph. g.) galla, cytinus, malicorium, Aegyptiæ spinæ fructus & id genus omnia sunt σκληρά, id est ægre lævia & tenuia puluerando euadunt. Metallica autem illa intelliguntur, lithargyros, arsenicum, sandaracha, æs vstum, ærugo, chalcitis, chalcanthum, cadmia, tam fornacaria quàm lapidosa, plumbum vstum, molybdena, sulfur, alumen, styinni, chrysocollanatiua (fictitia enim facilius pulueratur) gypsum, cyaneus lapis, & armenius: sed ille magis, & lapides reliqui, & bona pars aliorum quæ per se terenda diximus.

Colocynthis accuratissimè debet teri ob causam à Mesue dictam, in simplicium purgatoriorum facultatibus, etiam si ea ob valentem vim purgatricem prius vacuari, quàm amaritudo eius agat & tergeat, dicitur Gale.

Scammonium quoque exactè terendum, nisi cum in catapotia venit. Tunc enim crassius tritum diutius in ventriculo manet, potentiusque agit.

Sic ossa, cornua, etiam vsta, pili, lana, sericum.

Plenam quoque trituram sustinet centaureum paruum, etiã cum floribus, Mesue, ber

herbæ etiam aliæ quæ siccæ seruantur.

Mediocriter puluerando terenda sunt propè cætera, vt radices apii, asparagi, asari, nisi mouendum sit lotium, cichorium, calamus aromaticus officinarum non teredinosus, doricum, dictamnus vulgaris, fœniculum, glycyrrhyza, gentiana, gramen, hermodactylus, iris, Illyrica & Florentina, inenum, radix mandragoræ, nardi, cœnantes, petroselini, plantaginis, phu, rubiæ, rusci, raphani, rhapontici, zingiber, zurumbet, sic herbæ acres & aromaticæ, vt hyssopus, rhymus, nisi mouere menses, aut vrinas volumus, & ob id diutius terimus.

In summa, quæ diu coqui possunt, debent etiam & teri: quæ parum diu coquenda, parum diu terenda: quæ mediocriter illud, hoc mediocriter ferunt, ob id trituram nonnihil clariorem tibi reddet coctionis cognitio.

Nec te moueat quòd quædam audis parum & mediocriter, vel multum & mediocriter terenda. Nam cum huius mediæ magna sit latitudo, in ea quædam sunt extremis tam propinqua, vt vix secerni queant. Sic agaricum mediocre sustinere trituram Mesues scribit, aliis placet paucam, non tamen paucissimam. Qua ratione etiam de primarum qualitatum ordinibus

disidia scriptorum illustrium concilianda
scripsimus in methodo medicamenta com-
ponendi.

Quædam tenuissimæ sunt terenda, vt
promptius id actu fiant quod esse potestate
dicuntur, vt quæ celerius in partes omnes af-
ficiendi corporis permeent siue fermenta-
tionem (vt dicunt) quærinius, siue firmatio-
nem & robur, siue materiarum incisionem,
tenuationem, terfionem, vacuationem per
vrias, menses, sudores, insensilem transpi-
rationem. Sic cordi, hepati, & partibus cæte-
ris internis, præsertim longè ab ore dissi-
xis roborandis idonea, ab his vacuatura,
obstructiones liberatura, vrias aut men-
ses motura tenuissimè pulueramus, vt essen-
tiæ quadam tenuitate inde acquisita, & cor-
poris sui mole exigua promptius per oscu-
la vasorum angusta, & per corporis habi-
tus poros seu sum latentes permeent, agent-
que citius quod agere nata sunt: Ob id spe-
cies omnes in hiera Galen. picra mollissi-
mè terentur, & cribro serico cernantur, vt
aloës & aliorum vis in angustos ventriculi
& partium vicinarum meatus penetraret. Sic
in theriaca Mithridatio, aurea Alexandri
antidoto, & similibus polychrestis compo-
sitionibus leuissimè terenda, vt promptius in
se agendo & patiando, velut fermententur

cit

cltius, & sint vsui. Dū enim recentia sūnt hæc opiata medicamenta, stupefaciēdi vim præpollentem retinent. Nō tamen omnino tenuissimè sunt pulueranda: Nam sic eorum vis aromatica exhalaret.

Omnia stupefacientia dictis Antidotis, vel aliis miscenda, aut etiam per se vten- da, sunt tenuissime pulueranda, vt in paruos meatus & longepositas, profundasque par- tes stupefaciendas penetrare aut pertrahi possint.

Affectibus hepatis puluerata tenuiter de- bentur; tenuius lienis, tenuissime renum & vesicæ affectibus, vt per ora vasorum an- gusta subeant. Sicthymus, asarum, cumi- num, & similia tenuissimè terūtur in aurea, in liæmagogo, in diacurcuma maiore, in dia- lacha maiore, & aliis similibus: in aluum verò subducentibus diospolitico, cōfectio- ne Hamech, electario. Indo maiore cras- sius eadem sunt terenda. Omnino etiam te- nuissimè puluerentur debita affectibus ocu- lorum, ne si crassiusculus sit puluis, aspera inæqualitate, & attactu oculi tunicas exi- mie sentientes dolore afficiat: præsertim si metallica sunt, aut lapides, aut similiter du- ra & sicca corpora. Saccharum enim can- dum, bolus Armenia, etiam si minus exa- cte trita oculo imponuntur, humore ex ipso

de lachrymante mox solvuntur.

Terenda quoque in puluerem mollissimum, quibus crassius tritis vis noxia & malefica inest, ut ea terendo vanescat, ut in colocynthide. Crassius enim trita cum sit, spōgiosa, humore superfluo imbuta tumescit, negotiumque tunc magnum facit pondere, mole, morfu partibus quibus incubuit. Quæ incommoda pulvisculis eius accidere nequeunt, quia humoris non sunt capacia. Crassius tamen terenda cum in trociscos alanda est formanda, sed ter quaterque pulverandi trocisci & reformandi, ut ea tenuissime tandem pulveretur. Eadem ratio est de agarico, substantia illi simili. Sed cum sit non paulò clementior, trituram minus accuratam postulat.

Rha barbarum quoque curiosè terendum, quando viscera astringendo robore, aut etiam vrinas mouere oportet, uti & myrobalani.

Quædam crassius terenda, quæ in ventre diutius morari volumus, nec pròptè vforum ora subire: sic purgantia medicamenta crassius teruntur, ut in ventrem partem minus principem, & vacuationi expositissimam ex corpore reliquo trahant. Non autem ad partes principes tota ferantur, easque offendant cum ad has facultate aut saltem vapo-

re

re ferri, vel quod plurimū sit, portione paucissima sufficiat.

Crassius etiam teruntur, quorum virtutem multa tritura dissipari metuimus: sic scammonium vim purgatricem multa tritura perdit.

Eadem ratione stomachica crassius terenda, ut mora in ventriculo longa coctionem facilius iuuēt, neque cibo faciliē vis eorum obtundatur. Quæ præterea sunt aromata virtutem colato datura, & odoris ac saporis gratiam nō auctura substantiam: sic cinnamomum negligentius terimus, quo quæ colantur aromatizamus: & cardamomum: zingiber, caryophyllū, macis, lignum aloës, spicam, crocum negligentius teris, per hæc & pannum rarum colaturus œnomeli.

Quæ item flatus dissipatura sunt, eadem ratione crassius pulueranda sunt, ut in diospolitico seu diacymino simplicia ut purgent, & diutius inflatus agāt, licet tardius & imbecillius quàm si tenuata magis essent. Id quod si fieret, parum diu flatus dissiparet, tum quod vires citius eis frangerentur, tum quod per vrinas mox secederent easq; mouerent, cum calida sint & tenuia.

Quædam præterea tantum crassius sunt frangenda ad vstionem futuram, ut lithar. gyros vrendus frangitur in partes magnitu- Diosc.
Gal. li. 4.
c. ph. g.

dinis iuglandis . lapis phrygius . vtendus in partes nuci auellane æquales.

Quædam etiam teruntur vt purius lauentur, de quibus in lotionibus abunde.

Ex his patet eadem medicamenta, nunc tenuius, nunc crassius terenda pro varijs medicorum scopis, vt rha barbarum, asanum, nitrum, thymum, calamintum, irin, hyssopum, pulegium, origanum, cuminum, cirsium, quando his vires mouere nobis studiū est: negligenter, verò, cum alium mouere constituimus.

Sic scammonium, colocynthis, & alia valenter purgantia, nunc crassius cum illud in pilulas, hæc in trociscos, transit: nunc tenuius ob dictas prius rationes. Rha barbarum tamen ferè tenuius teritur, vt colocynthis tenuissimè, cum mox & citra aliam per trociscos trituram sumenda. Scammonium quoque crassius teritur, si coquendum est cum alijs, aut diuante vsu seruari debet medicamentum. Idque nevis eius coctione per ignem aut longam fermentationem exhalet.

Et quæ partes remotissimas petere volumus, leuissimè: si eadem ventriculo, intestinis, & primis venis, hære diutius, crassiusculè terenda sint.

Ex

Ex his omnibus simplicium simul terendorum ordo quidam instituitur, vt prima iniiciantur mortario & terantur crassa, dura, lenta, vt radices, baccæ quædam. Semina prope omnia, vt quæ etiam glutinosa medulla constant. Paulò postèrius aromatica etiam æque teri contumacia, vt iuncus odoratus, calamus odoratus, zedoaria, zingiber, galanga, iris illyrica & Florentina, seu nostras alba, costus, & cardamomum, carpopbalsamum, cubebe, piper, nux moscata. Post hæc autem simul cum his xyloa loë, xylobalsamum, cassia, cinnamomum, caryophylla.

Deinde succi, liquores, lachrymæ persue-
rabiles cum alijs de quibus antè, & quæ cura
quibus aut per se terenda sint, diximus.

Semina verò oleosa, vt cucumeris, cucurbitæ melonis, citrioli, cnici, cydonii, pistacia, strobili, amygdalæ, & similia sunt excorticanda, deinde incidenda scalprio, vt mox audies, ne puluerem reliquum glutinent, & per cribrum transmitti prohibeant.

Mineralia etiam ferè per se & seorsum teruntur, affusa interdum ob eorum siccitatem aqua pauca, ne substantia eorum tenuior euolet, aut vis exhalet, vt antè docuimus. Chalcitis autem, chalcanthum, ærugo, sulfur, sandaracha, & alia quædã adhuc non-

nihil humida, humectari nolunt.

De succis, liquoribus, lachrimis, & animalium partibus abundè prius est dictum.

Mortarium papyro vel corio etiam interdum duplici est tegendum (vt in Theriacis compositione diximus) interdum ne puluis tenuior, præsertim præciosus foras euolet ac pereat: interdum ne is qualitate male præditus nares batuentis mordendo male habeat, vt in Euphorbio & Turbith, & aliis non paucis euenit.

Ad trituram præparant, vel trituræ loco sunt attritio in cote medica, mansio, sectio, fractio, rasio, limatio, raptura.

Atteruntur in cote medica (qualis est tonsoria) cum albuminis oui liquido, vel lacte, vel succo rosarum, vel seminis fœnigræci, aut cydoniorum, aut maluarum, aut althæarum, ipsa collyria sicca, siue iam in pastillos formata, siue adhuc integra se habent tamen atteri apta, vt materia hæc tenuior & mollior cõtactui suo dolentem oculum non exasperet.

Ad attritionem confricatio amyli, aut cerusæ ad cribrum facta vt puluerentur, est referenda.

Manduntur ad oris partium, faucium, asperæ arteriæ, pulmonis, æsophagi, ventriculi affectus, vt ad dentium dolorem vinca, ligustri folia & germina, radix chelidoni,

nii,

nii, plantaginis, anemomes, Galeno manduntur in simplicibus.

Secantur radices crassiores, longiores herbæ, virentes ambæ aut siccæ, & flores magni, vt nymphææ, rosarum, croci, & medulla colocynthidis, & acacia nostras, & troci. Galliæ: & capillaria, vt sericum, pili, lana: & ligna, vt gaiacū, santala, berfilium: & ramēta & velut bracteolæ ferramento abrasæ, cornuum, vngularum, ossium, eboris, pudendorum, coriorum, ichthycollæ, taurocollæ, & similia.

Secantur autem quouis ferramento incide & forficibus: ligna autem etiam ligneo pistillo acies ferreas acutas habente. Horum verò quædam post sectionem in decocta & infecturas veniunt, vt gaiacum, berfilium, & quæ ex aliis voles. Alia, vt scælicius & citius pulueretur, ante raduntur, post secantur. Sic de fractione, rasione, rosione, raptione, limatione censendum est. Ea scilicet nunc ad trituram interuenire, nunc ad coctionem tantum, vel vsum alium.

Scalpro autem sutorio huc illuc inclinato identidem ac recliuato, vel cultelli verberatu crebro, vel duobus tribusue cultellis inter digitos manus, vel alterius tantum, vel vtriusque præhensis inciduntur minutissimè semina, oleosa & maiuscula quia sub
ictu

istū pistilli lateſcunt & pingueſcunt. Inci-
duntur autem aut per ſe prius tamen depel-
lata, aut cum pauco ſaccharo, ne etiam ſic im-
modice pingueſcant & oleoſa fiant, ſupponi-
tur autem iſt ſolium papyri purum, ſæpe mu-
tandum quando ſcilicet iam diſciſſum eſt,
& huic folio dignum læue & politum.

Sunt verò ſecunda hoc modo ſemina cu-
curbitæ, cucumeris, melonis, citreoli, bom-
baci, ceraſi, pruni, amygdalarum, piſtaci-
orum, ſtrobunilorum, anacardorum, balani myre-
pſicæ, caſtaneæ, auellaneæ, iuglandis, tribuli
aquatici, cnicī, ſtaphydis agriæ, quæ aliter
quoque teri poſſe prius docuimus in ſemi-
num tritura uniuerſali.

Dactylos quoque intus & foris curioſè
purgatos ſimiliter incidimus, ſi condita car-
diaca ingrediuntur.

Eſt tamen quando eos negligenter in-
ciſos cum aliis ſiccioribus terendos iniici-
mus præſertim ſi pauci ſunt & multum ſicci,
aliquando tantū aceto horas aliquot vt 12.
maceramus, terimus, per cribrum cochleari,
vel manu impellente cernimus, vt in diaphœ-
nico, in quo etiam amygdalas cultello de-
pellatas cum dactylis aceto maceratis qui-
dam terunt & cernunt.

Frangimus manibus tenera & minuta,
vt herbarum pugillos intorquendo digi-
tis

tis abrumpimus, & radices pusillas & fragiles, cortices parum frangi cōtumaces. Aegre enim fragilia ferramentis secamus, aut pistillis tundimus.

Raduntur vt ante dixi ebur, cornua, & ungulae, pudēda siccata, coria siccata, ichthyo colla, taurocolla siccior, lignum gaiaci, ber-silium, & quaedam alia vt facilius vel coquendo vim suam humori cui incoquantur, impartiantur, vel terantur. Raditur & cortex turbiti exterior, donec album appareat, Mesuae. Sic radix glycyrrhizæ, ante trituram raditur, & aliae radices, & ipsarū vt aliorum cortices, sed id ad purgationem magis pertinet, de qua postea dicemus.

Raduntur quoque rapaci ferra, lotus, lignum gaiaci, buxum, suber, ebur, & dura alia quæ etiam dum fera vulgari secantur, scobem reddunt non dissimilem illi quam rapaces ferræ ac veluti rudes & crassæ limæ elidunt.

Ferri præterea albi lamina tenui curuata, foraminibus multis exasperata cōminuimus affricando agaticum, nucem moschatā zingiber. Mala itē cydonia, vt succi hoc plus reddant, quàm si in mortario terantur.

Limatur præterea aurum, argentum, æs, ferrum, chalybs, plumbum: quædam vt vrantur postea terantur: alia vt etiam citra
vsti

visionem in vsum veniant, vt aurum, argentum, sed horum duorum limaturæ loco satius est auri & argenti foliis vti. Limantur quoque ligna prædura, gaiacum, santala, berfilium, ossa cranii humani, dentes & maxillæ lucii, dentes apri exerti, & castoris, cornua cerui, capri, rhinocerotis, & vngulæ quorundam ex his, ac ebur. Pudendum quoque tauri, cerui, ichthyocolla, taurocolla, quæ etiam radi & secari docuimus.

Ratio autem limationi finitima est, sed ramenta sunt maiora limatoris, quia horum instrumenta sunt insignius, sed rarius dentata quàm limæ. Radendi quoque modus est alius in lignis edolandis, qui ad trituram quoque, & coctiones vsui esse possit.

DE CRIBRATIONE.

His terendi differentiis ordine optimo succedit cribratio, qua purum & minutius fecerimus, quomodo pistores simlaginem, & farinæ florem puriorem ac tenuiorem à fufurea & crassiore separât. Cribrationis ratio eadem est quæ tritura, ob id quæ tenuiter pulueranda, tenuiore cribro sunt cernenda: quæ tenuissimè, tenuissimo, vt pulueres dicti cordiales cribro sericeo, ta fetum vocat vulgus, inter manus agitando cribrantur metallica ad oculos tenuissimè terenda, & cribro tenuissimo cernenda: sic

vri

vrinas mouentia, obstructions liberantia. Contra verò quæ aluum mouere & purgare volumus, crassius terenda, & cribro crassiore ac rariore cribranda sunt. Et quæ per se teruntur si cribranda sint, per se cribrantur, vt metallica quæ aliis mista citius, & ante istam puluerationem descendunt.

Cribramus autem interdum ad trituram meliorem, frequentius ad misturam aptiorem rerum iam mole minimarum. Quæ enim cribrum, non permeauerunt, trituræ redduntur: quæ crassius terenda sunt rariore, vt dixi, cribro cernenda: quæ tenuius, densiore, vnde varia cribrorum multitudo fuit necessaria. Quædam enim cortice tiliaceo, angusto, sed æquali, cancellatim connexo constant cribrando scobe gaiaci, vel agarico infectorum, & similiter crassiuscule tritis idonea. Vidi & ex asiculo terebella passim pertuso cribrum argillæ colandæ idoneum, alta his minus lata habent foramina neque vt hæc quadrata sed rotunda, vel oblonga in pergamena circulo ligneo subsuta, quibus triticum, hordeum & alia cerealia, sæpe etiam legumina seminibus alienis, sed minutionibus purgimus. Hæc enim per lata foramina ob paruitatem facilè descendunt semina bona foraminibus maiora retinentur.

Alia seta equina in telæ modum cancel-

latim contexta constant, circulis duobus ligneis vtrunque tensa, quorum inferiore hæc præhenduntur, atteruntur, & impinguntur: superiore verò materiæ cribatæ continetur, horum verò cribrorū copia & differentia magna est, & usus plurimus. Quædam enim solum in medio ligneorum circulorū habent, velut telam illam equinā, & his manu tantum molliter succussis pulvis in subiectum catinum ligneum, vel papyrum deicedit, superna eius parte interim papyro testæne pulvis euolet. Eoque utimur in pulueribus parum prætiosis.

Alia præterea fundum & operculum habent exemptile, sed vtrunque corio veruecino clausum, illò pulvis per cribrum transmissus excipitur, & probè ne exhalet aut euolet cohibetur, hoc ne portio cernenda exhalet, aut euolet prohibet. In his verò multæ sunt in raritate & dēfinitate differentiæ, quarū singulari suus est usus, non modo ad medicamentorum terendorum genera, sed etiam ad componendorum speciem variam constituendam.

In his item quædam telæ equinæ loco secticum habent (tasetur vulgus vocat) & id vel album pulueribus electariorum album, ut diatragacanthi diatris destinatum: vel rubrum debitum, pulueribus electario-

rum rubrorum, vt diatrhodi, diatrium, santalorum, diacube, diamargariton.

Viurpatur itaq; id cribrorum genus aliis pretiosius, ad pulueres etiam preciosos, & vt vocant cordiales, neque vt præcedentia setacea lignæ mensæ, aut alteri solido corpori violentius impinguntur succufando, sed manibus tantum mollissimè versantur, vt sine violentia puluis tātum tenuissimus descendat.

Est etiam linteum magis minus, rarum, densum, cribrum loco in metallicis præsertim, & terreis corporibus: Latius autem, id est, remque cernendam comprehendit, ac inter pyxidibus alicuius lignæ vel alterius, sed grandiusculæ operculum & corpus concluditur & constringitur, deinde vna manu ferè violentius succutitur super abacum pharmacarium, vnciae vel simili pondere, sed plumbeo in linteum etiam prius immisso, vt id suo motu & pondere res has cerni difficles, acceleret, quem cernendi modum cōcotrinizare vulgus vocat, voce ex κοκτρινω, id est, cribrare corrupta, & in id contorta.

Vt autem radices, herbæ, semina, fructus & alia plæraque cruda & cocta teruntur, etiā cribrantur: sed ferè vi manus aut cochlearis quomodo cassiam & thamar indos sine

tritura cernimus: sic radices eryngii, satyrio-
rum, raphani, dracontii coctæ, tritæ, cribran-
tur in diaphatryo.

Sed hæc cribratio immoto fit cribro,
quæ verò puluerum est cribratio, ferè fit
cribris ab acu incussis valenter, sed nume-
rose, vt tarantata audire videaris. Alia cri-
bro manu suspensa agitato, alia vt cardia-
ca cribro inter manus versato, non in aba-
cum incusso, ne etiam horum partes cras-
siusculæ vi impactæ per cribrum permeent.
Alia pyxide duro corpori manu vna valen-
ter allia.

Cerusa & amyllum, & cerusa serpentaria
cribro offricantur manibus: sic quæ citra tri-
turam cernuntur.

Quæ autem cribrum non superauerunt
ob crassitatem, teruntur donec ob tenuitatem
tota cernantur: nisi quod dum paucissimum
superat, idque tenuissimo proximum, cæte-
ris iam cretis commisceri solet aut seruari,
vt aliis eiusdem generis, vt postea terendis
& cernendis iterum misceatur.

Colatio cribrationi licet genere & natu-
ra sit affinis, quia tamen non est siccorum,
sed magis liquidorum ob id in alium locum
referenda sunt tanquam dissolutioni, coctio-
infusioni, clarificationi, & aliis plenisq; præ-
parationum differentiis necessaria.

De

DE DISSOLVTIONE.

DISSOLVTIO autem seu dilutio triturata quaedam esse videtur, quod per hanc medicamenta tam simplicia quàm composita laeua fiant, sed adiecto humore aliquo, non etià sicca permaneāt si prius erant, vt se ad trituram habeat hæc, quomodo colatio ad cribrationem.

Solutio igitur seu dissolutio, seu dilutio est medicamētū vel simplicis, vel compositi consistentia crassioris in humore quopiam idoneo facta resolutio in consistētiā, vel mediocrem, vel paulò hac crassiorem aut liquidiores, pro medicamētū soluendi, & humoris soluturi quantitate & consistentia, & aliis medici scopis.

Quod enim minus erat crassum & humore reperi liquido, eodemque largo est solutū, erit liquidius, contrarium crassius.

Huius autem dissolutionis multæ sunt causæ, nunc enim dissoluimus vt medicamētum facilius & iucundius deuoretur, & citius distribuatur & subducatur, cum facilius sit & iucundius sumere liquida quàm crassa: vt facilius & gratius est impleri potu quàm cibo. Sic opiata cassiam & alia plurima quotidie dissoluimus.

Nunc vt aliis ad compositionem promptius misceantur, & vnà cum his aut etià per

se coqui possint, quod sicciora ipsa promptè
vrentur, sic succos, liquores, lachrimas fre-
quenter dissolvimus, vt euphorbium recens
oleo dissolvitur, Vetus autem fortasse non
dissolvitur Mef.

Nunc vt in partem affectam possit medi-
camentum penetrare, aut illi applicari & ad-
herere. Sic in aurem iniicienda, in intestina,
in vterum, in vesicam in sinum aliquem li-
quidiora reddimus.

Sic ladanū oleo largiore solvimus in ca-
pillato aut etiam modice tonso quàm in raso.

Nunc vt colari & colādo purgari ab ex-
crementis possit, vt liquores aceto vel alio
humore idoneo soluti colantur, & purgan-
tur, Ammoniacum, opopanax, galbanum,
sagapenum: Sic succi siccati, gummi, resī-
nae recentes aliquando & veteratae ad ele-
ctariorum mollium, catapotiorum, linimē-
torum, vnguentorum, ceratorum, emplastro-
rum mixtionē, sed lachrimae resinosae, oleo-
sis: gummosae, aquosis humoribus melius
solvuntur: vel ipse recentes alia sicciora dis-
solvunt, sed vt dixi similia magis, idque dum
molle medicamentum est futurum, in quem
usum multa quoque huius generis coquun-
tur. Eadem portione parva cum multis sic-
cioribus teruntur, vt in pulvere hierae dia-
colocynthidos.

Lyc

Lycium aqua diluitur Galeno ad hæmor- *lib. 3.*
rhagiam. *c. ph. p.*

Pix liquida cum melle lingitur. *Lib. 4.*

Tragacantha in oui alunne soluitur in ar- *c. ph. p.*
teriatam.

Fel scari piscis cum myrrha stacte misce-
tur, stomaticha medicamenta dissoluuntur
aqua vel mulla ad gargarizandum, dissol-
uuntur humore quouis & sine calore, prom-
ptius cum calore.

Bolus Armenia vera, terra lemnia vera,
calx, sal, saccharum, saccharata omnia, man-
na, cerussa post longam velut bullationem,
chalcitis, chalcanthum, ærugo, rubigo: sed
hæc oleo citius mollescit.

Dissoluuntur aceto forti, præsertim di-
stillato vel succo limonum vniones seu mar-
garitæ. Testæ ouorum, lapides renum, ve-
licæ, corallium vtrunque, eaque post sicca-
ta promptè friantur. Præcipitatum & subli-
matum & cinabrium, & in argentum viuum
redeunt.

Etiam aurum & argentum & metalla alia *Hæc in suc-*
suis valentibus aquis dissolunt chymistæ. *coporri*

Soluuntur ergo simplicia quidem an- *soluuntur*
moniaccum, sagapenum, galbanum, opopanax, *in pilulis*
thus masculum, opium, scammonium, aloë, *fatidis, in*
hypocisthis, succus glycyrrhyze, pissasphal- *succo bras-*
tum, mumiam intelligo. *sica in pi-*
lulis ex o-
popanace.

Aqua simplicī, aqua vini, vino, aceto simil-
bus & his frīg. dis, sed lōg. ore tēpore quā-
calidis. Feruētibus enim his humoribus pig-
dicta citō soluantur: priora quinque in la-
ctem quēdam succum, posteriora totidem
in nigrum.

Opium soluit saxa Galeno in trociscis
dia epīu.

In oleo frigidō prādicta etiam horis. 6.
non mollescunt quidem, in calēte opium,
scammonium, aloē, hypocistis, succus gly-
cyrrhizæ, etiam soluantur, cātera molle-
scunt tantum, postea durantur prāsertim
Ammoniacum. In eodem oleo & prādi-
ctis humoribus etiam calētibz ladanum
mastiche. Myrrha bdellium, sarcocolla,
styrax, gummi arabicum. Sarcocolla in
āqua rosarum dissoluitur in pilulis sarco-
collæ.

Castorium, mumia, mollescunt statim:
tragacantha tardius, sed in oleo hæc molli-
ta non multō post durescunt prāter masti-
chen, quæ soluitur in oleum nec ad naturam
reddit nisi igne valentiore coquatur, ut de-
cet oleum mastichinum.

Acacia nostras, sulfur, gagates in his om-
nibus humoribus etiam feruentibus, nihil
mutantur, sed acacia paulatim pistillo ex
humore aliquo friata soluitur, ut succi alii
&

& liquores, sulfur & gagates igni liquantur, vt liquores omnes, opium, ladanum, chalcitis, chacanthum, alumen omne, xylaloë vera, vnguis odoratus.

Soluuntur humore quouis calido chalcāthum, chalcitis, & hæc etiam aceto frigido.

Erugo, fori, nitrum, alumen, in aceto frigido non liquefcunt, vt nec creta: sed hæc multum diuque feruet, fitque multò fragilior, vt & prædicta.

Saccharum, manna, quouis humore soluntur. Saccharū autē ad syrupos, iulepos, apozemata, electaria solida, penidia, trociscos, & alia opera plurima variè soluitur vt in antidotis Mesuæ leges. Saccharū aqua & melle soluitur Mesuæ in diazingibere. Manna verò fere soluitur iuscūlo calente. & colatur, ad foliorum laricis in qua frequētiō colligitur, & aliorum excrementorum separationem.

Manna, calsia, thamar indi in succis purgatis dissoluuntur & colantur in diamāna, & in aliis, melius sic miscentur quam coctiōne. Manna dissoluitur in succo rosarum rubrarum in altero mannæ. Moschus, ainbra, caphura, ferè humore aliquo soluta aliis miscentur.

Tartarum vstum, in oleum vi frigidi soluitur, alio solutionis modo.

Sed vide ne dam acetum vel humorem alium quo ammoniacum vel alium liquorem soluiti, coquendo consumis, fallaris. Nam sæpè humorem alium ex se remittunt: quem si consumere pergis, ipsorum liquorum humidum consumis: huncque hi viciissimè, & exucci, & emplastro ob id inepti.

Quæ verò composita quibus humoribus soluantur, non est operis præsentis docere, sed ad modum componendi singula medicamenta pertinet.

Composita tamè plurima, ut electuaria, purgatoria cum aut ingrata sint aut ægrè deuorantur, aut citius descendere volumus, neque nausea metuitur, ptisanæ aqua, hydromelite, vino, vel alio humore idoneo dissoluimus. Trociscos in cote medica ex humore idoneo etiam in collyria humida sæpè dissoluimus, eclegmata in ore salina soluntur.

Ex his constat solutionis nomen hic minus latè patere quam cap. 6. lib. 4. metheororum, ubi ad mollitionem & liquationem quoque extenditur.

DE MOLLITIONE.

MOLLITIONE solutioni & liquationi proxima, fit cum medicamenta tam simplicia quam composita reddun-

tur molliora, idque vel affuso humore aliquo sed pauco, vel solo calore nostro solis, ignis id vulgus malaxare vocat, verbo de-
torto ex futuro *μαλάσειν*, verbi *μαλάσσω*, id
est mollio & subigo: quæ duo per malaxa-
re etiam intelligunt, nec eò libenter vtun-
tur alibi quam tum in catapotiiis cum succo
aut syrupo aut humore alio remolliendis &
subigendis, tum in emplastris oleo, adipe,
vel simile emolliendis.

Calore mollescunt cornua, vngulae, pi-
li, succi, liquores, lachrimæ vt etiam digi-
tis calentibus tantum tractatæ, ceræ modo
ductiles fiant tanquam à frigido concretæ
non solum sicco duratæ. Calore modico
mollescit ferrum, & alia metalla immodico
liquantur.

Zitho (qui potus erat Alexādrinorum,
nostræ ceruiciæ similis) ebur mollescit.

Vniones, corallia aceto distillato mol-
lescunt, & vt dixi, soluuntur.

DE D V R A T I O N E.

D V R A T I O mollitioni contraria no-
bis interdum est in vsu in conditis ele-
ctariis, ceratis, emplastris, gelatinis vt vo-
camus. Ea autem fit nunc mistis sicciori-
bus, nunc multa coctione, nunc frigore co-
agulante. De siccatione autem postea fu-
sus agemus adhibenda medicamentis plu-
rim

rimis non vt dureſcant, ſed vt ſeruari poſſint. & ob cauſas alias in ibi dicenda. De calfacti one quoque & refrigeratione paulò poſt dicemus, quarum tractatio duratione abundè illuſtrabit.

DE LIQVATIONE.

LIQVATIO ſeu fuſio eſt eorùm quæ à frigido concreuerunt in liquidiorẽ & fluxilem conſiſtentiam à calore factare. ſolutio: ita, vt quæ à frigore imbecillo aut non diuturno ſunt concreta, vt mel, cera, oleum hibernum, butyrum, adipēs, medullæ: reſinæ à calore moderato glaciẽ niuiſ & grandinis modo liquentur. Quæ verò à vehementi & diuturno frigore concreta obriguerunt ægrè multo calore funduntur, vt aurum, ferrum ægerime, argentum, æſfacilius, ſtannum hiſfacilius, facilimè plumbum, ſtinumy, arſenicum, ſandaracha, ſulfur, alumen omne (quamuis ſciſſile tantum molleſcere videatur non etiam liquari & fluere) calcitīs, chalcanthum, miſy & ærugo tardius, tardiſſimè ſorī (quia terreum & ſaxeum) vt lythargyros. Iſ tamen cum æruginẽ vel oxelæo duplo citius liqueſcit quàm cum hydrelæo duplo.

Hiſ promptius, liquantur gagates, ſuccinum, vnguis odoratus, id eſt blatta bizantia,

tia, asphaltum, pissasphaltum (inumiani intelligo) xylaloë.

His promptius, ladanum, Oesvypus, castorium, sanguis hirci, gummi arabicum, tragacantha, cancanum, caphura, myrrha, bdellium, styrax, mastiche, sarcocolla, gummi hedere, juniperi, cerasi, pruni, amygdalarum.

Resinæ his facilius. Aequè autem facilè liquores opium euphorbiû, ammoniacum, sagapenum, galbanum, opopanax, scammoniû & succus glycyrrhyze, hipocisthis, aloë, elaterium, lycium nostras.

Cera omnium facillimè. Mel, aeromeli seu manna, saccharum, humore etiam frigidò ut sal solvuntur.

Acacia nostras & sæpe non liquantur, humore aliquo cum pistillo, aut cochleari aut manu paulatim solvuntur.

Prædicta quoque omnia succos, liquores, gummia, resinas intelligo, calenti humore, ut dixi mollescunt: quædam etiã solvuntur: nonnulla item liquantur.

Ambra minutim cōcisa liquefcit Mesuæ in E. diaccocubaphices.

Porro liquationis necessitas magna est ad mitionem electariorum, catapotiorum, vnguentorum, ceratorum, emplastrorum, & reliquorum propè compositorum.

Quon

Quoniam in superioribus præparandi differentiis virtum caloris, frigoris, lumentationes, & siccationes meminimus, & in sequentibus eorundem mentio frequens nobis est futura, rursus de his est nobis agendum, quam ad infusionem, coctionem, assationem, vitionem & alia multa, caloris & aliarum primarum qualitatum opera, transeamus.

DE CALFACTIONE.

DE calfactione autem agemus non quatenus soluit, mollit, liquat, coquit, assat, vrit, vel aliud insigne opus præstat, sed quatenus calorem rebus præbet moderatum, mitioni necessarium, vel etiam aliqui præparationem differentia, vel ipsi denique medicamentorum simplicium, vel compolitorum vsui dextero.

Calefit in sole meridiano acopum, Gale ni populeum lib. 4. sanis. tuendæ, ut feracientur & probius misceatur eorum vires.

In sole teri vult Galenus metallica, vel lauanda, vel in aliud vtenda.

Colanda calfactione tenuantur, ut promptius permeent: frigida enim velut concreta non percolantur, nisi erant multum aquosa & liquida, ut oxymeli Galeni, calidiora autem cum sordibus tota colum penetrant, nisi sint glutinosa. Talia enim multum ca-
lid

lida colanda. Tepidam damus aquam, vt sit vomitoria.

Calidas modicè damus potiones medicas, non solum purgatorias, sed etiam corpus firmaturas, vreticas, menses aut sudores moturas, obstructionem viscerum aperturas, praesertim cælo frigido & ventriculo frigidiorè natura, aut ex morbo.

Calefacimus aquam & alia omnia quæ aqua fluere, aut niue circumposita volumus frigidiora reddere, quòd in humorem calore rarefactum frigus se altius insinuat vt ferrum cædens aqua frigida & astringente temperatur, vt sit durius.

Calefacimus modice infundenda, vt vires suas promptius in humorem, cui infunduntur, transmittant. Calfactus enim humor tenuatur & infusa res rarefit, quibus fit, vt eorum vis calore promptius trahatur, Alia propè innumerabilia calfactione egent, sed admonendi gratia magis quàm docendi calfactionis, refrigerationis & humectationis meminimus: siccationis autem maior est necessitas.

Refrigeramus aqua fluente, aut niue, aut glacie etiam prius calefacta, quæ febrium vehementia, aut aëris intemperiei callidæ opponimus pocula medicamentosa. Et quæ à frigido cogi volumus, vt ius carniæ glutin

tinofarum in gelatinam vulgò dictam.

Refrigeramus omnia calore præparata priusquam reponamus.

Refrigeramus quæ calore soluta frigore volumus concrefcere, & durescere, vt electaria sicca, cerata, emplastra.

Quæ calfaciunt, & refrigerant etiam per accidens siccant, ob id ordine bono iam desiccantibus agamus.

DE SICCATIONE.

SICCATIO est consumptio humiditatis, aut noxiæ, aut excrementosæ, ob id nauseabundæ, vel promptè putrentis, vel pulverari prohibetis, vel caliditatem quæ sitam obruētis. Absumitur interdum, & naturæ humiditatis aliquid, plurimum autem in assatione & vstione.

Scillæ partes maximè mediæ direptis viuo tenus tunicis, frustatim coniectæ coquuntur, mutata sæpè aqua, donec ipsa nec amaritudinem, nec acrimoniam habeat, tractatæque lino frustra illa sic, vt se non contingat siccantur in umbra dies. 40. His segmentis ad oleum, vinum, acetum, scillinum, vtitur. Hæc Diosc. vbi neque cultri ex ligno pini vel cupressi scillam diuturni mement, neque acus ligneæ, cum Meuar in aceto scillite, nec medium eius abiciendum iubet,

bet. (quod hodie solenni quodam more fieri ab omnibus video) sed tantū. tunicas externas ad vsque viuas & integras.

Triticum electum negligenter tritum aqua per noctem maceratum, postridie manibus expressum reddit cremorem: qui dum recederit, inclinato vase quod supernatat sensim effundendum, reliquum bombace vel sole æstiuo mox siccandum, ne ace scat: repositum operculetur metu vermium: hoc amyllum, hieme igni siccet. Sic ex oriza & hordeo, & alius fieri potest.

Rosæ mediocriter apertæ sereno cælo mane lectæ eodem die vt sunt siccentur sole, si potes, sæpè vertendo. Nam vix vmbra siccauerit, quanquam id effecti optatius, siccatas auelle, & recunde vase vitreo operculato, vt odor & color perseuerent. Meliores montanæ campestribus & minus minuuntur siccando, cum ex harum libris decem siccatis libr. vnica supersit quibusdam, idem de violis. Scilla siccantur in eclegmate Mes. *Lib. 4. s. 4.* suæ ad asthma, ad saccharum rosarum & violæ, *ni.* latū, rosas & violas modice siccat Mesues, hyssopus in eclegmate sano, mēta in eclegmate aromatum, ruta in altero diacymino Mesux, vt in Galeni diospolitico, sed modice. Nam suprā modum siccata, acrior, amarior, calidior euadit, non siccata flatus

minus discutit, quia humorem quēdā excrementosum nondum percoctum retinet.

Herbæ item reliquæ umbra siccantur, nisi vtendi necessitas cogat te quasdam igni vel sole siccare. Nā in manipulis ligatæ, in granario pensæ siccantur, vbi siccata sunt, sacculis cannabinis ibidem reponuntur.

Radices herbarum lotæ, à lignosa matrice seietæ, mox insolentur, nocte in aëre sicco perflatili seruentur, iterum soli reddantur donec erunt probè siccata. Quod si calidum est nubilum, sicca fumo aut potius propè ignem, in calathio stramentitio vel saligno: aut si vtendi celeritas virget sartagine calida, & ab igni remota ipsas toties impone identidem vertendo, & sartagine recalificiendō exemptis tunc radicibus, donec abundè erunt siccata, sic radix enulæ, valerianæ, acori nostratis siccatur. Idem in radicibus quorundam fruticuni, vt capp. tamariicis: & arborum, vt fraxini, morisacindum est.

Radices iam siccatae si ægrè puluerantur, papyro insertæ igni siccantur, vel calidæ sartagini imponuntur, & igni exponuntur: igni autem vel in sartagine vel papyro, vel fumo vel suprà, aut intra furnum, à quo panis extractus est. Radices eadem, & aliæ magnæ recentes, lotæ, radiculis purgatæ, ac per

per tessellas incisæ; filoque transfixæ par-
uis interuallis, ne se turgent, in aëre ven-
toso & perflatili siccantur, vt radices ireos,
aristolochiæ rotundæ & longæ, bryo-
niæ, & similia: quæ tamen etiam citra
diuisionem probe siccantur, vt radix ari-
dracunculi, cyclamini, asphodeli, vti eli-
gnatæ, prius istæ mandragoræ, eryngii,
apii: petroselini, fœniculi, rusci, turbiti,
hellebori vtriusque, dictamni, vulgaris tha-
psii. Paruæ radices aliæ citra elignationem
in vmbra quoque siccantur, vt asari, aspara-
gi, graminis.

Colocynthis septembri legitur dum fla-
uescit, maxima, & cum aliis multis produ-
cta, insolatur diu, quia ægrè siccatur, & no-
cte in aëre perflatili reponitur, aut si cælum *Mesues.*
est nubilum filo transfixa fumo siccatur,
post excorticatur, vt teratur, ite quarta par-
te hore inuoluta papyro insolatur, vel igni,
aut fumo admouetur.

Aloë decocto aromatum imbuta sicca-
tur, primo in vmbra, deinde in sole sic my-
robalani tritæ oleo amygdalarum dulciū,
æstate triduo confricatæ, & quoties opus
erat irrigate siccatur primum in vmbra, de-
inde in sole. Trocisci tamen ex his facti in
vmbra tantum siccantur.

Pulmo vulpis sanæ, venatu captæ, inue-

nis, aqua abluatur, incidatur secundum arteriam venosam, & magis multò secundum venam arteriosam, sanguine purgetur, vino albo, odoro, modice calido lauetur, ollæ impositus clibano parum calido siccetur, refrigeratus & foliis absinthii inuolutus reponatur. Plura de his leges in fine, in his quæ pluribus modis præparantur.

Amygdalæ & nuclei pinei cortice tenui ablato in pelui super prunas ignitas per se vel positius cum sulfure ducantur, & succutiantur donec humiditas rancida, aut excrementosa consumatur, alioqui pectori nocent, & tussim excitant qualitate rancida, Pruna, ficus, vuæ, zinzipha, myxa, pyra & alii fructus multi sole feruidissimo, aut eius penuria igne siccantur: sed vuæ oxyacanthæ vmbra siccatur.

Fructus quoque rubi immaturi clibano siccantur ad maiorem astringentiam, & mora viridia aut subrubentia. Fella in folliculo parvi cocta ex aqua calente in vmbra siccantur. Coagula animalium parum salita insolatu siccata seruantur.

DE HVMECTATIONE.

HVMECTANTVR nunc aqua, nunc lacte, nunc aceto, nunc oleo, vel alio humore medicamēta non modo simplicia, vt foelicius & innocētius in compositionem vel

vel vsum veniant, sed sapè etiam compo-
ta, vt cum crassa, humore diluimus, quò fa-
cilis & iucundius deuorentur.

Caryophyllum, zingiber, myrobalanos,
cepulas, & emblicas ad condituram qua in-
dustria humectes docet Mesues initio libr.
sui de antidotis & in simplicibus.

Mastiche, moschos, ambra, terendo hu-
meantur aqua rosata.

Gummi Arabicum, tragacantha, aqua
etiam vini myrobalani, scammonium, colo-
cynthis, caphura, turbith, sericū, crocus, eu-
phorbium, & alia plæraque, terendo hume-
antur oleo amygdalarum dulcium.

Amygdalæ, strobili, pistacia, parum hu-
meantur aqua dulci aut rosata ad melio-
rem trituram & saporem delicatum, si
emulsionem, amygdalarum, marci panes, fa-
cturus es, alioqui pinguescunt, & palato in-
gratæ sunt & ventriculo, vt etiam nausea-
bunde fiant.

DE INFUSIONE.

HUMECTIONI proxima est infu-
sio in hac enim medicamenta parum
trita aut concisa, nisi minuta sint, maceran-
tur & temperantur humore aliquo scopis
nostris apto, eò magis minus calido à sole
vel igni potius quam frigido. Tempus au-

tem quo id fit varium est. Nam nunc infunduntur semihoram, nunc horam nunc horas plures, dies, menses pro varia medicamenti natura & aliis medicorum scopis. Vt enim quædam parum diu terenda & coquenda, sic infundenda, quod virtutem habent vel imbecillam vel superficiariam, & rara sint admodum. Contraria diutius infundenda. Varii præterea scopi medicorum faciunt, vt nunc minus diu, nunc diutius quædam sint infundenda, & quædam (vt nuper distinxi) minimo aut mediocri, aut valido calore in id fouenda. Medicamenta infundimus, vt facultatem eorum maleficam quidem auferamus vel castigemus: bona verò augeamus, vel in humore ipsum vtendam transferamus, quos tres infusionis scopos præcipuos abundè Mesues docuit libro. 1. & nos lib. 3. de ratione componendi medicamenta.

Infunduntur autem hodie potissimè purgantia medicamenta, sed etiam alia in apozemata, syrupos, olea, & alias cõpositorum medicamentorum differentias.

Humor verò cui infunduntur maximè varius est, pro scopis variis, purgantia tamen si frequenter sero lactis infunduntur, quia purgatorium, & ori iucundum, alia humoribus aliis, vt post audies.

Thym

Thymelææ fructum aut folia & tithy- *Mesues.*
malorum & similiter lactariarum aceto in-
fundimus.

Turbith lacti recens mulso infusum &
siccatum ventrem turbare desinit.

Aloë decocto aromaticum vel specierum
hieræ, & aliorum quorundam calidorum
macerata, citius etiam in ventriculi tuni-
cas altè recepta vacuat, illi autem decocto
si colocynthis aut turbith addatur, etiam à
longinquo trahet, aloë facultate acquisiti-
tia non insita.

Myrobalani obstruere desinunt si infun *Ibidem.*
dantur in serum lactis vel succum fumarie,
addito præsertim absinthio, vel agarico,
vel rha barbaro.

Senna contrita horis. 24. in succis mace-
ratur, semel aut bis feruefit, colatur, exprimi-
tur in syru. Saporis.

Manna maceratur succo. intybi feruefit,
manibus fricatur, colatur in syrup. acido ex
manna.

Rha barbarum infunditur aquæ cichorit *Ibidem.*
vel intybi vel apti vel plantaginis, adiecto
interdum vino albo pauco, & cum Mesuæ
spica, pro variis medici scopis. Id autè ante
infusionem scapro aut cultello in tenuia ve-
lut folia incidatur, potius quàm vulgi mote
teratur, ne vis eius exhalet.

Ibidem.

Thamar Indi infunduntur sero caprino, aut succo fumarie, vel lupuli, modos eorū infundēdo varios lege in simplicibus Mesur.

Ibidem.

Rosæ & violæ infundūtur aquæ aliquoties, vt syrupus inde purgatorius coquatur, infunduntur & aceto, quod ab his rosatum & violatum appellatur.

Alia propè omnia simplicia purgantia variè infundi docet Mesues in simplicibus.

*lib. 4. sani
tatis tuæ.*

Cyminum in dispolitico seu diacymino maceratur. 24. horis aceto, deinde vase terreo bene cocto frigitur, & siccatur, id autem fit vt citra calorem altius penetret ac incidat.

Radices virentes calentes eadem ratione aceto. 24. horis ante vsum macerantur: si autem postea sint coquendæ ex aqua, satis est prius horas. 6. aceto macerasse. Eadem ratione semen anisi, anethi, apii, ameos, amomi, cari, foeniculi.

In oxymelte melanogogo simplicia macerat Mesues horis. 24. aceto albo, aqua, succo, buglossi.

Coriandrum aceto cui incoctus sit sampsuchus maceratum rectè corrigitur.

*Gal. li. 6.
simpli.*

Dactyli aceto macerantur triduo in diaphœnico Mesuræ.

Seinen erysimi aqua macerandum est, ad obtundēdam igneā eius caliditatem, prius qu

quam eclegimatis misceatur.

Nuclei pinei virides aqua macerandi, vt acrimoniam in ea exuant. In E. hamech simplicia infunduntur sero lactis quinque dies Mesuæ. Lupini aqua flumialis diebus. 6. 7. 8. macerati mitescunt & dulcescunt, vti aqua priore abiecta cocti.

Cicera, triticum, hordeum lacte aliquoties infunduntur Mesuæ, & siccantur in puluere impingente. Cicera aquæ incoquantur in diasatyrio secundo, vtrunque fit vt pars eius nitrosa, & tergens, in lac & aquam transferatur, reliqua eius substantia seruetur.

Semen abietis & flores populi macerat dies. 40. oleo Galenus, sæpe tres. 4. & plures menses, postea exprimit oleum digerēs *li. 4. sani.* & acopum.

Sericum crudum cocco baphica tinctum maceratur succo pomorum, succo granatorum, decocto corticum citri & aliis syr. ex succis simplicibus & compositis donec ii succi rubeant, & serini simul & cocci facultatem acceperint.

Infusio hæc dum facultatem medicamenti vel maleficam emendauit, vel bonam auxit: aut in humorem transtulit, finem suum assequuta est: sæpe tamen fit, vt præparatio quædam sit coctionis, sic ante coctionem simplicia aliquandiu macerata pas-

sim reperies, imò & post coctionem, ante ipsam colationem præsertim, dum vis quæ sita ægræ in humorem trahi potest ex materia dura, crassa, densa. Sic lignum, gaiaci, ebeni, buxi, fraxini, geniste, iuniperi etiam tritum aut limatum diu etiam, ad triduum ante coctionem humore aliquo idoneo maceramus, ut vires eius incidentes, tenuantes, tergentes tandem in decoctum trahantur.

Quin & medicamenta nodulo ligata, iusculo vel alteri leuiter incoquimus infusionis loto: & quæ infudimus sepe semel aut bis seruefactimus ante expressionem aut colationem.

Infunduntur præterea quædam tantum, ut tenerescant, idque ad condituram vel coctionem celeriosem.

Mesues in simpli. & conditis li. 7. c. pb. p. & Mesues in antidosis. Sic Mesues myrobalanos ad condituram aqua & hydromelite humectat, & dies octo sero caprino macerat, post semel seruefacit. Capita papaueris forpicibus minutim comscisa macerantur cum semine aqua pluuia vel fontana die vno: vel si iam sicciora sunt, etiam biduo & triduo, ut tenerescant ad diacocti compositionem.

Myrobalani oleo amygdalarum dulcium, vel violato, vel rosato, vel sesamino imbuntur & irrigantur, postea siccantur: id qu

quod ipsis infusio seu affusio seu perfusio quædã est. Dum item hæc tritæ oleo amygdalarum dulcium triduo per æstatem confricantur affuso oleo quoties opus est deinde siccantur. Altero autem triduo similiter in sole confricantur ex aqua saccharata, vel sero saccharato, & postea formentur in trociscos Mesuæ. Nisi nutritionem esse mannis de qua mox dicemus, vti & dum species hieræ hermetis tritas inuoluit bis succo cucumeris agrestis, & sicca, vt eius succi vires puluis in se trahat.

Alia infunduntur vt dissolui possint: sic Ammoniacum, opopanax, galbanum, sagapenum, & liquores alii aceto vel humore alio super cineres calidos ferè infunduntur vt soluantur. Fractos eosdem hydromelite infundit in hiera archigenis ex Paulo, vino autem infunduntur in hiera hermetis, in hiera autẽ diacolocynthidos rufi, myrrham solam vino infundit: sagapenum & opopanax cum alijs terit, vt nos hodie in hiera diacolocynthidis pacci facimus: in qua tamen scribonius opopanaxem & sagapenum in mortario terit adiecto melle tenui, id est quam liquidissimo, infunduntur eadem ratione gummi & ichthyocolla, vt dissolui possint, vel vt in muccaginem abeant, quo fine etiã semina & radices lentore aliquo præditæ,
hum

humore calfacto macerantur. Sed de his in succorum extractione mox audies.

Ad infusionem reducitur infectio seu tinctura, ut sericum succo cocci baphicæ tinctum ad compositionem cardiacam celebrem diacoccu baphices: & in syrup. de pomis, & de granatis, & de corticibus citri. Quanquam idem sericum sic tinctum prætereà succis illis infundatur, donec succi rubuant, & serici atque cocci vires in se traxerint.

Filum purpura marina tinctum, si postea viperam strangularit, ad paristhmia est efficacissimum Gal.

DE NVTRITIONE.

NUTRITIO quoque quam vocant, fuerit infusionis species, sic autem est appellata hæc præparationis differentia loquentibus abusu, quod quemadmodum per veram nutritionem fit vacuati repletio, & etiam incrementum, quandiu scilicet id fieri ex partium sequaci mollitie potest: sic medicamenta quæ humore aliquo imbuta, macerata, tribulata, confricata, præsertim calfacto velut augentur.

Sarcocolla alba, magis glebis constans, lacte muliebri nutritur, sed paucò. Nā multo lacte operta liquefit, & lac ipsum prius quam sarcocolla siccetur, accessit: paucum

igitur ex mammis ipsis irrigandum confectum sole ficcetur, iterum & tertio, quarto, quinto, similiter irroretur & ficcetur, & tandem reponatur. Aspergi etiam asinae, caprae, equae, lactae, vel alio potest. Semen cari calfactum lacte caprino horas duas quidem nutrit in vase niundo, exemptum ficcaturq; reponunt ad fluorem alui.

Myrobalani oleis, sero saccharato, butyro vaccino, succo cydoniorum, vel alio humore dum irrigat, macerat, fricat, frigit Mesues clementer, & his humoribus imbuat vel ad condituram, vel ad noxas earum castigandas, siue solae vtendae, siue incompressa veniant, vt trypheram sarracenicam & persiccam, trypheram Galeni, elec. stomachicum Mesuae, & elec. alhari & sequens quodammodo nutrit. Sic & species omnes elec. Indi maioris, dum oleo amygdalino confricat idem.

Colocynthis quoq; seminibus solis extractis, si impletur aqua cum pauca spica & mastiche, & coquitur in cinere calido ad partem tertiam consumptionem: hocque decocto paulatim affuso sagapenum irrigetur, donec pinguescat, nutriti dicitur sagapenum, eodem modo & opopanax. Decocto myrobalanorum, vel succo enulae campanae, aut rutae, aut foeniculi cum felle paucum auum rapa

pacium, & spica & mastiche ad dimidium co-
cto & colato idem fieri potest.

Folia etiam thymelææ aceto nutriun-
tur in elec. diaphysfaliden. Eadem in aceto
infundit & siccatur in pilulis thymelææ, ut ea-
dem sint vel saltem omnino proxima infu-
sio & nutritio. Ambæ enim humore sunt &
calore blando, qualis ad nutritionem verā
est aptissimus, cum immoderatio vrat, im-
becillior sit inefficax.

Metallica ferè in aëre calido non tamen
super ignem nutriuntur.

Metallica etiam sæpe nutriuntur humo-
re aliquo, ut dissoluantur promptius, vel
etiam liquentur, vel pinguescant, & velut
austa tuinescant.

Scoria ferri in aceto dies quinque in try-
phera minore, Mesuæ, & tryphesa moscha-
ta, & tryphera Galeni.

Lithargyros nutritur orelo sic, ut vn-
ciæ eius triti quatuor tandem olei libram
vnam, aceti quartaria quinque ac eò plus ebibant,
idque omnino sine igne, multum diuq;
pistillum per mortarium docendo. Nam li-
thargyro etiam vncia vna corpus dat pluri-
mum, ut etiam sine cera emplastrum perficiat,
sed initio diu tere primum cum paucio
oleo, postea affuso vicissim paucio aceto.
Nam multò sic mergitur, ut corpus nō asse-

quatur. Vbi autem initio paulatim nutrita est, & consistentiam crassiore infriando assequuta, tum largiorem vtriusque copiam ebibit. Continenter autē friatur ad horas duas, tres, nisi quod per initia potes aliquātis percellare, vt interim velut in otio largius comibat. Sic & chalcitis, & scoria ferri, & aerugo, & metallica cætera ex oxelæo in vnguenti formam diufitando duxi, sed bibacissima est lithargyros: opinor, quia siccißima & rara modicè.

DE EXPRESSIONE.

EXPRESSIO est humida, & tenuis substantiæ separatio, à sicca & crassa duro aliquo & valido compressu facta, fit autem sæpe torculari & eo multiplici, quale vinum ex vinaceis exprimunt, & quale pinxit Mesues in oleo amygdalarum dulcium, quale item vsurpamus in exprimendis oleis, & succis aliis, & decoctis, & carnibus, & similibus: siue id torcular est, siue prælum librarium, vt in oleo amygdal. dulcium. Mesuæ diximus. Ferè autem exprimenda, ne diffuant aut dissiliant inuoluimus panno forti, vt cannabino, caprino, setaceo. Est quando tantum caprino aut lineo inuoluimus, & manibus ac digitis prælorum loco vtimur, vt dum medicamenta purgantia infusa exprimimus. Adde quod nunc den

nis, aqua abluatur, incidatur secundum artem venosam, & magis multò secundum venam arteriosam, sanguine purgetur, vino albo, odoro, modice calido lauetur, ollæ impositus clibano parum calido siccetur, refrigeratus & foliis absinthii inuolutus reponatur. Plura de his leges in fine, in his quæ pluribus modis præparantur.

Amygdala & nuclei pini cortice tenui ablato in pelui super prunas ignitas per se vel positius cum fursure ducantur, & succutiantur donec humiditas rancida, aut excrementosa consumatur, alioqui pectori nocent, & tussim excitant qualitate rancida, Pruna, ficus, vuæ, zinzipha, myxa, pyra & alij fructus multi sole feruidissimo, aut eius penuria igne siccantur: sed vuæ oxyacanthæ umbra siccantur.

Fructus quoque rubi immaturi clibano siccantur ad maiorem astringentiam, & mora viridia aut subrubentia. Fella in folliculo parui cocta ex aqua calente in umbra siccantur. Coagula animantium parum salita in solatu siccata seruantur.

DE HYMECTATIONE.

HYMECTANTVR nunc aqua, nunc lacte, nunc aceto, nunc oleo, vel alio humore medicamenta non modo simplicia, ut foelicius & innocetius in compositionem vel

vel vsum veniant, sed sæpè etiam compo-
ta, vt cum crassa, humore diluimus, quò fa-
cilis & iucundius deuorentur.

Caryophyllum, zingiber, myrobalanos,
cepulas, & emblicas ad condituram qua in-
dustria humectes docet Meisues initio libr.
sui de antidotis & in simplicibus.

Mastiche, moschos, ambra, terendo hu-
meantur aqua rosata.

Gummi Arabicum, tragacantha, aqua
etiam vini myrobalani, scammonium, colo-
cynthis, caphura, turbith, sericū, crocus, eu-
phorbium, & alia plæraque, terendo hu-
meantur oleo amygdalarum dulcium.

Amygdalæ, strobili, pistacia, parum hu-
meantur aqua dulci aut rosata ad melio-
rem trituram & saporem delicatum, si
emulsionem, amygdalarum, marci panes, fa-
cturus es, alioqui pinguescunt, & palato in-
gratæ fiunt & ventriculo, vt etiam nausea-
bunde fiant.

DE I N F U S I O N E.

HUMECTATIONI proxima est infu-
sio in hac enim medicamenta parum
trita aut concisa, nisi minuta sint, maceran-
tur & temperantur humore aliquo scopis
nostris apto, eò magis minus calido à sole
vel igni potius quam frigido. Tempus au-

tem quo id fit varium est. Nam nunc infunduntur semihoram, nunc horam nunc horas plures, dies, menses pro varia medicinali natura & aliis medicorum scopis. Ut enim quædam parum diu terenda & coquenda, sic infundenda, quod virtutem habent vel inbecillam vel superficiariam, & rara sint admodum. Contraria diutius infundenda. Varii præterea scopi medicorum faciunt, ut nunc minus diu, nunc diutius quædam sint infundenda, & quædam (ut nuper distinximus) minime aut mediocriter, aut valido calore in id fouenda. Medicamenta infundimus, ut facultatem eorum maleficam quidem auferamus, vel castigemus: bona verò augeamus, vel in humore ipsum utendam transferamus, quos tres infusionis scopos præcipuos abundè Mesues docuit libro. 1. & nos lib. 3. de ratione componendi medicamenta.

Infunduntur autem hodie potissimum purgantia medicamenta, sed etiam alia in apozemata, syrupos, olea, & alias compositorum medicamentorum differentias.

Humor verò cui infunduntur maxime varius est, pro scopis variis, purgantia tamen frequenter sero lactis infunduntur, quia purgatorium, & ori iucundum, alia humoribus aliis, ut post audies.

Thym

Thymelææ fructum aut folia & tithy- *Mesues.*
malorum & similiter lactariarum aceto in-
fundimus.

Turbith lacti recens mulso infusum &
siccatum ventrem turbare desinit.

BO Aloë decocto aromatum vel specierum
hieræ, & aliorum quorundam calidorum
macerata, citius etiam in ventriculi tuni-
cas altè recepta vacuat, illi autem decocto
si colocynthis aut turbith addatur, etiam d
longinquo trahet, aloë facultate acquisi-
tia non insita.

Myrobalani obstruere desinunt si infun *Ibidem.*
dantur in serum lactis vel succum fumarizæ,
addito præsertim absinthio, vel agarico,
vel rha barbaro.

Senna contrita horis. 24 in succis mace-
ratur, semel aut bis feruescit, colatur, exprimi-
tur in syru. Saporis.

Manna maceratur succo. intybi feruescit,
manibus fricatur, colatur in syrup. acido ex
manna.

Rha barbarum infunditur aquæ cichorii *Ibidem.*
vel intybi vel apli vel plantaginis, adiecto
interdum vino albo pauco, & cum Mesuæ
spica, pro variis medici scopis. Id autè ante
infusionem scapro aut cultello in tenuia ve-
lut folia incidatur, potius quàm vulgi more
teratur, ne vis eius exhalet.

Ibidem.

Thamar Indi infunduntur sero caprino, aut succo fumarie, vel lupuli, modos eorū in fundēdo varios lege in simplicibus Mesur.

Ibidem.

Rosæ & violæ infunduntur aqua aliquo ties, vt syrupus inde purgatorius coquatur, infunduntur & aceto, quod ab his rosatum & violatum appellatur.

Alia propè omnia simplicia purgantia vatriē infundi docet Mesues in simplicibus.

*lib. 4. sani
tatis tuæ.*

Cyminum in dispositico seu diacymino maceratur. 24. horis aceto, deinde vase terreo bene cocto frigitur, & siccatur, id autem fit vt citra calorem altius penetret ac incidat.

Radices virentiæ calentes eadem ratione aceto. 24. horis ante usum macerantur: si autem postea sint coquendæ ex aqua, satis est prius horas. 6. aceto macerasse. Eadem ratione semen anisi, anethi, apii, ameos, amomi, cari, fœniculi.

In oxymelite melanogogo simplicia macerat Mesues horis. 24. aceto albo, aqua, succo, buglosi.

Coriandrum aceto cui incoctus sit sam-psuchus maceratum rectè corrigitur.

*Gal. li. 6.
simpli.*

Dactyli aceto macerantur triduo in diapœnico Mesur.

Scinen erysimi aqua macerandum est, ad obtundēdam igneā eius caliditatem, prius-
qu

quam eclegmatis misceatur.

Nuclei pinei virides aqua macerandi, vt acrimoniam in ea exuant. In E. hamech simplicia infunduntur sero lactis quinque dies Mesuæ. Lupini aqua flumialis diebus. 6. 7. 8. macerati mitescunt & dulcescunt, vti aqua priore abiecta cocti.

Cicera, triticum, hordeum lacte aliquoties infunduntur Mesuæ, & siccantur in puluere impingente. Cicera aquæ incoquantur in diasatyrio secundo, vtrunque fit vt pars eius nitrosa, & tergens, in lac & aquam transferatur, reliqua eius substantia seruetur.

Semen abietis & flores populi macerat dies. 40. oleo Galenus, sæpe tres. 4. & plures menses, postea exprimit oleum digerēs *li. 4. sani.* & acopum.

Sericum crudum cocco baphica tinctum maceratur succo pomorum, succo granatorum, decocto corticum citri & aliis syr. ex succis simplicibus & compositis donec ii succi rubeant, & serini simul & cocci facultatem acceperint.

Infusio hæc dum facultatem medicamenti vel maleficam emendauit, vel bonam auxit: aut in humorem transtulit, finem suum assequuta est: sæpe tamen fit, vt præparatio quædam sit coctionis, sic ante coctionem simplicia aliquandiu macerata pas-

sim reperies, imò & post coctionem, ante ipsam colationem præsertim, dum vis quæ- sita ægræ in humorem trahi potest ex ma- teria dura, crassa, densa. Sic lignum, gataci, ebeni, buxi, fraxini, geniste, juniperi etiam tritum aut limatum diu etiam, ad tri- duum ante coctionem humore aliquo ido- neo maceramus, ut vires eius incidentes, te- nuantes, tergentes tandem in decoctum tra- hantur.

Quin & medicamenta nodulo ligata, iusculo vel alteri leuiter incoquimus infu- sionis loco: & quæ infudimus sepe semel aut bis seruescimus ante expressionem aut co- lationem.

Infunduntur præterea quædam tantum, ut tenerescant, idque ad condituram vel co- ctionem celeriolem.

*Mesues in
simpli. &
conditiis
li. 7. c. pb.
p. & Me-
sues in an-
tioditis.* Sic Mesues myrobalanos ad condituram aqua & hydromelite humectat, & dies octo sero caprino macerat, post semel seruescit. Capita papaueris forpicibus minutim cõ- scisa macerantur cum semine aqua pluvia vel fontana die vno: vel si iam sicciora sunt, etiam biduo & triduo, ut tenerescant ad diacoiii compositionem.

Myrobalani oleo amygdalarum dulciũ, vel violato, vel rosato, vel sesamino im- buuntur & irrigantur, postea siccantur: id qu

quod ipsis infusio seu affusio seu perfusio quædã est. Dum item hæc tritæ oleo amygdalarum dulcium triduo per æstatem confricantur affuso oleo quotiēs opus est, deinde siccantur. Altero autem triduo similiter in sole confricantur ex aqua saccharata, vel sero saccharato, & postea formentur in trociscos Mesuæ. Nisi nutritionem esse manuis de qua mox dicemus, uti & dum species hieræ hermetis tritas inuoluit bis succo cucumeris agrestis, & sicca, ut eius succi vires pulvis in se trahat.

Alia infunduntur ut dissolui possint: sic Ammoniacum, opopanax, galbanum, sagapenum, & liquores alii aceto vel humore alio super cineres calidos ferè infunduntur ut solvantur. Fractos eosdem hydromelite infundit in hiera archigensis ex Paulo, vino autem infunduntur in hiera hermetis, in hiera autè diacolocynthidos rufi, myrrham solem vino infundit: sagapenum & opopanax cum aliis terit, ut nos hodie in hiera diacolocynthidis paccii facimus: in qua tamen scribonius opopanaxem & sagapenum in mortario terit adiecto melle tenui, id est quam liquidissimo, infunduntur eadem ratione gummi & ichthyocolla, ut dissolui possint, vel ut in muccaginem abeant, quo fine etiã semina & radices lentore aliquo præditæ,
hum

humore calfacto macerantur. Sed de his in succorum extractione mox audies.

Ad infusionem reducitur infectio seu tinctura, ut sericum succo cocci baphicæ tinctum ad compositionem cardiacam celebrem diacoccu baphices: & in syrup. de pomis, & de granatis, & de corticibus citri. Quanquam idem sericum sic tinctum prætereà succis illis infundatur, donec succi rubeant, & serici atque cocci vires in se traxerint.

Filum purpura marina tinctum, si postea viperam strangularit, ad paristhmia est efficacissimum Gal.

DE NVTRITIONE.

NVTRITIO quoque quam vocant, fuerit infusionis species, sic autem est appellata hæc præparationis differentia loquentibus abusiue, quod quemadmodum per veram nutritionem fit vacuati repletio, & etiam incrementum, quando scilicet id fieri ex partium sequaci mollitie potest: sic medicamenta quæ humore aliquo imbuta, macerata, tribulata, confricata, præsertim calfacto velut augentur.

Sarcocolla alba, magis glebis constans, lacte muliebri nutritur, sed paucò. Nā multo lacte operata liquefcit, & lac ipsum prius quam sarcocolla siccetur, accessit: paucum

igitur ex mammis ipsis irrigandum confectum sole siccetur, iterum & tertio, quarto, quinto, similiter irroretur & siccetur, & tandem reponatur. Aspergi etiam a finæ, capræ, equæ, lactæ, vel alio potest. Semen cari calfactum lacte caprino horas duas quidem nutrit in vase mundo, exemptum siccatumq; reponunt ad fluorem alui.

Myrobalani oleis, sero saccharato, butyro vaccino, succo cydoniorum, vel alio humore dum irrigat, macerat, fricat, frigit Mesues clementer, & his humoribus imbuat vel ad condituram, vel ad noxas earum castigandas, siue solæ vtendæ, siue incompocita veniant, vt trypheram sarracenicam & persiccam, trypheram Galeni, elec. stomachicum Mesuæ, & elec. alhari & sequens quodammodo nutrit. Sic & species omnes elec. Indi maioris, dum oleo amygdalino confricat idem.

Colocynthis quoq; feminibus solis extractis, si impletur aqua cum pauca spica & mastiche, & coquitur in cinere calido ad partis tertiæ consumptionem: hocque decocto paulatim affuso sagapenum irrigetur, donec pinguescat, nutriti dicitur sagapenum, eodem modo & opopanax. Decocto myrobalanorum, vel succo enulæ campanæ, aut rutæ, aut fœniculi cum felle paucum auium ra-

quatur. Vbi autem initio paulatim nutrita est, & consistentiam crassiore infriando assumpta, tum largiorem vtriusque copiam ebibit. Continenter autem friatur ad horas duas, tres, nisi quod per initia potes aliquantisper cessare, ut interim velut in otio largius comibat. Sic & chalcitis, & scoria ferri, & ærugo, & metallica cætera ex oxelæo in vnguenti formam diu friando duxi, sed bibacissima est lithargyros: opinor, quia siccissima & rara modicè.

DE EXPRESSIONE.

EXPRESSIONO est humidæ, & tenuis substantiæ separatio, à sicca & crassa duro aliquo & valido compressu facta, sit autem sæpe torculari & eo multiplici, quale vinum ex vinaceis exprimunt, & quale pinxit Mesues in oleo amygdalarum dulcium, quale item usurpamus in exprimendis oleis, & succis aliis, & decoctis, & carnibus, & similibus: siue id torcular est, siue prælum librarium, ut in oleo amygdal. dulcium. Mesuæ diximus. Ferè autem exprimenda, ne diffuant aut dissiliant inuoluimus panno forti, ut cannabino, caprino, setaceo. Est quando tantum caprino aut lineo inuoluimus, & manibus ac digitis prælorum loco utimur, ut dum medicamenta purgantia infusa exprimimus. Adde quod nunc
den

denſo, nunc raro panno exprimimus, interdum clementer, interdum valēter proſcopis medicorum variis: quædam item frigida exprimimus, alia etiam calida: quædam ſolum calida exprimi poſſunt, vt oleū amygdalarum dulcium, & ſimilia in Meſuæ. Sic portulacæ, cotyledonis, ſemperuiui, bugloſi ſi ſuccum exprimimus calentem, aliàs humore aliquo liquidiore affuſo, vt dicemus in ſuccorum extrahctione.

Exprefſione uſus igitur latiſſimè patet in infuſis apozematibus, & coſticiſibus propè omnibus, in ſyrupis, in oleis, & id genus aliis: quo autem in inſtrumento & quatenus calidum, aut frigidum vnumquodque eſt exprimendum, in ſingulis compoſitorum remedium differentis melius conſideſces.

Neque ſolum collationi ſuccedit exprefſio, imò eam ſæpe præcedit, & quando eam ſequitur blanda admodum eſt faciendæ: ne quod craſſum & terreum colo adhæret, id totum vi in ſubiectum humorem colatum elidamus.

DE CONFRICATIONE.

CONFRICATIO rerum infuſarum, aut etiam coſtarum manibus facta, collationem & exprefſionem adiuuat, ob id ante has ſæpe obitu interdum exprefſionis vi

vi

vice est: sic crocus panno lineo ligatus inter
codum, infricatur in syr. Saporis, de pomis
& quibusdam aliis compositis.

Manna succo intybi macerata fricatur
manibus antè colationem in syrupo acido
ex mánna.

Rha barbarum panno lineo ligatū frica
tur, & exprimitur in syr. cichorii cōposito.

Scammonium panno tenui ligatum saepe
confricatur in syrupo acetato cholagogo.

Helleborus niger nodulo lineo ligatus
in oxymelite melanogogo saepe confri
catur.

Medulla cnic, turbith, zingiberis, panno
lineo ligata cōfricātur saepe in oxymelite
phlegmagogo.

Helleborum nigrum, agaricum, salē In
dum fricat Mesues in apozemate epithymi:
cassiam verò manibus fricat ante colaturam
in apozemate adianti: colocynthis forpici
bus incisa in oleo rosato fricatur ad compo
nendos ex ipsa trociscos Mes. in trocisch.
& simpl.

Si manibus fricantur, & post colantur sim
plicia in electario Hamech. Simplicia in suc
cis macerata fricantur & colantur simplicia
in elec. diaphysalidon. Simplicia in pilula
rum aromaticarum post coctionem frican
tur, & colantur.

Ferè autem hienodulus in medicamen-
to humido manet. Sic scammonium panis
lineo raro ligatum suspenditur in syrupo fæ-
marie, & noduli aromata continentes, &
compositum condientes in ipso suspensi ma-
nent, vt post leges, titulo de aromatizatio-
ne. Quam consuetudinem hodie plerisque
seruari vident in syrupis purgantibus, præter
tamen contra morbum longum, aut in homi-
nis delicati gratiam compositis.

Ant. lib. 7. Aliquando tamen vbiuis eius noduli to-
o. ph. p. ta in compositum confricando est expres-
sa, abicitur. Sic Soranus cum melle & capi-
tibus papaueris myrrham, crocum, hypoci-
stidem, acaciâ nodulo ligata incoquebat,
post vbi vires suas diacodio impresserant,
tollebat. Quod exemplum ed ascripsit, ne
id nouum putes, & Arabibus acceptum re-
feras.

In simp. Alia tamen est confricatio, quæ ad infun-
Macfues. dendum, imbuendum, molliendû, & huius-
modi magis pertinet, vt cum myroba-
lani omnes butyro vaccho fricantur, & re-
tæ species oleo amygdalarem dulcium in-
uoluitur in tryphera sartacenicâ, & phlegmo-
nis, easdem ne partes nutritorias valēt astric-
tione sua exasperent, oleo amygdalatum
dulcium vel rosato, vel violato, vel fesa-
mino, vel aliis lenientibus tritas mergit, con-
fric

fricat, & lubricas facit. Possis tamen non modò manibus fricare, sed etiã in sole aut igni clementiore frigere cum alioqui nec ipse rare fient, nec butyrum aut oleum quoduis liquabitur, vt ipsas promptè totas permeet, ac imbuat, ob id in tryphera minore phænonis myrobalani assentur in butyro vacino, legimus & nos in tryphera sequente: hæc butyro vaccino inuolutæ frigantur vertimus, vbi legebatur fricentur, & aibi aliquoties. Vbi (vt dixi) etiam fricentur legere possis, cum vtrunque patiantur, hoc est manu fricentur, & sartagine, aut vase alio blandè frigantur.

Et in Elec. à nobis inuento, frige bis vertimus pro frica, tamen potes si libet lectionem priorem retinere: vel istam, presertim cum in simili Elec. alcãzi. myrobalanos, & simplicia alia bis seruefaciat.

Friguntur tamen vere quædam, vt cuminum aceto maceratum frigitur Gale. lib. 4. sanit. tuendæ, in vase terreo bene cocto. Plura huius exempla leges in affatione.

DE SYCCORVM EXTRA-

ctione.

QUANTO VAM loco hoc coctionem infusioni (vt ante memini) viribus & præparationis modo proximam, docere exigit ordo rei: quia tamen rerum ante

tractatarum consequitione quadam in expressione transiimus, succorum autem extractio tritura constat & expressione, iure optimo succos exprimendi modum hic interferimus: χαλασ. autem (vt in simplicibus ex Galeno abundè docuimus) nunc is est humor, qui virentibus herbis, aut fructibus humidis, aut seminibus oleaginis tritis exprimitur, & viscago ceu muccago quædam ex glutinosis seminibus, radicibus, gumis, partium nervosarum ramentis, humore aliquo calfacto maceratis extracta. De his omnibus hoc loco agam.

Succus ex omnibus foliis virentibus per se tritis exprimi potest, præterquam quòd quædam ob siccitatem vix succum aliquem reddunt si per se teiuntur, vt folia lauri, saluæ, thymi, roris marini, sabinæ, & quæ plantarum sunt sylvestrium, & ex locis editioribus ac siccioribus, & æstate calida sicca, atque adeò post meridiem succum parciorem reddunt: aliæ ob lentorem, vt buglossum vtrunque, cotyledon, & aliæ quædam post dicendæ: sed vtrunque genus misto eget humore liquido, ad succi expressiorem.

Ad varios verò iurium & partium aliarum affectus adhibet Gal. in simplicibus, & li. c. ph. p. succos recentes hippuris, cucurbitæ, cannabin.

nabis viridis, hederę, polygoni maris, prasii, stœbes, absinthii, sceniculi, dracontii, lactu-
cæ agręstis, fumaricę, centaurii parui, cheli-
donii, libanotidum, anagallidum, anemo-
narum, peucedani, betę, brassicę, calamithes,
foliorum ficus, cynoglossi. Floribus populi
albę, floribus spondylii, floribus rosarum,
violarum: radicibus cępę, alii, porri, cycla-
mini, scillę.

Ex fructibus etiã vt pomis cydoniis, gra-
natis, vuis, & aliis permultis: de quibus abun-
dè nobis dictum ex Galeno in Mesuę est,
sectione prima & secunda.

Quo autem modo aloë, scammonium, *perroquet*
glautium, hypocisthis, acacia & externi alii *nobis dici-*
plantarum succi extrahantur, cum plantas *tur a pfit-*
ipsas non habeamus, didicisse parui est mo- *taci viri-*
menti, cum præsertim ex Dioscoride repe- *dis simili-*
tere possis: quanquam aloë nobis iam fre- *tudine.*
quens satis est, sed pensilis ferè ad pompam,
altilis nulla, propterea non quævis aloë tuc
cum laudabilem reddit, vt Dioscorides &
Gale. edocuerunt.

Acacia verò nostras fit ex prunis agrestibus
aqua maceratis, igni lento coctis ad dis-
solutionem: colatum ex his siccatur igni
vel sole, complanatur: in tessellas secatur,
rubentes & astringentes magis, si imma-
tura erant; nigras & dulces magis, si ma-

tura.

Lycium nostras sic fit in libello, cultitu-
lus est de dyhamibus, id est facultatibus, &
Galerio tribuitur. Periclymenik (quod capri-
folium vocant) baccas mense septembri te-
re, torquendo exprime, in solatu sicca repo-
ne, Alteri autem verū hodie desyderatur.

Radices glycyrrhizæ recentes prahumi-
dæ Iulio mense trita ex aqua coctæ, ad cras-
sitiem colantur & exprimuntur expressum
igni vel sole siccatur.

Oleum omphacinum ex oliuis immatu-
ris: dulce, ex maturis exprimere in Gallia
Narbonensi vulgare est.

Sic omphacium, ex vis immaturis & na-
tura acerbis: vinum, ex maturis & dulciori-
bus exprimere cuius notum est. Pomo-
rum agrestium tritorum succo expresso pa-
rum falso vtuntur septentrionales ompha-
cii vice.

Ex siccioribus verò foliis seu natura seu
cæli & soliratione, vt succum aliquem ex-
trahas, vinum aqua vel humor alius propo-
sito, idoneus (vt dixi) miscetur inter tun-
dendum: qui propè totus cum succi portione
aliqua exprimendo reddetur.

Eodem modo ex portulaca, cotyledo-
ne, semper viun, buglossio vtroque, & simi-
liter glutinosum succum sortitis, Galenus
doc

docet succum illum affuso humore idoneo extrahendum. Ex his tamen sine externo humore succum extrahis, si parum caleſcunt, ipſæ, mortarium, piſtillus, ſaccus, prælum, vel ſi tuſæ citra calorem calathio ſaligno impositæ, loco frigido, vt in cella vmaria repositæ ſint. Nam in catinum subiectum humor ſatis multus paulatim defluet. Portulaca tamen erratica & quæ vitibus eſt familiaris quam hortenſis, & bugloſum tenerum quam vetuſtate iam pinguius, & folia borraginis quam caulis ſuccum facilius remittant.

Cucurbitam maza pinſita inuolutam cli- *Gal. li. pro*
bano coquit Meſues, deinde ſuccum expri- *puero epi-*
mit in ſyrupum cucurbitæ. *leptico iſi.*

Ex ſcilla ſuccus extrahitur optimè die- *hic ſuccus*
bus canicularibus. 40. quibus ea particula *diachyllo*
tim digitis diſcerpta vaſi utellario imponi- *magno mi*
tur, operculato, & pelle circumdato, deinde *ſectur.*
loco meridiei ſpectante contra boream le-
cto inſolatur ſæpe vertendo, vt vndique ſo-
lem ſentiat: poſt hos ſcillæ elixæ ſimilis ſuc-
cum infundo imponit melle condiendum.
Alii ſcilã inter multas collectam cultello li-
gneo corticibus externis purgatã, maza in-
uolutã, clibano mediocriter calido coctã,
exẽptã, vt calet tuſam in mortario lapideo
calido, piſtillo ferreo calido, pãno ligneo

tenui calido inuolutā, valenter exprimunt.
Sic autem assa Dioscorides vsque crusta fru-
mentacei vel lutei coctionem, tamen suc-
ci eius non meminit. Alii sine assatione for-
ris & intus purgati multum calido ligneo
aut lapideo mortario & pistillo tufani mox
calido linteo, torculari calido exprimunt,
& succum multum facili reddi, & porum
atque clarum. Quod si frigida scilla fri-
gido mortario & pistillo trita sit, in ser-
tagine terrea parum frigatur, illicoque ex-
primatur inter asseres calidos vel torcu-
lari calido ac aëre calido. Quæ omnia Ga-
lenus innuit; cum succum hunc diebus cani-
cularibus nempe omnium calidissimis, si
suam seruant naturam, optimè extrahit.

Quædam minutim concisam exprimunt.
quod tusa pinguescat, succumque aggre-
remittat, nisi vt dixi, calefiat: alii tulum
calathæ sparteæ imponunt aut saligno, in
cellâque vinaria aut similiter frigido loco
collocant, distillatque in vas subditum. LL-
quores, & gummi, & resina castrata, te-
rebrata, secta, scarificata, plantæ radice, tron-
co, ramis, calice destillantes, raro à nobis
colliguntur, sed ferè ab externis mittun-
tur, à quibus qua ratione eliciantur, do-
cet in horum singulis Dioscorides, succum ra-
men ex incisa salice dum floret, distillatam

colligere possumus ad vsus à Galeno scri-
ptos, & opium ex capitibus papaueris ni-
gri mense Iunio aut Iulio & ex aliis nostra-
ribus plantis. Elaterium autem ex fructu
cucumeris agrestis quomodo extrahendum,
lege Dioscor. & in his vide ne succum pro
liquore supponas, cum sit multò ignavius
scammonium succus quam liquor, & in aliis
ad portionem, vt Dioscor. & Gale. abun-
dè docent. Sic ex mandragore radice in-
cisa, forata, cauata liquor emanat valen-
tior succo, & iisdem radicibus tritis expres-
so, & ex ficu, lathyride, chelydonio, foliis
aut furculis auulsis, lac emanat, ex illis & ti-
thymalis album, ex hoc luteum.

De secundo succi genere qui ex olea-
genis seminibus tritis exprimitur, vt amy-
gdalis ambabus, auellanis, iuglandibus, pi-
staciis, strobilis, balano myrepica, nuce
myristica, semine cucurbitæ, cucumeris, me-
lonis, citreoli, cannabis, napi, sinapi, ri-
cini, cocci gnidii, lini papaueris, hyoscya-
mi, pomorum, pyrorum & id genus aliis
abundè cum Mesuæ diximus sectione no-
na de oleis, quod hunc succum etiam Dio-
scorides & Galenus oleum sæpe vocant,
potestque hic ex omnibus seminibus me-
dullatis extrahi, vt etiam ex vuarum semi-
nibus tritis exprimitur igni in lucernis du-

rantissimum.

Mel quoque ab anacardis extrahes, si eos ablato pediculo coquas ex aqua, tunc enim quod supernabit melleum cocleari colligendum est, & aliter.

S V C C I genus tertium ex glutinosi; seminibus & radicibus & aliis in humorē calfactum aliquando infusus extrahitur. Semina ferè sunt cydoniorum, marrubii, vrticæ, hni; fœnigræci, psyllii, maluar, althææ, citri.

R A D I C E S sunt maluar, althææ, symphyti, periclymeni, scillæ, gummi arabicum, tragacantha minutim incidum, sic ichthyocollassa, taurocolla, ficus, vuæ, horum vncias tres aquæ calidæ libra vna macerabis nocte vna, post trididē recalcactum sacculō aut mātili ex tela noua forti impone, intorquendo exprime, virga lignea aut ferrea gracili percutet succum eadem derade, id fac donec succus effluere desinat, & semē exuccum & siccum euaserit, vel radix.

Alii aquæ libras tres, vni seminum aut radicum libræ imponunt, alii libram vnam aquæ communis vel humoris alterius si requiritur, dant, vncias quatuor seminum vel aliorum. Si autem succum vis liquidiorē, aquam auge, vel semē minue: si crassiorē, contra.

Interdum etiam triduo macerantur, vt in dia

diachylo communi quod à $\chi\upsilon\lambda\omicron$ hoc est succus seu mucago, est appellatum: vt in sectione. 12. Mesuæ diximus, & lib. 3. meth. medicamenta componendi.

Quoniam verò Arabibus psyllii interior medulla calet, cortex friget, vbi refrigerandi consilium est, per succum psyllii, neque diu, nec multo calore macerant, neque valenter exprimunt: ne substantiam calidam foras extrahant, quam nonnulli in vlcere, admoto psyllii succo, cum aqua dulci extracto manifestè affirmant se deprehendisse, & morsum in vlcere caloremque excitatum, quem succo alio ex psyllio clementissimè expresso, postea compestuerunt, sed sola refrigeratrix facultas toti semini à Græcis tribuitur. Sic semen psyllii cum aqua fontis frigida tribulat Mesues, & extracti succum dat potui ad aluum soluendam. Decocto semine psyllii inacerat horis viginti quatuor in singulas rudicula agitando, deinde totum succum exprimit in oleo de psyllio, vbi non videtur timere venenosam virtutem occultā in parte seminis eius interna & calida quarto ordine: fortè ob id quod ipso decocto obtunditur & emendatur.

Ex taurocolla, & ichthyocolla, & coriorum ramentis, & partibus omnibus nervosis particulatim sectis mucago quoque
ext

extrahitur, sed in usu medicis frequentiore est, quæ ex ichthyocolla, id est piscium præfertim quos mortuas vocamus, fit. Satius autem est hæc rasa aut limata ex aqua lento igni coquere, donec tabescant. Qui autem valido igni primò coquere aggrediuntur, vrunt, & incoctilem reddunt.

Solvitur quoque ichthyocolla hæc lotio, aqua salsa, aqua extinctionis calcis, aceto.

In emplastro diachylo magno, ichthyocolla aqua communi igni lento, aut super cineres calidos diu macerata & paulatim cocta, tota abit in cremorem.

Pellis arietina ad dissolutionem dum coquitur in emplastrum, contra rupturam, mucago quoque ex ea extrahitur.

Ex gummis quoque mucago frequenter extrahitur potissimum arabico & tragacantha, ut horum drachmis duabus in aquæ rosatæ vnciis. 5. 6. 7. solutis, ut in eclegmate sano, ut sit albius & leniens magis. Mucagine ex gummi tragacanthi drachmis duabus aquæ rosarum vnciis. 7. vel. 8. solutis liquatur sacchari libræ quatuor ad hypoglottidum (quas pilulas albas sub lingua vocant) compositionem.

Ex drachma autem una tragacanthi potest vncias tres quatuor plures mucaginis extrahere: si multum & diu baculo aut cochleæ.

ripercutias.

Ad muccaginem hanc reducenda est congelatio lentorum iusculorū à frigore facta.

Pedes enī vitulorum, colla veruecum, capi, perdices, & carnes aliæ præsertim neruosam multam substantiam sortitæ coquuntur ex aqua igni primū lento. deinde mediocri usque ad carniū dissolutionem, seu donec iusculi portio exigua cochleari exēpta & refrigeratā inter manus confricata, ipsa suo lentore velut ferreminet. Tunc omnia in mantile mundum, mediocriter rarum coniiciuntur, catinō lato supposito, inquam humor defluat, ossa cochleari vnco, furcella eximuntur, reliquum mantili mediocriter intorto exprimitur. Nam valens expressio turbidam faceret gelatinam, vt pedes veruecini nigram nisi exactissimē lauentur & purgentur. Mox adeps flatu deturbatur, & cochleari deraditur, iniectis postea albuminibus clarificatur. Additur sacchari libra vna, cinamomi boni crassius triti vncia vna, in cremoris libras quinque aut sex, & crocus si flauum vis aut linteolum succo florum cichorii aut alio quouis imbutum, vnde opinor id linteolum torrefol vocant, vti & florem cichorii solsequium, & gyra solis & sponsa solis vulgō dicitur, quia cum sole vt alii flores multi circū-

cum

circumagitur. Mox calidum adhuc per maneam vt vocant, Hippocratis colant prope ignem, ne ante tempus, frigore cōcreſcat: neque per eolum tranſſuat. Vbi ſponte ſua fluxit, quantum erat fluxile ac liquidum in patinas diſtribuitur: loco frigido, vt concreſcat, reponitur.

Sunt qui ichthyocollæ portiones cum predictis incoquunt, vt citius lenteſcat, & magis glutinoſus cremor euadat.

DE DESTILLATIONE.

DESTILLATIO humoris è ſucco tenuiori extracti vt caloris, ad hūc locum omnino pertinet. Quæ verò ad eius rationem, vires instrumenta, ignem pertinent, ſuſiſſime libro.3. methodi componendorum medicamentorum docuimus. Hōc autē loco lēctorem tantum exerceat ſtatu in quibusdam deſtillatis paulò diſſicilioribus.

Eodem loco & ſeſſione nona Meſuar, de oleorum genere quarto egimus, etiam de deſtillatione per aſcēſum, ſic dicta, quod vapores ſurſum elati, ibi concreſci, in aquam diſtillant: cuius nunc vſus eſt longè frequentiſſimus. Segmentis pini latiſolia vas imple cum aqua roſarum aſuſa, ſi vaſe duplici deſtillas, ſuccus emanans oleoſus eſt odoratiſſimus, qui caphura aqua vulgo dicitur.

Si

Si rosæ quas incarnatas vocamus siccatae, vapore aquæ calentis humectatae destillantur, aquam rosarum bonam reddent.

Destillata vapore aquæ calentis vires & qualitates plantarum integrius retinent, sed quia excrementosa sunt parum diu seruari possunt. Diutius quæ cinerum aut arenæ aut scoræ pulueratae calore destillantur in vasis lapideis, aut vitreis, quantumlibet multis super longam aut rotundam fornacem regulis intactam, quæ sustineant arenas albas plumbo alto circumdatas: sed vase hæc paulatim calfacienda & refrigeranda sunt, priusquam aëri frigido aperiantur: alioquin mox rumpuntur, quæ autem plumbo destillantur, omnino improbanda censeo, propter cerusam & qualitates alias plumbi maleficas, cum & aquam per tubos plumbeos deductam damnatit Galenus, quod dysenteriam excitat.

Destillatio per descensum nobis dicta in tertio genere oleorum Mesuæ, & quæ per hanc destillantur. Scillæ etiā recētes incisæ vasi inferne foraminulento sursūque lutato impositæ, si flamma circumdatur, aqua in ollam aliā subiectam, simul cū huius fundo lutatam defluet, quæ cum farina vel pane mista, gustata mures citò necare quibusdā traditur, cuius si lithargyri paucum miscueris.

Ros

Rosæ recentes linteolo super peluim. tenso impositæ, si vas carbonibus ignitis plenum acceperint: destillant aqua multa. & odora in eam peluim. Eodem modo flores reliqui. Quæ etiam per descensum est destillatio.

Si duæ matulæ sibi applicentur, & superior rosis impleatur, & insoleatur, distillat aqua odoratissima in subiectam.

DE COCTIONE.

Cum in omni destillatione coctio quædam fiat, per quam etiam aqua distillata succo est tenuior, & in omni coctione fieri destillatio possit, ut ollæ operculum aqua excoquendorum vapore plenum indicat. Cum præterea ambo calore fiant ordine optimo, nunc dicendum nobis de coctione est, cuius partem maximam lib. 3. de ratione componendi medicamenta scripsimus, ac idem tibi repetendum est, ne bis de re eadem frustra sit agendum.

Coctio medicamentorum ferè fit elixando in humore calido, rarius assando in calore sicco. Coquuntur autem simul, aut per se simplicia frequentissimè, interdum & composita quædam.

Humor cui incoquantur magna ex parte aqua est, ac ea vel simplex, vel medicamentosa; Simplex item vel pluuia vel fontana, vel

vel distillata : medicamentosa verò est falsa, marina, aluminosa, sulfurosa, bituminosa, chalcantodes, carbonosa.

Ad aquam compositam reducuntur, lixiuum, lotium, vinum, acetum, omphacium; ceruissia, hydromeli, œnomeli; odomeli, oxomeli, oxycraton, lac, serum, succi plantarum liquidi, oleum, resinae recentes, adipēs, butyrum, mel, saccharum humore paucio lutum, & varia in vnoquoque horum generum species, pro variis medicorum scopis, vt etiam interdum humores duos plures miscere sit opus. Secundum cicerum decoctum, lac vaccinum vel ouinum ad coquendas radices eryngi satiuū, raphani, dracontii, in Mesuæ. Quantitas verò huius humoris varia est, pro scopis variis, vt in diasatyrio lac vaccinum vel ouinum sit quantum duobus digitis supernatet, quod si coquendis radicibus id non sufficit, nouum affundendum sed calidum, vt in his coquendis omnibus sapè admonet Galenus, in alimentis, quod & coqui obseruant. In syrupis, & aliis coctionem requirentibus. Quantus humor requiratur, lib. tertio audies.

Calor autem coctionis autor esse potest quiuis rebus coquendis moderatus (nam à solo calore mediocri fit coctio) non ignis solius, sed solis, animalis: calcis verò & fumi &

lib. 4. fm. putredinis finis, aut corticum calor admo-
uendis vsui esse potest, vt pſorico Galeni:
sumendis verò noxius fuerit, vt ex carboni-
bus non igitis nec semiuſtis, ex lignis pu-
tribus. Calor enim huiusmodi vti & fumo-
sus qualitatem alienam cum empyreumate
rebus coctis imprimit.

Electarium rosatum flamma lenta coquit
Mesues, & syr. omnes igni lento.

Sint igitur ignis alimenta sicca & odo-
ra, vt samentum vitis, quo theriacem co-
quit Galenus: vel carbones semiuſti, & qui
etiam qualitatem iam exhalauerunt, sit au-
tem primum blandus & paulatim si res po-
ſtulat, intendatur, coctioni enim vehemens
& repentinus nocet, quod vrat, facultatem
dissipet, empyreuma multum in re vſta non
cocta relinquat.

lib. 4. fm. Nec solum ignis calore, vt dixi, sit coctio
medicamentorum, sed solis, vt scilla, & ex
ea acetum scillites dies. 40. Mesur inſolan-
tur, saepe mouendo & hydromeli, & syru-
pus, alter calaminthes totidem dies, vel etiã
duos, tres, plures menses flores populi &
abieſtis semen oleo macerant Galenus, co-
quit, quodammodo multò magis si foli ex-
ponantur: quanquam quouis anni tempo-
re fiat, vt pſoricum ex chalciti dupla & li-
thargyro-ollanoua inclusum ſimo, æstate
med

media diebus canicularibus quadraginta
sepelit, sic dum theriaca & similes antidoti
opiatae menses, vel etiam annos aliquot ser-
uantur ad sui coctionem, quam fermenta-
tionem vocant.

Coquimus medicamenta, vel vt eorum *Gal. in the*
vires imbecillas augeamus, incoctis simul *riaca &*
his, quae sunt valentiora, vel validiores mi- *antidotes.*
nuamus, vel alienas in totum abigamus, vel
vt ex omnibus facultate diuersis & saepe cō-
trariis simul coquendis facultas vna concre-
scat & coalescat. Adhuc ob destinatam me-
dicamenti formam, aut sumentis palatum,
ob simplicium naturam, ob custodiam diutur-
nitatem etiam quaedam coctione longa sicca-
mus: vt ob aeris humidioris conditionem.

Præterea vt purgetur, multa coquimus.
Ignis enim vt calida cætera homogenea co-
git, & heterogenea separat, vt simplicium
vires in humorem cui incoquuntur trans-
eant, quo fine sunt syrups, apozemata, oleo-
rum quartum genus.

Horum exempla aliquot fuerint hæc.

Brassicam, lentem, ostrea bis coquimus
aqua scilicet priore abiecta, & noua calen-
te affusa cū aluum per hæc sistere volumus,
semel verò cum mouere. Sic allium, cepa,
porrū, ampeloprasum, & quicquid à veteri
natura ad contrariā traducitur, bis coquen-

dum: sic tamen, vt nec aërem, nec aquam si-
gidā attingat. Nam planē tabescere & per-
coqui amplius non poterit etiam si diutissi-
mē coxeris. Quod præceptum etiam medi-
camētis commune est, quibus liquor nouus
lib. 1. al. consumpto priore est affundendus. Althæa
lib. 6. sim. a dipibus incocta subigitur ad abscessus, co-
ctu difficiles, aqua mulsā viribus varia Gal.
& Me. pro coctionis quantitate.

Oxymeli quoque valde coctum status
dissipat.

Ex Gal. Ramenta loti arboris in aqua aut vino
simp. lib. coquuntur ad capillorum defluuium, Ga-
c. ph. p. le. in simplicibus.

Melli alumen idem incoquit, radicem ti-
thy mali, vel phlomi, vino vel aceto ad den-
tium dolorem.

Omphacium, succum mororum, vel bati-
norum, vel granatorum, vel rhu, vel cydo-
niorum, vel pyrorum agrestium, nucum vi-
ridium, cū ille coquit in stomachica iene-
dia, radicem & semina quæ ex vino.

Dracop. radicem bis, ter ex aqua co-
quit, vt scrimontiam deponat, & sit apta
eclegmatibus.

Alphodeli radicem, vt amaritudinē per-
dat, quam scilla difficillimē amittit.

Bulbi radix cruda, vel semel elixa bona
eclegmatibus, bis elixa amaritudinē totam
dep.

deponit, & fit eclegmati inepti, cēpa, allium, porrum, ampeloprasum, cocta bis aut ter acrimoniam deponunt, adhuc tamen thoracica sunt.

Ari radix in aqua aut sub cineribus cocta mitescit, lib. 2. alimentorum.

Buglossum in melicrato coctum arteria- cum est.

Brassica succus cum melle coctus eclegma est.

Dactyli etiam in mulso aut passo cocti.

Serosa & eadē acris substantia lactis coctione, vel immisis lapidibus aut circulis ferreis ignitis consumitur ad dysenteriam.

Hippuris ad eandem coquitur in aqua, si febris adest: in vino austero, si abest.

Faba oxycrato incoquitur.

Instrumenta coctionis sint vasa omnis generis, aurea, argentea, ærea, stannea, stannata, ferrea, terrea: sed hæc bene cocta ne qualitatem malam medicamento largiantur: & ea vel silicea, vt vocamus, seu cum Mesuæ lapidea, vel plumbata, præstantissima sunt vitrea.

Sunt ea autem vel simplicia vel composita & duplicia (balneum mariæ vulgò dicta) qualia ad oleam etiā calida & alia permulta Galenus commendat. Quæ tamen hodie ob avaritiam, negligentiam, malignitatem

non^v surpatur. Fiant igitur vasa sibi incum-
bentia, sed interuallo vbique digiti vnus
disita, quod aquam contingat saepe suffi-
ciendam, nisi maior vas minus quod medi-
camentum coquendum continet, in maius
aqua feruenti plenum, & igni contiguum im-
mittere, Galeni more. In vase lapideo, id est
siliceo, vt vocamus, coquitur miua simplex,
& citra condita Mesura. Eidem vase dupli-
ci coquitur oleum rosatum, violatum, nym-
phaeatum, melinum, papaueris, myrtum, & ex
pomis mandragoræ, & anetinum, chamæme-
linum, sicyonium, irinum, rutæcum, nardi-
num, mastichinum. Sicque reliqua coquen-
da putem, quod oleum simplici vase coctum
assequitur odorem tetrum & ingratum, vt
interim vires frigidæ frangi, calidas inten-
di taceam, diacodium in duplici vase coquit
Heras ignisumi experti.

Crustum ex maza vel luto circumdatum
scillæ vel scammonio & aliis eius generis
vasis locum obtinet, vti crustum idem & ma-
lum acerbum aliquod vel cydonium ipsi
scammonio est tanquam vas duplex.

Finis coctionis est cum scopum nobis pro-
positum attigimus, vel simplicem, vel etiam
multiplicem, vt si medicamentum coqui-
mus ad vires eius augendas, vel minuendas,
vel ambigendas, dum quantum satis est au-

xliu

ximus, minuiamus, abegimus, satis coximus eodē modo in scopis aliis. Sic quædā coque mus ad dimidias, tertias, quartas, librarum duarum, trium consumptionem, dum omnia sunt probè vnita ad iustam crassitudinem, aut mellis sordium; cerati liquidi, emplastrī consistentiam. Sapas coquendo siccamus, donec crassam assecutæ cōsistentiam, vt seruari possint: sic & syrupos, eclegmata, electaria, vnguenta, cerata, emplastra. De quibus singulis accuratius in modo singula hæc genera componendi libro tertio dicetur.

Diamorum cum melle coquimus donec gratum erit, & absumpta humiditate excrementosa feruoris & putredinis effectrice seruari annum vnum possit: id, quod mel citrà idoneam coctionem succo mororū præstare non potest, licet fructus integros cum pediculo certis interuallis ne se tangant, in se nersos loco frigido integros in annum seruet.

Testiculi ad Elec. diascalyrion.

Gal.

Capita papaueris ad diacodium, capita ranarum ad oleum ranarum, vulpes ad vulpinum, viperæ ad pastillos theriacos, & oleum viperinum coquantur, donec ipsa coquēdo in aqua intabuerint: stomatica & stomachica coques ad mellis, aut sordium cras-

Mesuer.

situdinem.

*Lib. 6. fa-
nu. iude.* Electaria mollia ad similem consisten-
tiam, solida verò coctum magis saccharum
requirunt.

Syrupos cū saccharo aut melle, aut vtro-
que coquimus, donec lentore tenaci & cras-
so inter extremos digitos explorato huius o-
rem excrementosum propè consumptum
coniectabis.

*Nicolau.
in syr. ro-
sato.* Cocti sint syrapi quando incipiunt solum
facere, siue cochleari, effundentur paulatim,
siue inter digitos eius portio tractetur. Vel
quādo marmori, aut vngui imposita eorum
gutta non diffunditur, nec aquæ modo dis-
solvitur sed concreta manet.

Quæ plena sunt meliora, coctione deter-
riora evadunt: ut cassisia nigra, thamar Indi,
thamar mannain, thamar Indos, medullam
cassisæ in succis quibusdam depuratis, dis-
solutam coquit cum aliis fenicocctis ad mel-
lis spissitudinem in diamannæ, & in tryphe-
ra Persica, & in cōpositione alkekengi. In
confectione hamec eadem tria in infusione
colata dissolvit, fricat manibus, colat, cum
saccharo coquit ad mellis spissitudinem. In
confectione mannæ Galeno tributa, man-
nam succo rosarum sufficienti coquit igni
blando ad sufficientem coctionem, teroma-
tum in aqua rosarum, & compositione se-
que

quenti, coquit eandem cum saccharo ad mel
lis consistentiam.

Emplastra coquimus dum manus attactu
non inquinant adhæsu tenaci.

Coctum mel cum aqua, vino, aliis, in ari-
tidotos & alia composita; tunc est quando
marmor propemodum nihil adhæret.

Coctionis & tritura ratio propè est ea-
dem in medicamentis, vt scilicet quantam
hæc trituram viribus integris fuerunt, tan-
tum quoque & coctionem. Quæ enim ma-
gna, crassa, lenta, sicca, dura, densa, neruo-
sa, membranosa, virtutem firmam, & va-
lentes ac penitus mistam sortita longiorem
sustinent coctionem, ob id prima vasi co-
quenda immittuntur: qualia sunt metalli-
ca, terrea, styptica, quatenus styptica sunt)
rosæ enim, absinthium, rha barbarum, aloë,
myrobalani, agaricus, amaram quoq; qua-
litatem in superficie habent, & eam purga-
toriam, ac facilem resolubilem, ob id minus
coquenda quam styptica substantia postu-
lat (radices ob id propè omnes, quia terreæ
magis, incisæ, aut confractæ, vt aristolochia,
cucumer agrestis, hermodactylus, polypo-
dium, & cetera, etiam post coctionem teren-
dæ, vt promptius cribrentur in diasatyrio,
Mes.

Sic rha barbarum quando astringere con-

filium est, ac myrobalanos omnes diu coqui oportet: si verò purgare, tergere, aperire, parum coquenda, aut potius infundenda.

Mesues. Glycyrrhiza tamen parum diu coquenda, opinior ne cum admodum sit dulcis, coctione longa dulciorem ceterorum modo, amara euadat: præsertim cum iam vetustate amaricat, cum verò recens est humidatam excrementosam nacta, cum aliis radicibus initio coquitur, vt in syr. Hyssopi, ziziphorum glycyrrhizæ, & thoracis aliis.

Acria quoque diu coqui possunt si eorum acrimoniam obtundi volumus, nisi virtutem imbecilem, & facile resoluibile sunt sortita.

Mesues. Colocynthis, centaurium paruum cum floribus & semine, plenam coctionem tolerat.

Quæ contra sunt minata, tenuia, fluxilia & friabilia, humida, mollia, rara, virtutem imbecillam, superficialiorem, malè permiscenda, sortita parum diu coquenda sunt, ob id postrema sunt percoctis propè aliis iniicienda, qualia sunt rosæ & violæ recentes. Siccæ enim & harum succus magis coqui possunt. Gmigidium elixatione diuturnam non sustinet Gal. libro. 2. alimentorum.

Bulbi exigua admodum elixatione sunt contenti: Daucus autem ad esum diutius elixandus quam pastinaca.

Nul

Nullus florum coctionem recipit, ob id *Paulus li.*
olea cum floribus facienda insolantur. Si au *7.c.20.*
tem flores valida sint odoris gratia, ut rosa,
chamæmelum, quæ pluribus diebus constet,
insolatu tenuius, & utilius oleum euadit. Qui
verò flores sunt inualidiores, & facilius dif-
flantur, minus diu insolantur, quia eorum vir-
tus promptè vanescit, ut lilium, violæ.

Parum diu integris viribus coqui pos-
sunt epithymum, flores stœchados arabicæ, *Mesues.*
diutius folia.

Quæ verò has qualitates adhuc insignio-
res habent, coctionem nullam sustinent: sed
sublatis ab igne aliis miscentur, vel adhuc
calentibus quando firmiora sunt: vel iam re-
frigeratis plurimum quando ne vis eius te-
nuis & lubrica calore solata in aërem exha-
let metuitur.

Quæ purgant lubricando coctione non
admodum iuventur, *Mesue*: tamen cassia,
manna, thamar Indi interdum ab eo coquun-
tur, sed parum, nec adeò, ut vis eorum lubri-
ca perdatur.

Quæ in horum sunt mediocris coctionem *Mesue*
tolerant mediocrem, ut absinthium, asa-
rum, agaricum, coccum gnidium, fumaria, sen-
na, scilla, iris, hyssopus, thymus, turbitus, semi-
na omnia præterquam cucumeris, cucurbitæ,
melonis, citreoli.

Rha

Mefues. Rha barbarum exquisitum multam facis coctionem & trituram sustinet, raro autem & laxo etiam mediocri coctio est vehemens, & eius virtutem resoluit.

Ibidem. Thamar Indi coctionem ferunt medicam, multa enim vires eis omnes admittit. Ob id ipsi & cassia liquore idoneo soluta, colata melli aut saccharo ad humoris consumptionem cocto adduntur, & ad iustam consistentiam percoquitur, igni ablatis & parum refrigeratis pulueres miscentur.

Coquenda igitur in plantis radices prima, ut dixi, concisa vel confracta, quibus coqui coeptis semina sunt inicienda, ex ceptis seminibus cucumeris, cucurbita, melonum, citreoli, substantiam tenuiorem vreticam sortitis. Tunc etiam cortices & ligna modice confracta. Post haec herbae siccae parum concisa, aut si crassiores sunt, confracta, deinde virentes, incisa minutim, aut manibus torquendo confracta, excepto omnino adianto, & lactuca agresti, quam endiuiano vocant.

Deinde fructus exossati, & semine purgati, ex corticibus & (si magni sint) incisi, ut pruna, ficus, myza, zizypha, vuae passae.

Postremo flores, epithymum, stoechas: sed chamamelum licet tenuis sit essentia, quia tamen fortiter nistam habet facultatem,

longule coqui potest, vt schœnuanthos si haberi potest heliochrysum, stœchas citrea vulgo dictum.

Succi quoq; siccati, liquores, gummi, resinae, manna, calsia, liquore aliquo soluta, sub finem iniiciuntur. Liquores enim vino vel aceto soluti, colati, cocti, ad humores additi consumptionem aliis extra ignem miscentur tudicula semper moti.

Moschus, ambra, caphura, lapides preciosi, pulueres aromatici, & cordiales ab igne depositis, ahis etiam tepentibus iniiciuntur.

Rosæ autem, rha barbarum, aloë, agaricus, myrobalani, si purgatorium vis medicamentum parum diu, vt dixi coquenda. Nam vim eorum purgatricem superficiali parum firmiter mistam ab his corporibus raris coctio multa facile dissipat. Si verò astrictorium vis medicamentum, diu coquenda, vt dissipata vi purgatrice, terrea & astringens tandem foras eliciatur.

Violæ etiam parum coquendæ, quando purgare lubricando consilium est: si atrahendo multum, vt facultas ea in ipsarum ceu centro posita foras trahatur, coctionis vehementia. *Mesues.*

Scammonium si in pomo est præcoctum, absoluta coctione iniicitur: si crudum est, crassius tritum, miscetur in media coctione:

non autem tenuius, ne etiam vis eius purgatrix exhalet, id quod & accidit coctione vel vnica, sed longa, vel duplici, vel si medicamentum diu ante usum seruandum est, vel si accuratius ante coctionem teratur.

Scammonium autem si calorem sentit in grumos coagulatur: quare sit vt interdū, in vna dosi alicuius medicamenti, plurimum sit scammonium, in alia minimum: sicque inaequale est medicamentum, ob id ad finem iniicitur.

Quod autem tritura similem esse viribus coctionem dixi, recte accipiendum.

Calor enim ab igne vehementior, & tenuior, quam ex attritu pistilli, mortarii, durorum terendorum: ob id etiam medicamentorum vires citius dissipat coctio, quam tritura.

Quapropter aromata teruntur quidem, quanquam minus quam alia, sed tamen quantum teri est necesse, non coquuntur autem, sed reliquis iam percoctis, & ab igne depositis, vt dixi, miscentur antidotis, vel molli- bus, quales veteribus in usu fuerunt, vel sic- cis & solidis nobis usu frequentissimis, vt cinnaomum, agallochum. Sic aurum & argentum horum & foliatum, quanquam diu coqui sustinet, vires tamen nullas coctum tradit maiores quam crudum, sic margaritae, cyanius preparatus, ambra, moschus non

co.

coquenda.

Coctio facta ad dimidias, tertias, quartas, vel aliam consumptionem, postea residendo, & albuminibus saepe purgatur & colatur, deinde percoquitur, quod in syrupis frequenter obseruabis. Multis etiam coctio duplex debetur, vt vtriq; antidoto, alcanzi, catholico. diasatyrio vtrique.

Ad coctionem multis saepe aliis medicamenta paramus. Quaedam ante intus & foris purgamus, terimus, lauamus, assamus, vrimus, infundimus.

Quaedam aliis iuncta illorum coctionem accelerant, sic vrtica, radices carnibus incoctae eas coqui celerius iuuant: vt contra nymphæ radix incocta pisitis, ea ad vnum olla velur ei aculatur.

Ichtyocolla cum calce viua cito cocta mox dissoluitur, sed vide an affectus calcis viuæ vires requirat.

DE DESPVMATIONE.

DESPVMATIO est spumæ detractio, cuius materia hoc loco est non solum succus quidam lentus includens flatum, vt Galeno in Aphorismis docetur, sed sordes omnis leuior à calore ignis exputata, vel etiam grauior albuminibus coacta & colligata. Despumamus autem nunc simplicia, vt succos, saccharum, mel:

nu

nunc composita, vt apozemata, syrupos.

Mel cum aqua, aut vino, aut aceto, aut humore alio pro variis medicis scopis despumatur. Nam per se coctū mox immodicē effert uesent, & de repente exūdāt, & flammis conceptis incendii periculum affert. Adhæc cum sit dulcissimum, euaderet amarum, si per se coqueretur donec despumatum esset.

*Mel aqua
dupla de-
spumatur
si aliud bu-
mor nō ex-
prihitur.* Mel humore æquali hodie, quibusdam despumatur, aliis duplo. Spuma autē interea dum igni lento coquitur, cochleari per uisū deraditur. Adhæc cum ad dimidias est coctum, & multum feruet, adduntur albumina singulis libris singula. Deinde calidum colatur, post percoquitur per se, aut cum condiendis & incoquendis medicamentis, spuma quoq; tunc sicca emicat curiosè detracta, si per se seruandum est. Vel in rem præsentem paratur ad pulueres compræhendendos, qualia sunt antidota omnia melle excepta opiata & sine opio. Si purius est mel, sufficit aqua æqualis, nec tantum altius minus requiritur: quod si purissimum est, nec despumandum, nec clarificandum.

Sed huius regionis mel cum sit crudum & impurum, multam reddit spumam, ita vt despumando & colando ad dimidias minuitur. Quapropter pondus duplum ei quod composito exigat initio tibi immittendum.

fi

si cum aliis despumandum incoquis : sin minus despumato vtendum. Finis despumationis quibusdam est tempus horarum circiter duarum cum igni léto. Aliis rectius cum spumare desinit, aliis donec aqua erit consumpta (quæ res bullis cognoscitur) & mel idoneum lentorem acquisiuerit.

Non autem probo cum seruitore mellis libram vnâ coqui in aquæ libris decem, cōtinenter despumando, & aqua hac propè consumpta libras alias quinque addi, & his propè consumptis alias quinque. Hoc enim modo mel aut vri, aut totum vanescere est necesse etiam si aqua adsit largior.

Sæpe autem mel per se despumatur & purgatur, cum tam longam non sustinet coctionem aliorum natura, cum quibus mel coquendo despumaretur. Interdum cum his despumatur cum scilicet multam coctionem viribus integris sustinere possunt, vt in diacydone mel coquitur cum succo cydoniorum, & coquendo frequenter despumatur, & aliis passim. Frequentius tamen per se (vt dixi) despumatum miscetur conditis, syrupis, antidotis : rarius crudum, præsertim nostras. Quod autem album Gallia Narbonensis thymo passim luxurians mittit, est præstantissimum : nec Attico aut Hyblæo inferius, cum regionis temperatura & thyme larga

luxuries utrobique consentiant.

De saccharo idem quod de melle dicendum, cum sit ipsum mellis species etiā Dioscoridi & Galeno.

Impurum enim & nigrū, aut nigricans in triplo humore despumatur, cū ad dimidias est coctum, & valde feruet, adduntur albumina singulis libris singula, colatur calidū, post percoquitur studiosè: interim etiā despumando, si spuma aliqua appareat.

Si aut purius est satis est dupla aut æqualis (ut ferè sit) aqua, & pauciora albumina si purissimū, nec despumādū, nec clarificandum.

Succi fluxiles recipiendi in syrupos, apoze mata, electaria, quædam igni despumantur, residendo clarescūt, & in colo laneo terreū extremētum relinquūt, interim verò etiam additis albuminibus, & melle aut saccharo purgantur, quoties in syrupos, vel apoze mata coquuntur, ut in syr. bizantino, & aliis, & in elec. psyllii. Qui verò succi in emplastra recipiuntur, vel sole, vel igni post mitionē siccantur, non despumantur.

Liquores verò solum colū purgātur post dissolutionem, nō etiam despumantur, tantum abest, ut clarificentur. Idem de metallis & animalium partibus constituet.

Quod si simplicia omnia sunt pura aut purgata, satis est horum decocta per colum la-
neu

neum aut tela laneū: sed modicè densum semel aut bis transmittere sine vlla expressione, colo, si opus est, mutato, deinde ipsum immitte in saccharum, si impurū erat clarificatum. Si autem purum est, clarificatione non egetur, & percoque donec humoris: seu decoctū est, seu succus, seu aliud, vnciae tantū circiter duae: aut si succi sunt glutinosi, etiam tres & quatuor in sacchari libra supersint. Si succi acidi, percocto iā saccharo propè totu inuoluuntur, vt dicemus initio syruporum.

DE CLARIFICATIONE.

CLARIFICATIONIS obiter in despumatione memini. De ipsa autē nunc pauca mihi sunt dicēda quod haec rerū liquidarū decoctis debeat expurgandis, vti & despumatio & colatio, vt sorde crassiori purgata, sint gratiora palato, & in corpus facilius distribuātur & salubri⁹. Clarificatur aut quaedam per se, dū quod foeculentū est subsidet: vt succus rosarum, limonum, cydoniorum, citrorum, ribes, oxyacanthae, granatorum, siue mox reponantur loco frigido, siue in officina aliquandiu seruantur. Quaedam interueniente coctione à sole, vel igni, vt succus pomorum dulcium & acidorum ad dimidias coctus dies duos quiescere permittitur, donec clarescat: vt syrupus de pomis Mesuae fiat, sic succus acidius citri ad

partis tertiæ consumptionem coctus & colatus quiescere permittitur, donec clarescat, & succus granatorum ad partis tertiæ consumptionem coctus, biduum quiescere sinitur, usque; dum clarescat in syrupo ex succis fructuum acidorum. Tamen acidi succi hodie in syrupos aliter, ut dixi, & in syrups dicturus sum, recipiuntur. In his autem coctio ratione optima adhibetur, ut calor homogenea in unum cogat, & separet heterogenea: quoniam urinae in nobis coeptæ coqui turbidae si reddantur, postea tequantur, & clarescunt, subidente crasso.

Cum verò calor ignis sordes in succis exquiritur separare non possit, ut noster calor nativus aliena coctione perfecta segregat, cumque metuiamus ne coctione tam longa succorum facultates corrumpantur. Satius putauerunt medici coeptam ab igni sordium secretionem arte alia iuvare, & ea multiplici, nunc quiete succi post coctionem, ut nuper dixi, nunc aceto simul incocto: nunc agitatione diu albuminibus, ut interim de spumationem omittam & colationem à nobis adhiberi solitas ad perfectionem succorum, vel decoctorum purificationem.

De ea autem clarificatione, quæ fit per se & post coctionem residente, satis est dictum, de ea quæ fit per acetum & albumina iam nobis dicendum est.

Dee

Decocta & syrupi si acetum recipiant per se, vi aceti nonnihil purgantur : melius autem si etiam albumina accidant. etiam si post colaturam acetum recipiant, quando nihilo minus continenter est despumandum, quod acetum etiam ex purgato iam decocto spumas & spurcitiam quandam iaculetur.

Nicolaus

Oui albumen ex aqua frigida scopulis agit in syr. ro-
ta, donec in spumam abeat, quam particula-
tim syrupo, vel alteri decocto feruenti in-
spergas: & ubi nigruerit, cochleari forami-
nulo deradas, nouam inspergas: id fac do-
nec erit syrupus clarior. Alii ubi ex bullis cla-
rius decoctum vi ignis factum animadu-
erunt in id tepidum (nam calidius albumen
coqueret in frigidior minus promptè &
parcior spuma elicitur) albumina singulis li-
bris singula, sed etiã pluribus pauciora ini-
ciunt, scopulis agitant, ut spumescat, saccharum
in particulas contractum coniiciunt, recoquunt:
ubi spuma subsedit, igni aufertur, calidum, si
crassum est & vix colabile, colatur, si facile
colatur, sed turbidum, tepidum vel frigidum
colatur, per manicam Hippocratis, melius au-
tem per pannum clauis quatuor, angulis qua-
tuor firmatum. Colatur autem ter, quater,
si non satis claruerit: si ne sic quidem albu-
men separatim in aqua agitata, scopulis
inspergitur decocto igni reddito, spuma illa

uista, alia inficitur, idque toties donec bullæ clarum satis produnt. Tunc colatur quoties est necesse.

Cribrationi colatio, ut ante dixi, est per similis: sed illa ferè siccorum est, hæc humidorum. Illa corpora grãdiora foraminibus cribrorum non transmittit, hæc sordem humore crassiore transitu prohibet.

Eius differentię ex eo sumuntur, quòd quædam calidissima colantur, quædam frigida, quædam tepida. Item quòd quædam uno, alia duobus, alia tribus colis egent. Itē quædam colis lineis, alia cannabinis, alia telaneis, alia fetaceis & stamineis, ut vocant, alia nouis, alia detritis, alia raris, alia densis, alia bis, ter colanda donec nobis propositam perspicuitatem sint assequuta, ut in syrupis, ex succis fructuum & herbarum, & ex decoctis leges.

Quę crassa sunt aut læta calidissima sunt colanda, & humore ampliore vel tum diluenda sunt, vel initio coquenda, ut facilius transineant. Colo eadē raro & detrito promptius colantur, non tamē purius, sed frequē colatio coli densitatem simplex, ac raritatis incommodum redimit.

Oenomeli colatur panno raro.

Tenuia ut succus limonum, citri, semifrigida, colo densio, & nouo colari possunt, aut
fi

si tribus colis ea vis purgare, summū sit stamineum, medium panneum: sed vetus infirmum panneū & nouum, vel aliter densum.

Sacchari libra si aquæ tantum viciis octo sit soluta, cocta, clarificata, panno rariore colanda est.

Colis tribus vsi sunt maiores nostri, summo, minimo, & rarissimo, infimo, maximo & densissimo, tertio horum medio magnitudine, raritate, situ, vt tamen ab vtroque digitorum. 4. interuallo distaret.

Magnitudinis autem & texturæ horum ratio erat, vt primum sordes tantum crassas transitu prohiberet, secundum etiam mediocres, tertium etiam tenuissimas, vt scilicet quod ad hoc transmittebatur esset illime, & sordis omnis expers. Si verò solo raro vsi fuissent, colata fuissent impura et non colatis similia, vt si per linteū colas aliquod decoctum, si solo dēso id à crassis sordibus statim obstructum aliis viam negasset ob id vel mutandum, vel sæpe abluendum fuisset. Quod si vnico voluissent vti medio, rationabilius & facilius vsi fuissent. Minimum verò primum, quia in eo humor incipit latius spargi versus panni ambitū, vt vides non in laneis tantum, sed etiā lineis. Gutta enim medio infusa se in vicina spargit.

Ex omnibus autē partibus quas imbuir,

defluit, ita ut in secundū influat latius, quā in primū humor contentus cernitur. Secundū item latius imbuitur quā quibus partibus humorem à primū incipit, & pluribus partibus stillat in infimum quā sit contiguum à defluente ex primū humore.

Male igitur primum statuas maximum, quanquam ex hoc nullum sequetur incommodum aliud, quā quod otiosa est hæc capacitas: Satis enim est si capiendo humori sit satis: quantum intelligi volo dum minimum requiro. Non enim minimum absolute volo, sed aliis duabus angustius: si verò infimum sit minimum, multus humor ab hoc non colatus propè ipsius oras in vas subiectum defluet.

Nunc unico utimur colo magnitudine ✱ textura mediocri, sed eius actionem ante iuvamus clarificatione per albumina omnē spurcitiam cogente, adiuuante id frigido. Quæ enim clariora volumus, frigida colamus: aut si talia non permeant, tepida, quæ si semel colata non sunt pura satis, iterum & tertio colamus, & rectius colum aut lavamus aut mutamus. Id quod etiam facimus dum tardius humor permeat: si autem tardius transfluat ob decocti crassitiam aut lentorem, vel calidius colamus, vel per colum rarius, vel si compositi natura patitur liqui-

di

dius aliquid & tenuius miscemus, vt dum cremori hordei colando, aut pisorum, aut fabarum, aut similibus decoctum ipsum affundimus. In tarda autē hac colatura, caue, rudicula vel digitis fundum coli scalpas, vt colationem celeres. Sic enim turbidum erit colatum: sed vt dixi muta colum aut laua, aut humorem redde liquidiores, vel igni, vel misto humore aliquo.

Colamus quoque etiam citra coctionem quædā, vt lac recens mulctū, vt pilos & sordes alias foris illapsas separemus, quæ vsu rusticis, & pastoribus præstat interdum aparine. Sic hodie vinū cū saccharo & cinnamomo per cola lanea oblōga pyramidis figura (quæ caligas & manicas Hippocratis appellant) colamus ter, quater, donec omnino clarū erit, idq; Hippocraticū quoq; vocamus, tanquam inuentore Hippocrate dignum.

Aliter etiam cum melle, & cæteris colamus ad claritatem, & cœnomeli id, ac melites vocamus claretum.

Modo per simili gelatinam quam vocāt colamus, vt ante à nobis est scriptum.

Quædam his citius clarificandis miscentur, vt si vni quartæ vini albi duos lactis digitos misceas ante colaturā, ipsum mox clarissimum reddunt.

Aliter quoque res turbidæ colantur aut

miste: sic in Aegypto aquam Nili turbidam vasis figulinis crudis colari docet Galenus, vt tantum quod clarissimum est per vasis poros, aut etiam teneram & mollem substantiam perfluat. Parisiis autem Sequanæ aquam, & Romæ Tyberinam, vasis figulinis coctis probè & siliceis præsertim, aliquandiu in cella vinaria deponunt, vt refrigeretur, & simul residendo sordem terream in fundum deponat.

Aquam quoq; turbidam colabis per arenas puras vasi immixtas inferne pertuso, foraminibus exiguis aquæ peruiis inuiis, arenæ.

Vinum quoque aqua mistum per cissimbium, id est, vas hederaceū tenue, citò perfluit: aqua autem in eo retinetur, vt sæpe sumus experti, ex Catonis doctrina.

DE AROMATIZATIONE.

AROMATIZATIO nobis vocatur conditura quædam, compositis ferè ad odoris spiritum animale simul & vitalem, & cor ipsum recreantis gratiam, adhibita mistis rebus aromaticis.

Simplicibus, vt moscho, ambra, caphura.

Zingibere, cinnamomo, macis, croco, calamo aromatico, spica, pipere albo, longo, nigro, caryophyllis, mastiche, xilaloë, cortice citri, santalis, vel compositis, vt Gallia aromatica, Gallia sebellina.

Mef

Mesues aromatizat moscho diasatyriū
aqua rosarum soluto, & aliis misto electa-
rium, sarbotens diasatyrium, secundum aro-
maticum, rosatum stomachicum.

Syrupus ex corticibus citri, cydonia con-
dita. Citra autem cōdita, moscho & ambra
aromatizat.

Caphura autem syrupum acidum de po-
mis, Trocisco Gallæ Sebellinæ, moscho,
ambra, caphura.

Hydromeli quidam aromatizant specie-
bus, vt zingibere, croco, cinnamomo, macis,
& similibus.

Nodulus ex panno lineo raro contineris
croci, cinnamomi, calami aromatici, spicæ,
zingiberis, piperis nigri & longi, ana drach-
mam vnam & dimidiam syrupo starchados
immittitur, & suspensus manet ad condien-
dū, seu aromatizādū, sic miua aromatica no-
dulo aromatu pleno in ipsa suspēio & saepe
confricato, vt ante in cōfricationē diximus.

Syrupus de mentha aromatizatur Gallia
aromatica.

Conditum citri gallia, moscho croco, ma-
stiche.

Conditum buglossi, moscho & gallia.

Syrupus ex omphacio, caryophyllis.

Syrupus intybi compositus fantalis, cina-
momo, xylaloë, cortice citri.

Sic alia multa præter cōsistentiæ & sapo-
ris gratiã, odoris quoque iucunditatem, sed
etiã coloris, de quo mox, requirũt. De qui-
bus abundè à nobis scriptũ est in methodo
medicamenta cōponendi, dum hæc rationẽ
in cōpositis habere docebamus, interdũ si-
ne qua medicamẽti actio non fiebat, & per
quam melius fiebat. Iulepos ex syrupis &
aquis destillatis hodie misceri solitos, apo-
zemata, cinnainomo, & fantalis aromati-
mus, immixsis colo horum drachmis circiter
duabus in humoris libras singulas, aut plu-
ribus, aut paucioribus pro vario medici sco-
po. Et vinum aromatites, & quod Hippo-
craticum vocant, & alia multa aromatibus
condimus.

DE COLORATIONE.

COLORATIO quoq; multis medica-
mẽtis acquiritur ad gratiã magis & iu-
cunditatẽ, & terrorem auferẽdum, & causas
alias, quod etiã lib. 2. methodi medicamẽta
cōponendi docuimus. Sinopidem aliqui, alij
ochram cerato Galeni dia euphorbiu mi-
scuerunt, vt hoc colore fucatum ceratũ, vn-
de cōponitur, lateret misceri potest floris sa-
lis aliquid, aut simile quod colorẽ eius mu-
tet, neque vim eius minuat.

Quæ Galeni verba diligẽter sunt obser-
uanda, ne scilicet coloris mutãdi ratio vires
nou

*Gal. lib. 6
methodi.
Idẽ ibidẽ.*

nouas medicamēto acquirat, aut priores augeat, vel diminuat, siue colorē mutare libet noua re mista, vt in oxycroceo: siue vno aliquo simplici aliter atque aliter preparato, vt ceratū Galeni ex æruginē cruda viride est acterrenis ægros ex eadem vsta est melinū, vt Galenus docet lib. i. c. ph. g.

Sic ex cerusa cruda emplastrum est album, ex ochra pallidum, ex iisdem probè vstis rubrum.

Solus quoq; motus colorem quæsitū sæpe medicamento acquirit, vt ex lithargyro nutritum longò pistilli attritu fit albius.

Penidia quò diutius rudicula, & manibus tractatur eò albiora euadūt, etiā si ex vili & impuro saccharo fiant, sic pilulæ albæ, diariis simplex. diatragacanthū frigidū, sic saccharum rosatum, & saccharata reliqua.

Mel crudum & coctum in antidotis diu cōmiscēdo albius euadit, & cætera mellita.

Iulep coctum ad tuccorum in tyrupis cōprehensionem, baculo diu versandum, vt albescat, & alia multa simili agitato albescūt, fortè quod aër multus in cōmiscendo receptus alborem conciliat.

Sic album rasis vnguentum & citrinum, & emplastra diachylon, & ceratum Galeni refrigerās album, de cerusa, gratia dei multum diuque subigendo, trahendo albescūt,
&

& oxycroceum pallefcit.

Oefypus quamuis niger eft, multa agitatione album facit emplaftrū, vt glutinofa alia.

DE EXCEPTIONE.

EXCIPIUNTUR & comprehenduntur colliganturque, feu vt vulgo loquuntur incorporantur medicamēta humore aliquo ad faporis gratiam diuturnitatem, vium conſeruationem, fermentationem, medicamenti conſtituendi formam, vſum dexteriorem.

Elegma ad aſthma melle excipitur, vt fit ſuauius & vſui aptius.

Elegma amygdalatum excipitur melle, & ſucco fœniculi.

Electaria propè omnia, præſertim mollia melle excipiuntur ob dictas cauſas, ſicca ſaccharo humore aliquo ſoluto, pulueres ſucco cucumeris agreſtis comprehenduntur in hiera Hermetis.

Pilularum materia excipitur vino, ſucco abſynthii, ſolani, foliorū citri, braſſicæ, apii, intybi, pilulæ aureæ muccagine tragacanthi, coctiæ raiſis, & Meſuæ ſucco abſynthii.

Pilularum hermetis ſpecies ladano excipiuntur cum piſtillo calido.

Trocifchi galliæ moſchatae cōprehendunt

duntur muccagine, tragacanthi in aqua rosarum soluti, vel ambra oleo balanino soluta.

Mel quo solutiua excipiuntur vino quā aqua potius coquendum & despumandum, nisi aliquid prohibeat.

Exempla alia ipsius, vt sic dicā, incorporationis in electariis Mesues antidotisquē aliis & ceratis, & emplastris tam sunt multa, vt nemo desyderare possit: nec plura describere libuit, ne oratione proluxa displicerē.

DE F O R M A T I O N E.

OR D I N E rerum gerendarum succedit medicamentorum cōprehensionī ipsa eorum formatio cuique composito sua cū scilicet vnumquodque formam habet idoneam, quā in quibusdam à consistentia differre non videtur, vt in conditis, sapis, syrups, elegmatis, apozematis, antidotis mellitis, pilulis, trocischis, vnguentis, ceratis, emplastris. Forma ipsius compositi est consistentia liquidior, crassior, mediocris. Sed in multis praesertim ficcis, praeter hanc consistentiae formam alia quaedam nostris manibus, aut alia re apprimitur, vt saccharum in vasa dum recens coctum est coniectū, Illorum forinā pyramidis, scilicet ac metae cuiusdam retinet, & quę ex saccharo imagines formantur, aut cera, aut alio dum calet liquido, ob id terminū alienū facilē induente dū
ref

refrigeratum coiuit duro, ob id formā tunc assumptā pertinacius retinente: sic electaria solida & tessellas. nūc rhōboïdes, nūc quadratas, nūc quadrāculas: sed altera parte longiores, quales manus Christi vulgò dicuntur, nūc triangulas: sic pilulas fingimus orobas. i. magnitudine & figura orobi, vel cicoris, scilicet orobei, nō arietini quod inæquale cūm sit & acuminatum, figurā habet pilulis ineptam, sic & κόκκισ, id est granula, seu pilulas paruas (vnde vt dicemus libro. 3. pilulæ coccinæ rasi, & vulgò dictæ videntur) granorum, scilicet paruorum magnitudine & forma fingit Paulus.

Nicol. Alex. in gal Trocisci quoq; cōplanātur, & in medio
lia moscha cauātur, & ferè postea sigillo aliquo pressi
ta. notātur. Quade remox quoq; dicturi sumus, vnde & à forma hac, vt pilulæ à paruæ pilæ effigie nomē sibi adoptauerūt, & præter id alię quoq; nā cyclisci. i. parui circuli, & artici. i. pastilli, seu parui panes etiā Græcis appellantur. Sunt enim velut circuli, hoc est, superficies planæ vna circūferentia à centro æquidistante conclusæ, non autē sphærica sunt corpora, vt pilulæ.

Cerata & emplastra formamus in offas, quæ apud Galenū μαγδαλας vocātur (vnde vulgò corruptū puto vocabulū magdaleones) hoc est, cylindraceæ quædam figuræ.

Quæ

Quædam trahēdo manibus ex vnco ferro producuntur, intorquentur, & in quālibet figuram mutantur, vt penidia, & quæ alpheni vocant.

Qualiter quibusdam quoque trahuntur emplastra, diachylon, gratia dei, sed post in magdalias componuntur..

DE SIGILLATIONE.

SIGILLATIO quoque (vt vocant) seu sigilli alicuius impressio, inter præparationis differētias numerāda est. Quæ quāuis haud ita magnarū virium esse videatur, vt cūm ex pilulari forma per sigillū ligneū singis trociscos, tamen & per se veteribus magni momenti fuit, & per accidens sigillatio. Per se quidē, cum terram Lēniam sigillo Dianæ imaginem habenti notabant, à qua facultatem aliquam his trocischis imprimi putabant, vti & Nichepsos rex anulis insertum iaspidem viridem draconis radios habentis imagine scalpi volebat, quod tamen ceu vanū reiiciēdum censet Galenus. Quāquam & illa Dianæ imago in sphragide lemnia, hoc est in sigillo, seu sigillata terra Lemni insulæ, etiam per accidens proderat, quòd pastilli hac notati planè veri significabātur, non quo hodie modo omnes adulterinæ nostrates terræ sigillatæ. Idem ad me Constantinopoli sunt delati, caracte-

ribus variis à Turca obſignati.

In paſtillis quoq; Theriacis, & medica-
mētis omnibus, quæ ab exteris corrogantur,
vtinam vel characteres aliqui, ſed certi fide,
vel publica, vel principum apprimerentur,
quòd pannis laneis, & ſericis gentes multæ
etiã hodie faciunt. Non enim toties grãdi
pecunia adulterata & ſpuria pro veris recipe-
remus, aut ſaltẽ qui vendunt primis inſtitori-
bus, & hi deinde aliis, chirographo, aut ſa-
cramento aliquo cuique verendo vera ſe vẽ-
dere affirmarent, ſed noſtra opinor ſocor-
dia illos efficit audenter furaces. Cum enim
vera ignoremus, neque illa nouiſſe multum
hactenus ſit à noſtris pharmacopolis labo-
ratum, facilẽ illis imponitur, Incumbite igi-
tur, incumbite modis omnibus, vt vera de-
inceps habeantur. Homini elephãtico dedi,
non multis ante menſibus trociſchorũ the-
riacorum libras propè duas, quibus non eſt
mutatus magis quàm ſi terram ſigillatã no-
ſtatem deuoraſſet, tamen qui vendidit af-
firmabat è monte Peſſulano allatos & ve-
ros. Quod tamen falſum illi ex Galeno pro-
bavi, tamen quia egebatur, & veros affirma-
bat, grãdi pecunia emimus, nullo tamen, vt
dixi, ſucceſſu. Quæ ſi aus in cæteris quoque
medicamentis, niſi diligenter cauetur, latẽ
patet, magna animaduerſione coërcenda.

De

DE REPOSITIONE.

REPOSITIO medicamentorum tam simplicium quàm cōpositorum in locum aliquem, tum cōmunem, tum propriū ad cōseruationem (de qua mox dicam) magni est momenti, & item quod quædā per se reponuntur, alia cum aliis ipsorū virtutem conseruantibus, vel etiam augentibus, aut saltem quam minimum fieri potest minui permittentibus. De hac generatim quædā diximus libro tertio methodi medicamēta componendi, sed hic paulò sūsius dicēdum.

Reponimus quæ seruari volumus, cōseruationem verò nihil tam vitiat quam putrefactio. Quā ambiēs calor, aut frigus, aut aēr corruptior, aut excrementosa rei seruandæ humiditas, & calor imbecillus accersere solet, ob id quæ integra diu seruari volumus omnino siccamus, tū absumpta ipsorū superflua humiditate, tum in istis siccantibus: sæpe etiam astringentibus, sic condita, sapas, syrupos, antidota ex humidis persertim temperata, pilulas, trociscos, & vnguenta quædam & cerata & emplastra igni, vel sole siccamus, misto his quæ sumuntur etiam melle, aut saccharo, aut vtroque remedio siccante: aliquibus, & acetum, & sal profunt, alijs metallica, & terrea ob siccitatem putredini diu resistentia.

Ergo quæ reponēda sunt simplicia, & cōposita omnino quantum opus est sint sicca: sic & vinum feruendo in lacu, aut dolio humiditatem corruptionis sui, & feruoris auctorem si validum est, nec ea tam multa cōsumit, calorem externum vitamus fuga solis, & res ipsas in loca minus calida, aut etiam frigida seponendo. Frigus immodicum & gelu ab his tantum prohibemus, quæ humida cogi possunt, vt aquis destillatis.

Calorem internum imbecillū fouemus, prohibita eius exhalatione, ob id quæ seruamus omnia loculis clausis, & vasis obturatis reponimus, nisi valentissima sint, theriaces enim vas sæpe detegi vult Galenus, vt expiret. Ad hæc rha barbarū, vt viribus integris diutius seruetur, vel cera sola, vel cera cū rebinthina, aut melle albo circumlinit. Mel. vel psyllio, aut milio mergit. Agaricū idem cum zingibere, dauco ligustico, polipodio querno seruat vt eius actio vegetior reddatur. Aloë seruat cum aromatibus aut bdellio, & alia similiter in Mesuæ simplicibus.

Cassia verò in fistula sua foelicius seruatur, nec purganda ante vtendi tempus. Fistula autem in sabulo cellis vinariis infossa, ficcari præpropere prohibetur.

Colocynthis integra diutius seruatur quàm emedullata, & melior ac salubrior

euadit cum mastiche, galanga, & aliis stomachicis, hepaticis, cardiacis.

Phialæ succo rosarū, granatorum, limonū, cydoniorū, & similibus seruando destinatae habeant in fundo emissariū, ne inuertendo fuga olei superfusi succus turbetur, & sex continui misceatur, & sic turbidum pro puro succum vsurpes.

Crusta quæ melli & medicamento quibusdā tempore accrescit integra & immota seruanda est, si vis pharmacū diu manere integrū & immutatū. Gal. lib. 2. alimentorū. Quæ prouidētia succis prædictis, vino quoq; & cæteris est communis. Diabesasa stanneo vase reponi vult Heras li. 8. cō. ph. p. Gale.

Medicamentum stomachicum vase corneo reponitur, eodem libro.

Terebinthina vase ex ferro albo aut vitreo aut siliceo seruatur melius quā ligneo aut terreo, nisi sit vitreatum. Vase vitreo vel plumbeo hieram reponit Paulus.

Theriacen vase non ligneo, vt hodie fit, sed pretioso reponit Galenus.

Oleum vase siliceo, lapideo, plumbeo in cella vinaria probè diu seruatur.

Pulueres cardiaci vase vitreo strictioris operculato reponuntur.

Flores & omnia iucundum odorem redentia arculis tilaceis.

Semina etiam chartarum inuolūcris, & suis folliculis vtilius, & innocentius interdū seruantur. Liquida medicamenta seruantur densiore materia, vt argentea, vitrea, cornea. Fictili etiam, modò non rara: interdū & lignea, præsertim buxea. Ocularia medicamenta & alia quæ acetum, picem liquidā, cedriam recipiunt, æneo vase seruanda. Adipem & medullas vasis stanneis, seu ex plumbo albo reconde, hæc Dios. Herbæ igitur siccētur & fasciculis aut manipulis colligatæ.

Quæ cōponendo cocta, aut aliter calfacta sunt, non nisi refrigerata sunt reponēda.

Diacodium refrigeratum reponit Damocrates, apud Gal. lib. 7. c. ph. p. & similiter composita propè omnia Mesues.

Loco non vluinoso & madente reponantur medicamenta, exceptis paucis, sed ædium parte sicciore. Quæ reponuntur si prætereà feruere debent, vas non repleant, vt sit locus & spaciū quo perspirent: sic vina dolis non plenis reponuntur primò, sic conseruæ insolatu coquendæ, vasis non plenis coquūtur, sic theriacen vasis non plenis reponit Galenus, quo tempore adhuc à suo calore coquetur & feruet.

DE CONSERVATIONE.

HÆC de repositione sufficiant, in quibus tamē ob rei affinitatē cōseruatio-

nis quoque obiter coacti meminimus, sub qua & medicamentorum simplicium & compositorum durationis tempus comprehendimus. Vt enim non minor est virtus quam quærere parta tueri, sic non satis est medicamenta probè delecta esse, sed ad conseruationem commodè reposita esse, & quantum diu integra conseruari possunt, sciendum est. Nam si mors etiam saxi numinibusque venit, omnia tam simplicia quam composita aliquando corrumpuntur, hæc citius, illa tardius; idque vel ob peculiarem cuiusque naturam, vel aëris constitutionem, vel repositionis differentiam.

Herbæ quotannis sunt mutandæ, & flores, & quæ ex his destillantur aquæ præsertim quæ vase duplici, aut vapore aquæ feruentis destillantur. Humidiores enim sunt quam quæ ignis flammæ, & carbone etiam per cinerem, scorix ferri puluerem, sabulum destillantur.

Aqua tamen vini quæ frequenti destillatione est purgata, diutius seruatur vase vitreo cera obturato. Seruantur autem herbæ ficcatae sacculis cannabinis rarè textis ne putreant, nèue puluerulentæ euadant.

Radices multæ diutius seruari possunt, vt in delectu diximus libr. I. vbi & de reliquorum quoque duratione quantum sufficit

scripsimus, seruantur siccatae per se aut conditura ex saccharo, aut melle per se suspensae in aëre libero si magnae sint, in sacculis cannabinis si paruae, fructus in melle conditi sic, vt se nō tangant, & loco frigido repositi annum seruantur recentibus simillimi.

Iidē & flores vasi inclusi aqua fluente te-
ti annū seruantur. Vinum musteū dolio pi-
cato impositū, & eodē bene operculato se-
pultum dies 40. aqua fluēte, vel aliter pura,
annum totum dulce permanet Catoni. Iidē
cera inuoluti, farragini impositi, aut fursu-
ri, diu seruantur recentibus similes.

Herbarum quoque folia citra siccationem sibi simillima diu seruantur inter papyri folia: sic tamen vt non prēmantur. praefer-
tim quae succulenta sunt. Nam haec mox mu-
cida & putria euadunt si prēmantur.

Aloë etiam solarario appensa tres, quatuor
annos viua, & germinās seruatur, & aizoon,
& telephium ob succi crassi copiam.

Quin & caepe, allii, scillae, ari, dracon-
tii, cotyledonis, satyrii, & aliorum quo-
rundam radix bulbosa succo crasso lento
plena diu seruatur citra vllam à nobis, aut a-
liunde siccationem manifestam.

Metallica & lapides vbilibet probè ser-
uantur, si sordes & puluerem vitabis.

Composita autem medicamenta nobis

hodie variè seruantur, nam condita humida, elegmata, syrapi, electaria mollia, vase vitreo, vel siliceo, vel terra densiore potius quàm stanneo plumbi vitium retinente seruanda. Electaria autem sicca arculis faginis, aut pyxidibus vitreis, vt pulueres & troisci. Catapotia aut ferè aluta inuoluta, pyxi de stānea includuntur. Olea, vnguēta, cerata liquida vitreis, lapideis, stanneis, emplastra verò in magdalias formata papyro vndique praterquàm extremi medio integuntur.

DE CONDITURA.

DE CONDITURA nunc dicēdū quòd ea saepe coctio quædam est (de qua & præparationibus aliis ipsam coctionem sequentibus abundè diximus) & cōditura conseruationi non parum confert. Conditura ferè est radicum, herbarum, cauliculorū, aut germinum, florum, fructuum, seminum, interdum & corticū. Fit item ferè saccharo, vel melle, vel vtrōque, interdum syrups, iulepis, sale, aqua salsa, aceto, & aliis quæ siccādo, & humiditatem superfluam absumendo, astringendoque à putredine res vindicant. Condiuntur enim prædicta ferè ad conseruationem tutiorem, saepe tantum ad saporis gratiam, saepe ad vtrunque, vt succus mororum in diamoro melle conditur. Possisquē conditura generatim dicta etiam

syrupos, & antidota plurima, & pilulas, & trociscos cōprehēdere, quod hæc humore aliquo iucūdo cōprehenduntur, vt sint iucūdiora, & facilius sumi possint: sic rosæ violę, & flores alii melle, aut saccharo cōdiuntur, & fit mel rosatum, violatum, vt in conditis Mesuæ diximus, & lib. 3. dicemus.

Cōditura fit humore hoc iucūdo per totum corpus condiendū insperso, vt dum flores & fructus cōdimus, & corticē citri, & cucurbitæ, lactucæ, caules, & alia plurima: sic myrobalani recētes cōd:ūtur, aut humeētate prius si erāt sicciore, vt docuit in simplicibus & cōditis Mesues, interdū tanquā crusta quadā saccharo integimus magis ad saporis gratiam quā ad vires, vel augēdas, vel conseruādas, vel minuēdas: sic semē coriandri, papaueris albi, absynthii marini, anisi, fœniculi, apii, & nucleos persicorū, strobilorum, pistaciorum, amygdalarū dulcium, & si libet amararum saccharo integimus, & cortices aranciorum, cinnamomi.

Interdum condimus additis quibusdam medicamentis aromaticis, vt eniblicas myrobalanos aromatibus condiri Mesues scribit, & alia etiam composita: sed condiri tūc aromatizari potius significat, quanquam & ad saporis gratiam, id etiam fiat, vt in sartura mox dicam.

Con

Condienda si magna sunt, ferè in particulis secantur, vt condituram promptius ubique sentiant, sic cydonia, sic persica, & radices magnæ sectæ condiuntur.

Tamè fistula cassiæ tenera cõditur integra, & nux moschata cū cortice viridi, qualis nostrarū nucū integra cõditur, et parua citrea, arātia, melones parui adhuc & teneri.

Quāto autē melle, saccharo, vel alia cõdiente materia sit opus, & quis modus cõdiēdi, hoc est incrustādi, præsertim semina, & nucleos, leges lib. 3. sectione prima.

Flores capparis nondū apertos intersperso sale condimus, nam si soli reponantur, putrescunt. Eodem modo & in eosdem vsus flores genistæ, & his odoratiores sparti flores, quibus tamen post acetum affundimus quantum omnia tegere possit.

DE FARTURA.

FARTURA condituræ quædam differentia est: fit autē ferè dum cavitas quædam manifesta odoramenti, vel aliis scopo proposito idoneis impletur, quomodo & coqui pullos, anseres, porcellos, & alia quædam herbis nostratibus aromaticis, & floribus, & lactuca, & appetitis aliis, interdū additis etiam aromatibus farciunt ventrem totum inferiorem, & sæpè etiam spacia inania inter carnem & cutem vi deducta.

Sic

Sic elignatæ radices eryngii & sectæ loco matricis (cor vocant) caryophyllo, & cinnamomo humectatis farciuntur à Mesuæ.

Anserem exenteratum carnibus felis an-nosi, & herbis nervosis farcimus, vt inde liquatus adeps sit medicamento sior.

Farcitur pileolus ex bombace, aut aliud epithema cephalicum, vel stomachicū aromaticis, & aliis cephalicis, stomachicisque.

Prætereà vt coqui carnes autum torrendas, caryophyllis, & frustulis cinnamomi cōfigūt ad odoris & saporis gratiam: sic nuces virides maceratas, & coquendo teneras red-ditas, & radices satyrii, ex secundo cicerum decocto ad iustam teneritudinē coctas, caryophyllis, & cinnamomi frustillis configimus, & cydonia in particulas cōdiēda. Quæ res ad farturam, vel vna cum fartura ad aromatizationem reduci potest.

DE PUTREFACTIONE.

PUTREFACTIO coctioni simillima est, præsertim de qua nunc agimus, non enim de absoluta putrefactione, sed mutatione aliqua à calore externo, etiam rerum putrescentium, vt fimi corticum facta, vt oleum in folliculis vlmi inuentum, phialæ fortimpositum cum folliculis si operculetur, & dies quindecim fimo equino multum obputredinē vigentē calenti obruatur. Deinde

de insoletur, & quod eius clarum supernabit transuasetur, omnium vlcerum remedium est præstantissimum.

Sic ex vino facimus acetū tenuius, & acremagis ac mordax. Facimus autē vel in folatu, vel immisso aceto valentissimo in vinū, vel foliis, surculis & ramentis sorbi, vel parte acida citri immissa Galenus libro secundo alimentorum. Sunt qui linguas lampe træ nostratis ea causa inmittunt.

Ex maza item fermentum, & ex lacte in primo animalium lacte nutritorum ventriculo corrupto fit coagulum, omnia ob putredinem acria, & caliditatem nouam adempta, amissa autem naturali.

Sic chalcitos partes duas lithargyri, vel cum Dioscoride cadmiæ partē vnā aceto accerrimo soluit Galenus, ac æstate media, seu diebus calidissimis quadraginta in olla noua fimo obruit, vt fiat psoricum. Talis putrefactio in vsu est maximo chymistis.

Sic adeps vetustate putris Galeno expetitur ad emplastrū dichalciteos, & oleum vetus ac ita semiputres, vnde & graueolentiam acquirit: sic vetustate putrefactū caseū decocto pernae salis, coquit Galen. ad tophos.

Quid quod vinum & succi reliqui dum ab humiditate excrementosa feruent, quodammodo putrent, & flores saccharati, aut
mel

melliti dum insolantur, & antidota melle adlito cum feruent.

li. 4. *fani.*
tuenda.

Acopa item ex semine abietis, & floribus populi dum menses plures macerando perficit. Gal. etiam putrefacere videtur.

DE FRIXIONE ET

affatione.

COCTIONI non modo affines sunt frixio & affatio, sed frequenter etiam ut in alimentis coctionis differentie, tamē quæ medicamentis adhibentur coquere raro videntur humiditatem crudam, aut excrementosam: sed magis absumere.

Frixio autē ferè in sartagine fieri intelligitur, quæ à frigendo etiā frixoriū dicitur. Hæc autē in sartagine parata suæ qualitatis vehementiam deponunt. Gal. lib. 2. alim. in dracontio, affatio autem seu torrefactio super tegulam ignitam fit: vel in clibano, vel in carbonibus ignitis, hæc quoniam tenui discrimine distant, & ambo à calore fiunt, simul tractanda duximus.

Semen melanthii frigitur Galeno contra catarrhos, semen agni frixum minus tentat caput eidem lib. 2. alim.

Mesues.
Ibidem.

Semen lini & nasturtii torrefiunt in eleginate Phthysicorum, Mesuæ.

Semen porri & nasturtii in E. nostro.

Cuminum pridie aceto maceratum sic

atur, & frigitur in vase fictili bene cocto.
Gal. in diotpolytico lib. 4. sanit. tuendæ.

Coriãdrum acetum infusum affatur passim, sic enim calorem eius in superficie vehementem extingui voluit, vt tantum refrigeret? Granatorũ acini assentur in E. altero Mesuæ, & semina vuæ, portulacæ, psylli, plantaginis, altheæ, anisi, mairubii, ad fluorem alui assantur. Gale.

Baccæ myrti, gallæ: in quinq; aut sex partes cõfractæ, oleo hora vna infuse assentur ad capillũ fluẽtẽ sistendũ. Sit autẽ oleũ astringẽs aut succus alius, si magis astringẽdũ.

Myrobalani omnes succis astringẽtibus variis maceratæ, linteo ficcatae assantur, sed antequã nigrescãt, & vrantur eximendæ, ne vires amittant. Si insigniter scilicet vrẽtur, vt cinesiant. Nam hæc & rha barbarum, assa coctis, vsta asis magis astringunt Mesuæ.

Balanus myrepica assando deponit partem humiditatis excrementosæ, & partem coquit, ob id assata delectoria tantum est, non amplius vomitoria.

Auellanæ assantur in elegmate pineo.

Gummi Arabicum, tragacãtha, succinũ, & gummi alia ad magnitudinem orobi cõfracta, cũ opus est assantur donec albescãt.

Amylũ aflatur in trocischis terræ sigillatæ, & trocischis spodiatis secundis, Mesuæ.

Mod

Modus autē frigendi & affandi prædicta est huiusmodi. Sartaginem, vel aliud vas ferreum vbi admodum calet, ac si opus est candet ab igni tollitur. In hanc semina, fructus, radices & alia immittuntur, continenter rudicula ferrea versantur, ne vrātur. Sartago, si opus est, his exemptis recalefit, & quantum opus est affantur.

Quæ autem sunt magna, crassa, humida, glutinosa, diutius affanda, contraria minus, vt semen anisi, cymini, nasturtii Semen verò lini & psyllii, quia humiditatem lentam satis multam fortitū est, paulò diutius affari sustinet.

Possunt quædam etiā in clibano, aut super eius testudinē, aut sub cineribus affari, & ea vel nuda, vel olla noua conclusa, & si mediocria sunt integra: si magna, cōfracta, quædam etiam maza intecta clibano affantur.

Scilla per affationem multi fit vsus Dioscoridi, quia per eam vel elixationem eius vehementia obtūditur Galeno. Quæ enim non affata sumitur, interaneis maximè noxia est Mesuæ. Illa autem delecta, purgata farina, pinsita, aut (id sordidum videtur Galeno in Theriace) luto, & argilla circumdatur in digiti crassitiem, sub cinere calido, vel carbonibus, vel clibano affatur. Sunt qui in olla operculata in furnū demissa affant:

sic enim celerius & clementius purgat. Sic helleborus albus, & scammonium in maza pista, vel cydonio præparatur Diosc. & Galeno, vt ipsa & panis, & cydonium moderatius purgēt. In vas calefactum quoque, & ab igni depositum opium mox immittunt, vbi est liquaturn, eximunt priusquam siccet, & friabile fiat.

Acaciam nostratem factitiam super prunas ignitas affat Bulcasis in seruitore. Est quando vt alimenta sic medicamenta ex humore friguntur: nam castaneæ sine humore, fabæ, pisa, carnes, fungi, cū humore, vt oleo, butyro, Sic myrobalani, flauæ, cepulæ nigre friguntur & fricantur in oleo violato, aut amygdalarum dulcium in tryphera Persica & in simplicibus. Omnia probè trita friguntur in omphacio, vel succo myrti, & aceto, & siccantur in stomachico electario quodā Mesuæ. Omnia in vino odoro frigantur, deinde in succo cydoniorum in E. nostro Mes. Addit in sequenti, & feruefiant, vt intelligere possit, hæc frigenda super ignem semper mouendo, & conficando: non solum fricanda, cum his humoribus, vt diximus prius in conficatione.

DE VSTIONE.

VSTIO assationi finitima, vt ratione maioris, & minoris tantum differant,

affata enim largius vruntur, & infra modum
vsta, tantum assantur. Vrunter plantarū par-
tes ac animalium, & in animalia tota, metal-
lica item & terrea. Horum autem medica-
mentorum vrendorū scopi medicis sunt va-
rii. Quædam enim vruntur vt puluerari fa-
cilius possint, vt pili, lana succida, sericum, te-
stæ ostreorum, buccinorum, purpurarum, va-
gues asini, cornua caprarum & ceruorum,
ossa, coria, & alia quæ ob terrosam, & du-
ram, & crassam corporis consistentiam &
concretionem densatam vel ob lentorem
immodicum vel humiditatem aliquam pul-
uerari nequeunt.

Alia vt essentia crassitiam deponant, &
tenuitatem, aliasque facultates igneum co-
lorem sequentes induant. Id quod quam-
uis omnibus vstis accidat, non ob id tamen
omnia vruntur. Sic metallica omnia & ter-
rea vrendo tenuiora euadunt, & quæ acris
erant, mitiora fiunt, quæ non acris erant,
acrimoniam vrendo assumunt Gal. libr. 4.
& 9. simpl. in chalciti.

Ex quo patet vstione etiam facultates
quasdam mitescere, vt ærugo, chalcitis,
misi, fori, chalcantum, melanteria fiunt
moderatiores: quasdam acquiri, vt vim te-
nuandi & ea efficiendi, quæ saporem acrem
sequuntur.

Alia vrūtur, vt vis quædam nostro proposito aliena, ex profundo in superficiē trahatur, postea lotionē separetur: sic lapidem phrygium vstum, lauat Galenus, & lapidem hæmatitem ad oculorum affectus.

Alia vruntur, vt colorem nouum acquirant ægro gratiorem, vel ad dissimulanda simplicia, quibus constat medicamentum, sic ærugo vsta modicè quidem, rufa facit emplastra, immodicè verò, nigra.

Cerusa trita, iudicula ferrea mota vrendo sic rubra, vt ochra, & auri pigmentum. Offa & testæ vrendo primum nigricant, deinde albissima euadunt.

Quædam vruntur, vt in aliam transeant speciem, vt vipera vsta transit in salem theiacum, cerusa vsta vt iubeat in sandyca, thus in fuliginem, sulfur in oleum, cadmia lapis in cadmiam fornacariam, & pompholygem & spodium.

Vrendi modus non est omnibus vnus. Quædam enim humore pingui prædita per se vruntur, vt pili, lana succida, sericum, cornua, vngues, coria, huiusmodi, motacilla, galerita, & aliæ quædam auiculæ, cicada, serpiones, vipere, lepores, & aliæ quædam pedestria. Hæc verò in olla noua operculo foraminulento tecta sunt vrenda carbonibus vel clibano, præsertim quæ propè ciner facta

disperire possunt. Quæ verò post vstionem integra manent, vt ossa, vngues, cornua, testæ ostreorum, lapides ad gypsum vel calcem coquendam & similia: hæc etiam vivis carbonibus obruta vel superposita, aut etiã flammæ luculentæ immissa, vri possunt: nisi quædam sint addenda, quæ vim eorum mutant. Tunc enim etiã in olla noua vruntur. Sic viperas cum substratis quibusdã medicamentis Galenus vrebatur ad salem theriacum: sic fictili nouo inclusa vel patellæ ferreæ, aut sartagini imposita vruntur, cerusa, chalcitis, mifi, fori, calcanthum, auripigmentum, sandaracha, plumbum.

Alia fictili crudo vruntur, donec id percoctum sit, vt cadmiã, æs.

Alia etiam olla ænea aut ferrea, vt plumbum.

Alia in patina vruntur, vt ærugo, chrysollosa, lithargyros.

Alia in olla ex cineribus ossium (crucibolum vocant) in fornace aurifabrorum alia in foco, alia in clibano panis, alia in furno figulorum, alia in fornace chymistarum.

Quædam (vt dixi) tam carbonibus obruta quàm olla vel noua, vel cruda, vel patina excepta per se vruntur nulla addita inflammabili, aut vires mutate materia, vt ossa, cornua, testæ ostreorum.

Alia

Aliam materiam requirunt inflammabilem, vt sulfur alumen aliquod salē, ordeum, vt in plumbo vsto & aliis docuit Dioscor. Vas item quo excepta vruntur si fragile est, vt vitreum, ex terra bellouaca & alia lapidea & silicea luto chymistarum prius totum paulatim oblinimus, & paulatim siccamus, quā igni committamus. Eodem luto vasi operculum saepe agglutinamus, sic inter ipsa hiatus viam faciat carbonibus, aut cineribus illapsuris, aut effluxuræ materiæ.

Lutum autē, id fit ex terra figulina aquā macerata cum stercore equino, & si vis pilis animalium multū diūque subacta, quod & lutum sapientiæ vocant chymistæ. Eius loco interdum est terra figulina sola, vel gypsum aqua solutum, vel farina albuminibus subacta.

Vas quoque chymistæ operculant labris ipsius colli per fusionem coalescentibus, dum materiæ sunt pretiosæ, & quas exhalarē nolunt. Id autem in matulis tantūm vitreis longo collo efficiunt, sigillūque hermetis vocant.

In aliis fictile apertum esse nihil nocet, si alibano vrenda sunt: si verò cineribus aut carbonibus obruenda, operculatur vas, ne aliena materia quod vrendum est, vt dixi, conspurcetur, vel ne materia ipsa exiliat,

vt in sale & lapidibus quibusdam.

Operculum autem nunc solidum est . & integrum, nunc multis locis foratum, vt fuliginosi effluxus exhalent liberius, à quibus est cauendum præsertim si à viperis, scorpionibus, aut similibus venenosis attolluntur, item si à metallicis.

Vratur materiæ carbonibus perustis, præsertim pretiosis, & quæ oculis sunt adhibenda, vt nihil fumidum habeant, vt Galenus vrebatur lapidem phrygium.

Carbones quoque follibus vel flabellis excitari interdū oportet, vt citius vstio absoluator, vt Galenus in vstione lapidis phrygii iubet. lib. 4. c. ph. p.

Quædam ad idoneam magis vstionem puluerentur, alia frangantur tantum in frustula magnitudinis nucis iuglandis, vt lithargyros, vel nucis auellana, vt lateres in oleo philosophorum, & lapis phrygius à Galeno in suo remedio.

Alia etiam in sole æstiuo ex vino vel acetoplutibus diebus teruntur, priusquam vrantur, in. c. ph. g.

*Plantarū
partes.*

Quæ omnia bis exēplis ex Dioscoride, Galeo, Mesuæ, & aliis fient notiora, folia oliuæ syluestris in olla fictili cruda, lutata furno figulino, per coctionem vasis vsta, lota, ex aqua in sole siccata, albuginem oculi
&

& pannos potentius omni pompholyge de-
lent Albucasi.

Sarmenta ligna, cortices & partes alia
plantarum vruntur relicto tamen foramine
in operculo, vt fumus exhalet.

Abrotani, alphodeli, ari, arisari, dracotii
vsti, cinis Galeno passim vsurpatur.

Brassica non transplantata, à terra expur-
gata, minutim concisa, in ollam coniecta, fo-
raminulento operculo tecta clibano vratur
in carbones, qui triti ollæ alteri impositi,
operculati, vruntur donec in album cine-
rem abeant.

Myrobalani & rha barbarum vsta valen-
tius astringunt quàm assata Mesuæ.

Aloë quibusdam in olla noua super pru-
nas vratur in diamoscho amaro, vt absum-
pta glutinosa substantia aluum ducere de-
sinat, & magis roboret, ob quam causam
etiam abluitur.

Fex vini ficcata vratur igni, donec albe-
scat, & linguam multum mordeat & vrat.

Succinum fictili olla clausum, opercula-
tum nocte igni vratur Bulcasi.

Thus vstum scribitur in lide cephalica, *Animalia*
lib. 4. c. ph. g. *et ipsorum*

Vsto thure fuligo quæ ratione colligen- *partes.*
da docet Diosc.

Lepus viuus iugulatus cum sanguine &

pelle vasi fictili nouo traditur, operculatur, in clibano vritur donec puluerari possit ad calculum frangendum.

Sic hirundines, ianae, cicadae, erinaceus, vruntur Gal. lib. ii. simplic.

Aeschrium caneros viuos in patella æris rubri vsit donec in puluerem mollissimum redigi possent contra rabiem.

Gal. li. ii.
simpl.

Testae ostreorum, limacum, ouorum exclusis pullis, sericum, ossa, cornua, ungulae, vel prunis ipsis vel tegulae aut olle imposita in clibano, vel foco vruntur, donec albescant, & puluerabilia sint. Hæc tamē non vrenda, nisi medicus iusserit, quia vires vstione mutant. Possunt enim tenuissimè limari, aut radi, vt cornu rhinocerotis, pudendum tauri, cerui, & puluerari, vel probè limata propinari, sericum similiter cardiacis miscendum sit crudum, minutim, cōcisum, cum aliis pulueratum, vstum autem medicamentis materias consumpturis miscetur, vt diasenne Nicolai, Spongia bitumine, vel eius penuria pice illita vritur lib. ii. simpl.

Gal. lib. i. 6
4. pb. p.

Lana succida largo vasi figulino lati oris imponitur, operculatur, gypso, vel glutine, vel terra figulari subacta cū aqua illinitur, vritur fornace, vel camino. Scorpiones viui olla noua inclusi, & operculati, maza vel luto circumlita vruntur igni ex sarmentis vitu

tium in clibano, vt eius pulueris grana sex cum syrupo radicū quinque pota renū calculum frangant.

Sic vruntur viperæ & colubri, amborūq; *Metallica*
cinis ex oleo illitus scrofulas liquefacit. Li- *et terrea.*
thargyros chrisitis, grauis, pura à plumbo, & omni aliena materia in particulas magnitudinis iuglandis contracta, prunæ superponitur, & ita follibus accenditur, vt conflagret, vbi refrixit, abstergitur insidens spurcitia, & reconditur, alii ter aceto aut vino restinguentes rursus vrunt, & reponunt.

Cadmia vritur carbonibus obruta, donec *Diosc.*
translucida spectetur, & ferreæ scorix modo bullet, mox vino extinguitur aminco, si ad emplastra paratur: aceto autē, si ad psoricum medicamentum. Sūt qui sic vsūm ex vinoq; tritum, iterū crudo fictili torrent, donec pumicosa videatur iterumq; ex vino tritam vrunt tertio, donec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabritiei retinens.

Ibidem.

Plumbi laminæ quā tenuissimæ, aut plumbi limatura & sulfur alternis vasis imponūtur, donec plenum sit, operculatur, sed relicto exili spiraculo succenditur, dum plūbum ardet rude ferrea versabis donec tantum perfectè in puluerem redigatur, dum eximes, obstrue nares quodd eius halitus sit noxius.

Ibidem.

Stibium pincta farina circumlitū, & carbonibus obrutum torretur, donec ipsa crusta carbunculetur, exemptumque extinguitur lacte mulieris, quæ marem peperit, aut veteri vino, vel vritur carbonibus succensis, efflatum quoad ardeat. Si enim paulè magis cremetur, fit plumbum.

Cerusa trita in fictili nouo, flagrantibus carbonibus assiduè versando vritur, donec cinereum colorem traxerit. vel patinis nobis super prunas trita vritur, & ferulacea rinde mouetur, donec coloris sit sandarachæ: sandixque tunc appellatur, refrigerata reponitur, sic trita chrysocola vritur. Sunt qui vrendo acetum affundunt, vt rubeat: si flaua est, macicot vulgè dicitur.

Ibidem.

Aes fit vstum ex clavis artis solutariū nauium fictili crudo cōpositis super sparso sulfure cum sale pari. Quibus vicissim inspersis fictile semiplenum operculatur, & figulari creta circumlinitur, fornaci inditur donec fictile percoquatur. Modos vrendi alios docet Diosc.

Aerugo fracta minutissimè in fictili patina flagrantibus prunis superposita versatur, donec mutata colorē cinerei cōcipiat, refrigerata reponitur. Si cruda olla vratur, eundem prorsus colorem non reddet.

Chalcitis fictili nouo viuis carbonibus
sup

superposito vritur, donec bullas excitare desierit, & perfectè inarduerit, si humidior est: si alia est, dum mutata in floridum colorem sanguineum aut miniatum contraxerit. Eximendo insidens spurcitia tergeatur. Vel vritur per flatis carbonibus, donec luteo colore pallescat. Sic misi, fori, chalcanthum vruntur. Chalcanthum autem vredo suapte natura colorem rubescentem sortitur Diosco. in arugine.

Auripigmentum vritur testa noua viuus carbonibus subiectis assiduè versando, donec igni flagret & mutet colorem. fit enim foris argenteum, intus rubrum: refrigeratum & tritum reconditur. Sic vritur sandaracha, alumen.

Lapidē pbyrgium in particulas magnitudinis auellanae fractū vres in olla receti luto circūlita, testa operculo perforato vel in solo vertice, vel (quod melius est) in pluribus partibus, vt fuliginosi fumosi que eorū quæ vruntur effluxus faciliè per ea efferantur, deinde perustis carbonibus per flatis vres, donec ignitus sit, cætera ex Galeno repete. Sic cyanus lapis vritur, & alii. Gal. li. 4. c. ph. p.

Sal vritur fictili, diligenter opertus ne exiliat, conditusque prunis, donec effervescat vritur. Sic nitrum & spuma nitri, si inueniuntur vrenda sunt. Vitruur tritum Diosc.
int

interflata pice vritur, & aqua frigidissima
extinguitur, Auensoal tamen friabile nō fit,
Alia plura ex Dioscoride, & aliis huc trāscri-
bit potuissent, nisi hæc etiā multa huic æta-
ti omnia hæc negligenti existimassem.

Vstionis terminus in quibusdam est, dum
ignitum id abundè fuerit, vt in vstione tri-
plici lapidis phrygi: in quibusdam dum ni-
hil fumidum amplius expirat, nullaque full-
go prætereà emergit.

In aliis dum bullas edere desinent. In his
quæ fictili crudo vruntur, fictilis illius per-
coctio.

In his quæ farina pinsita circumlinuntur
aut luto, crustæ vstio.

DE EXTINCTIONE.

EXTINGVNTVR vel vsta, vel solūm
ignita quædam non modo, vt empy-
reuma ipsum dissipetur, sed etiam, vt in cor-
pus vstione rarefactum vis quædam humo-
ris aut frigoris penetret, vt ferrum candens
aqua pilosellæ, vel alia astringenti extinctū
euadit solidissimum.

Extinctio fit interdum ad purgationem,
vt plumbum liquatum succo mercurialis ca-
lido: sæpe extinctum, & tribulatum, stanni
puritatem, & soliditatem assequitur.

Fit item extinctio, vt vires humoris quo
extinguitur in se trahat, sic cadmiā vino

aminæo ad emplastra aceto ad remedia pſo-
rica extinguit Dioſcor. ſic Galenus lapidem *lib. 7. ſim.*
phrygium extinguit primum butyro recen-
ti, ſecundo vino ſalerno, vel alio fuluo, odo-
ro: tertio melle Attico, ne medicamentum
ſit aridum, ſed viſcoſi cuiuſdam particeps.
Gallæ ad ſanguinis ſuppreſſionem carbo-
nibus impoſitæ, donec vndique candeant
aceto: aut vino aſtero extinguentæ ſunt.

Stibium lacte mulieris marem enixè ex-
tinguitur.

Limatura chalybis ſæpe ignita aceto ex-
tinguitur, & pulueratur.

His exemplis medicamenta humore ex-
tinctæ ab illo aliquid virtutum in ſe trahunt.
Interdum autem ignita humore extingui-
mus, vt humoris naturam mutamus, vt dum
lapides vel circuli ferrei igniti lacte aliquo-
ties extinguntur, vt ſeroſam & mordacem
eius ſubſtantiam abſumant, ſitque tunc lac
dysentericis ſalubre.

Aqua chalybem vel aurum ignitum ſæpe
extinguimus, vt ipſa minus humectet, ſed ſi
terrea magis abſumpta tenuiori ſubſtantia.

Argentum viuum etiam ſi non ſit ignitum,
tamen & ſaliua hominis ieiuni, & ſucco ſal-
uiæ, aut limonum extingui dicitur, quod viſ
eius malefica, & omnia exedens, vt à Plinio
rectè dicitur, cum his agitando miteſcit.

De

DE SVFFITV.

SVFFITVS seu euaporatio vi caloris excirata saepe medicamentis adhibetur preparandis & vtendis. Suffitus aromatum muliebria ducit, & vterum infernè retrahit si infernè adhibetur, vel sursum si naribus, suffitus plumarum perdicis, corii veteris, vel aliorum tetro odore praedictorum, naribus exceptus vterū sursum ruentem deturbat. Suffitus radices & seminis pœonie, melanthii, styracis, mastichēs rosarum, ad capitis affectus pituitosos. Iisdem vel aliis stuppæ suffitu capiti circumponuntur.

Frontalia ex rosis, violis, flore nyurphææ semine, lactuca, portulacæ, & similibus: vapore aquæ rosarum, verbenæ, betonica, & similium suffiuntur ad varios capitis affectus.

Et epithemata vëtriculi ex bombace aromatis facto, vapore stomachico præterea suffiuntur.

Suffitus per infundibulum ex radice, aut foliis bechii si per regulam ignitam impositis, ad iussu adhibetur.

Suffitus ex sulfure purgato, & auripigmento vsto & loto, probe à practicis quibusdā asthmaticis adhibetur.

Suffitu & vapore aceti acerrimi necantur cantharides Diosc.

De

DE PURGATIONE.

VSTIONI ordine optimo succedit lauatio, quæ empyreuma, & acrimoniã vltione acquiritam, vt & natiuam tollat & vltia expurget, sed cum illa sit purgationis species, latius nubi visum est de purgatione prius agere, quod eius cognitio lucem magnam sit allatura lotioni. Purgatio medicamentorum hic accipienda passiuè, nõ actiue: seu quatenus purgãtur, non quatenus humores sibi familiares ex corpore nostro trahunt.

Purgantur enim medicamenta sordibus, & aliena quauis materia per despumationem, clarificationem, colationem, residentiam, coctionem, lauationem, excisionem, depellationem, & modos alios post sciendos.

Radices erutę radiculis circũcisiss, aliquoties abluuntur potius quàm abraduntur, deinde si magnæ sint & matrice intus lignosa, paruum contractis lignum id eximes, deinde siccabis, & repones, sic radicẽ cichorii, apii, petroselinii, fœniculi purgamus, & eryngii, sesari, cari, dauci, pastinacæ.

Est quando putre etiã aliquid excidentum est à radice iridis, enulæ, bryontæ, sigilli beate Mariæ, rha barbari.

Radicem ari, dracutii, asphodeli, satis est
exc.

excisi radiculis lauasse, cum cortice cōstent tenuissimo, vti & radix chelidonii parui, cotiledonis, satyrii.

Scilla cultello ex cypresso quibusdam desquamatur, in qua mirum est ferrum vitari, cum pistillo ferreo teratur ad succum extrahendum.

Herbæ raro purgandæ nisi aridis foliis, aut stipite lignoso, quanquam & ablui debeant, si terreno aut luto sordidæ sint, vt iussit Dioscorides.

Seminibus sæpe duplex, interdum triplex debetur purgatio. Vt legumina siliquis, cerealia glumis, baccæ halicacaborū vesicis, semina fructuum carne, semen ricini, vrticæ maris, castanea echino, semē papaueris hyoscyami, lathyridis, paliuri calice, & alia ad portionē. Quæ omnia iterū cortice tenui & interiore sæpe purgantur, vt post audies. Nux iuglans, & auellana, & amygdala carne viridi, deinde cortice duro, postremò pellicula & alia plurima similiter. Hic autē de tertia purgatione agendum, quod aliæ à vulgo fiant, & purgata hæc vendere consueverint, & zeam, oryzā per moletrinas gluma purgant, & vendunt.

Cortice ergo seu pelle purgantur semina cucurbitæ, cucumeris, melonis, citruli, citri, vt solę super sint medullæ, idq; mul-

tis modis. Quidam enim hæc insolant deinde cortices in mortario leuiter frangunt, manibus fricāt, donec à medulla cortex separetur. Cribro tunc idoneo medullas transmittente, & cortices retinente cernunt. Alii etiam solis loco, igni leuiter frigunt, sed medullæ sic extractæ graue olent, & sunt ingratae sumentis, & calfactum oleum. Forficulis alii singula semina purgant, quod operosum est, vt vnguibus & dentibus quod impurius est, qui modus hodie est consuetior. Sunt qui hæc sole siccata in magna quantitate friant pistillo ligneo, cribro raro cernūt, iterum terunt & cernunt: si corticum particulæ simul transeunt, vano euolant. Semen sesami purum aqua modicè salsa irrigatur, manibus confricatur, iterum irrigatur, donec mæde fiat: extensum linteolo siccatur, modicè assatur, sacculo aspero immittitur, fricatur multum donec depelletur, cortices vento aut halitu expurgantur, vel in aquam frigidam iniectis cortices supernatantes de raduntur. Sic semina cucumeris, cucurbitæ, melonis, citreoli, ad olea ex his facienda excorticantur Mesue non autem ad vsus alios.

Amygdalæ, pistacia, strobili, nuces & similia aqua frigida per noctem, vel tepida parum diu macerata corticem mox remittūt.

Item si in sartagine assentur igni, donec depellantur, sed hoc modo male olent, & oleagina magis euadunt. Sunt qui recentes hos nucleos palea frumenti obruunt, sicque cadit cortex. alii cultello malunt depellare, præsertim cum oleum amygdalinum recēs exprimendum est in potum colicorum, aut nephriticorum. Alii etiā non depellatas terunt & exprimunt oleum purum & iucundum.

Hordeum, triticum & cerealia alia, & legumina depellari possunt, affusa identidem aqua calida, pistillo ligneo batuuntur, siccantur. parum nisi æstas est ventilantur, per sicantur, reponuntur.

Mesues.

Est tamen quando corticis vsus est maior, vt in pisib; & fabis, & aliis. Est quando solus expetitur, vt in rheæ, radice apii, sceniculi, hellebori, turbith, cinnamoni & aliis corticibus dictis libro primo methodi medicamenta componendi. Ricini semē echino insolato, vel fixo per se aut confricatu facile exilit, depellatur autem quomodo dictum est terendo, sed mitius ne ob multam humiditatem cohereant, sic baccæ lauri. Vel ex non excorticatis, sed per tritis oleum extrahatur.

Colocynthis cortice & semine purgatur solæque pulpa in vsu est medicorum.

Cydonia & fructus alii condiendi intus

&

& foris purgantur.

Cassia corticibus & membranis ligneis exempta seminibus purgatur per cribrum teraceum rudicula, vel cochleari, vel manu: sunt qui id efficiunt foelicius cum vapore ex decocto aliquo medicato subeunte, interdū humore aliquo soluitur, vt in diamāna Me suæ. Sic thamar indos purgamus, sed hi ferè humorem postulant, vt per cribrum trāsmittipossint, vt manna humore calente soluta in cribro folia ilicis cui foelicius insidet, & sordes alias dimittit.

Dactili cultello intus & foris purgantur, vt abūde diximus libro tertio methodi medicamenta componendi.

Succi purgātur feruore, residendo, clarificando, colando, vt in syrupis dicemus, & in clarificatione & colatione diximus.

Gummi Arabicum, tragacanthum & similia trita negligenter si sunt sicca, in vase vitreo aqua pura vel rosata merge nocte vna, misce manu postridie donec liquecat, cribro puro cola, etiam manibus deducendo: vtere, vel siccatum repone.

Galbanum etiā laudatissimū retinet aliquid adiecti seminis, & ferulæ id ante vsum sic purgabis, In aquā feruētem demitte: cum liquatum fuerit, linteo puro, raro cola, aut sordes supernatantes concha detrahe.

Sic liquores alii humore idoneo soluti colando purgantur à seminibus stiptitū fragmentis & cæteris excrementis, quæ per negligentiam aut institutorum malitiam ipsis ac creuerunt.

Adipes, cerebella, sanguis & aliæ animalium partes medicamētosa, qua ratione purgandæ sint, paulò post audies inter ea, quæ pluribus præparationum differentiis simul à nobis parantur.

DE LAVATIONE.

LAVATIO purgationis, vt dixi, species cerè sit ad sordium aliquarum separationem, abusuue tamè etiā inbuere medicamento humore medicamenta aliqua lauare Mesues, & alii vocant. Lotionis vires ex Mesue repete. Lauatur aqua foris radices, herbe, fructus, semina, si luto, puluere, vel re alia sunt contaminata, aqua ex ea toties mutata donec pura maneat, & sordes omnis ab his deterfa erit etiā si sint rosæ, violæ, intybus, & aliud cichorii genus, & adiata, postea autem siccantur pannis, vento, sole, igni, sed mitissimo, ne medicamenti vim dissipet. Hæc autem lotionis differentia omnibus consuetissima, quia paruarum est virium si alteri mox dicendæ conferas, pluribus ob id declaranda non est. Lotio alia intus, & simul foris fit seu per totam rei lauantæ

dæ substantiam.

Lauantur tota seu intus & foris plurima propter causas quatuor à Meisue libr. 1. scriptas, & alias quasdam hîc scribendas, & paucis perstrictas lib. 3. methodi medicamenta componendi.

Vt autem humor omnē lauandi corporis partem quantumuis exiguum attingat, & lauet ac purget aliqua substantia nostro proposito aliena, si id est durū aut lapidosum, ante lotionem est tenuissimè puluerādū: si est cito liquabile, calfaciendum: si per se est liquidum, quale est lauabitur: ac etiam si per se in aqua, aut humore alio pròptè dissiliat ac dissoluatur, vt bolus armenia, calx.

Quæ igitur promptè liquantur, vt oleū, cera, pix, resina, modicè calefiāt, & mox infundantur in vas magnum oris lati, semipletum aqua purissima, experte omnis odoris, coloris, saporis, quem sensus percipere possit, quæ ex sole vel igne tepeat. Tunc manibus multum diūque agitentur, ab agitando deinde quiescat, donec id pingue totum quod lauas supernatet. Id quod talibus pròptum est ob innatam leuitatem, præterquā oleo nimium multa agitatione valentius confuso cum aqua, vt mox dicam. Tandem aqua illa abiecta, similis affundatur idque tertio & quarto; ac toties repetatur donec

repetatur donec medicamentum in aqua illa deposuerit omnem illam vel substantiam, vel qualitatem nostro proposito alienā, seu quoad aqua nullam ex loto medicamento talem substantiam vel qualitatem, ut colorem, odorem, saporem, amplius recipiat, quam visu, olfactu, gustatu deprehendas.

Effunditur autem aqua per foramen aliquod subiectum, quod interim dum lauas luto obturaveris, aut vase inclinato pingue in vas aliud effunditur, & aqua abiicitur. Alii aquā pingui miscēt in vase vtrinque habēte foramen angustum, operculandū digitis inter agitandum, dum verò per horā resederit, aqua effunditur, noua infunditur, idq; fit toties donec acris, & flaua olei humiditate deterfa, oleum dulcius, & album euadat.

Oleum tamen lauando minus est verberandū, ne adeo aq̃ue misceatur, ut post ægre possit separari: sed ita verbera, ut dum quiescere paulisper permiseris, ipsum totum innatans detrahare possis. Lotum id oleum componendis oleis, & medicamentis aliis albis, aut frigidis est optimum & vsurpandum.

Dura autem & lapidosa, ut metallica, lapides, ossa, testæ, succi siccati, lachrymæ siccatæ, ante leuissima sunt terenda, deinde aqua pura subinde mutanda, manibus vel
rud

nudicula agitentur, quoad nihil sordium medicamenti aquæ innaret, maneatque aqua medicamenti qualitatum, vt coloris, odoris, saporis omnino expers. Non ante verò aqua est effundenda, quàm lauandum corpus quiescendo in fundum vasis subsederit, quod metallicis, & terreis corporibus ob insitam grauitatem facile accidit, vt prædictis innatare, ob naturalem ipsorum leuitatem. Effunditur autem aqua per os vasis paulatim inclinati, ne motus vehemens corpus lutum aquæ iterum commisceat, & cum ea effundatur: satius enim est aquæ prioris aliquid remanere quàm lauandum corpus effundi.

In his autem vas in fundo pertusum in liquabilibus prædictis vtile, damnatur, quòd ad id grauia hæc repant, quæ si per foramen id vacuare tentes, aut ipsum obstruent, aut aqua penetrare habilior cū ipsis vacuabitur. Possis & per licia, panneæ, philtæ vocant, destillando aquam paulatim vacuare, præsertim dum corpus lauandum est preciosius. Nam sic nihil, aut minimum eius, cum aqua vacuatur, sed illa vacuatur purior, & corporis lauandi substantiæ expers magis.

Sic lauantur plumbum, cerusa, lithargyros, scoria plumbi, æs, ærugo, chalcitis, & congeneria, cadmia, spodium, pompholyx,

stibium, cyanus, calx, & metallica cætera, ac lapidosa, ossa, os sepia, cornu cerui, caprae, ungula caprae, testæ ostreorum, & similia.

Cum verò dura illa teri antè mollissime debeant quàm lauentur, teri autem non possint citra vstionem antè, vt prius est dictum, sunt vrenda, quamquam horum multa citra vstionem teri possunt, vt cadmia præsertim lapidosa, chalcitis, chalcanthum, cerusa, pompholyx.

Adde quòd liquabilia promptè, & dura, & horum media, si humore medicamento-
so lauantur, etiam per noctem, in illo resideant, vt plus virium eius in se trahât, interdum enim lauanda sunt ac potissimum in sole feruidissimo: præsertim si qua sicciora, tenuiora, albiora volumus. Lauantur enim non aqua fontana, & pura solùm, sed marina, sulfurosa, bituminosa, vino, aceto, lacte, mucagine, succis plantarum, decoctis aromaticum, vel aliorum medicamentorũ etiam purgantium: vt ex Mesuè simplicibus patet: omni denique humore, sed quem doctior medicus iusserit, ne sibi hanc deligendi humoris potestatem pharmacopœus arroget. Est enim quando calida humore aliquo calidior vult intendere: vel remittere frigidior: est quando vires alias mutare instituit.

Qu

Quæ verò est in colore solo medicamēti mutatio, esse possit in pharmacopœi arbitrio, modò vires nihil mutet. Vt si medicus imperauit, hoc vino aliquo austero ablundum, pharmacopœus autem velit albius, & elegantius reddere medicamentum, lauare id potest vino aliquo albisimo, modò id sit, vt iubet medicus, austerum. Odorem similiter deligere illi non permitto, quòd ea cui odor inest substantia, maiorum est vi-rium: ad hæc quòd odor additus, vel huic hominum proprietati, vel cerebri, cordis, vteri affectibus curandis non conuenit. Multò minus saporem medicamento hunc vel illum, vel qualitates alias insignes per humorem à se delectum ad lauandum, derit pharmacopœus.

Metallica itaque curiose laeuigata, lauantur ex aceto, vel matina, si vlcera sunt tumida, cum oris crassis, & callosis, attenuationem multam requirentibus aqua autem, si humores in vlcus affluentes sint acres & mordaces: vino, si humor vlceri largior affluit. Ex his humoribus per plures dies tribulentur metallica, donec erunt pura, candida, perspicua.

Quæ ex metallis ad punctos, neruos, aut aliter vulneratos, partibus neruosis adhibentur, omnia esse elota oportet, si modo

Gal. in fi-
ne lib. p. c.
pb. g.

citra morsum sint siccatura. Cera quoque & terebinthina, si his medicamentis miscenda est, sit elota, & multò magis reliquæ resinæ, si immittendæ sunt. Nam medicamentis omnibus quæ laueris, acris & mordens sanies eluitur & abstergitur.

Hæc in vniuersum de duroriū, & molliū, & medioriū lotionē sufficiant: nunc particulatim de quibusdam agendum. primum plantarum partibus reliquis, deinde metallicis.

Aloë optima, trita creta, ex aqua fontana purissima dupla aut circiter, agitetur aliquandiu rudicula ferrea aut lignea in vase lato stanneo, vel terreo, vel alio, tecta sinatur horæ quarta parte, aut paulò diutius subfidere: tunc quod clarius supernatat, inclinato vase in aliud simile, sed minus, per columbetaceum transuasetur: aut si puriorem, sed parciolem, vis aloë lotam, licio aut filtro excoletur, aut diutius recidere permittatur in vase præsertim vitreo, interuallis paruis foramina habente, spina, aut cera obturata, per quæ quātū videris clarum sine effluat, ne scilicet inclinato vase turbari queat: aqua nouam affunde, subige, sine, elatria: id fac quater, quinquies, donec arenosa, & terrea tantum fex super sit. Primam omnium præstantissimā per se in solatu sicca, alias omnes simul. Si autem hyems est, aut lota aloë

in rem præsentem egetur, igni lento siccaripotest.

Dū autem siccata tam aloë est ex vase ipso eximenda, calefiat vas parum, vt promptius ab eo aloë separaretur, & imā eius partē, in quam quod crassius est subsedit, cultello derade, vt in panibus cereis fieri solet.

Quod si nondum pura & perlucens factis appareat, iterum teratur, & lauetur vt prius, idque si libet, tertio, quarto, fieri potest, si medicus iusserit. Nam toties lota *Gal.li. 7. meth.* aloë acrimoniam & vim purgatricem prope totam amittit & calorificam, licet in ea portio aloës tenuior contineatur, quæ his qualitatibus exuta roborat magis, soluit minus. Hæc eius lotio magni æstimanda est, qualis dum faciem vini vstam, & calcem viuam lauas, dum subsedit, aqua hæc effusa siccatur in cauterium omnium præstantissimum. Quæ lauandi ratio planè est ab aliis diuersa, in quibus aqua ipsa abiicitur: in hac lotiōe sola seruatur. Aloë verò si laues, ter, quater, & dum resederit aquā abieceris, quod relinqueretur amaritudinē quidē exuerit post aliquot lotiones, sed impura & faculēta tantū aloës pars fuerit. Si autē aloën læuissime pulueratā, & cretā aqua pluvia, tãquā magis aloën permeante ob tenuitatē, vel intybi, vel rosarum, vel alia simplici,
aut

aut composita imbuas, deinde insolatu aut igni sicces: idem secundo, tertio repetas, lotio non est nisi abusive loquentibus: sed verius, ut sic dicam, imbutio. In quo genere præparationis est, quæ à Mesue in simplicibus scribitur aloës macerato ex decocto aromatum, vel specierum hieræ picræ Galeni: lotio enim non est, ut nec quæ Albucasi in Seruitore multiplex describitur, quia nullam ipsæ aloë aufert aut substantiam, aut qualitatem, sed suas illi facultates impertit. Fuerit igitur verius infusio, maceratio, & (ut sic dicam) imbutio. Quæ quibus & quando facienda sit, medici solius est instituere. Ob id hoc loco de his agendum fufius non putavi.

Nec sarcocollæ, aut cancami est lotio, dum ea trita lacte asinæ, vel capræ, vel potius mulieris recentissimo humectatur, non autem mergitur, ne lac ante acescat quam siccet, deinde insolatu mox siccatur: idem opus quinquies repetitur: sed infusio, aut nutritio magis fuerit.

Nec cardamomi aut cumini in aceto maceratio rectè cum Bulcasi, & aliis lotio vocetur, nisi, ut dixi, abusive loqui se fateatur. Sed hæc de nominibus non de re disceptatio finienda est, ad remque propositam nobis redeundum. Cancamum tritum aqua fontis,

tis, cui aristolochia, & schœnanthum aqua incocta fuerint, lauat pistillo semper agitâdo Pādectarius: quoad aqua clarescat, quod resedit coletur, & siccat. Tenuius sic euadit, & magis aperit.

Acacia vera Găleno lauatur ad tollendam ipsius acrimoniam: nobis prætereunda, quia desyderatur, & eius loco succus prunorum agrestium, acrimonix expers substituitur, qui lauatur tamen aliorum succorum modo, ex aqua dulci, aut lacte, vt sit anodyna magis. Nam valenter astringentia exasperant non leniunt, vt in remediis ophthalmix docet Gal. lib. c. pb. p.

Tragacanthum tritum aqua pura aut rosata macerant nocte vna: postridie mucaginem colant, & nisi mox vtenda sit, siccant ac reponunt, plotaq; vsurpant practici quidam.

Lythargiros, chrysitis, aut eius desyderio argyritis, aut alia; multis modis abluendo albatur Dios. lib. 5. Potest autem lauati, vt

*Gal. initio
lib. 4. c.
pb. g.*

Cadmia lapidosa, vt siccat magis Gale-
no lauatur per æstatem in sole pluribus die-
bus terendo in aceto acri, aut vino planè ful-
uo, & substantia perlucido quale in Gallia,
Aurelianensi & Belnensi, quod multò ma-

lib. 9. ad
Almanfo-
rem.
Diosc.

ximè siccare natum est, deinde siccatur & reponitur, ac vlceribus malignis inspergitur.

Cadmia autem Diosc. in mortario trita lauatur, effusa subinde aqua dum sordes nulla emergat: deinde coacta in pastillos reponitur. Sunt qui, lauant, vt pompholygem. Scoria ferri trita diebus octo maceratur aceto, quotidie mutando, die nono imponitur laminae ignita, vt torrefiat. Sic preparata valet compositioni Rasis ad omnem sanguinis fluxum immodicum.

Plumbum post vstionem lauatur modo omnibus duris cōmuni, vel etiam hoc modo. Aquam paucam in mortario plūbeo agitata pistillo plumbeo, donec nigrescat & crassescat, tunc per linum aquam cola ter quater, sine subfidere: laua subfidentiam aqua pura donec ea amplius non nigretur.

Vel plumbi limaturam cum aqua crebra tere in mortario, donec aqua saepe mutata nigrari desinat.

Pompholyx linteolo modice raro ligata in vase aqua pluuiā, vel fontana pleno huc illuc ducitur & tribulatur, vt pars eius utilis & tenuior in aquam effluat, & omne excrementum in linteo remaneat: residere finas, & effundas, noua deinde aqua affusa idem opus repete, idque donec in linteolo nihil vrile maneat. Modos eius abluendae
ali.

alios lege in Dioscoride.

Sic spodium lauatur, excrementosum tamen magis est, Sic interdum & cadmia lapidosa. Nam fornacaria (quæ vulgo tuthia & male pompholyx dicitur) modo aliorum metallicorum lauanda est, & scoria plumbi in mortario lauatur aqua pura toties mutata, dum à scoria luteo colore amplius non inficitur, digeritur in pastillos Dioscor. Stibiū, cerusa, æs vtrum eidem lauantur, vt cadmia vel plumbi scoria.

Abluitur lapis cyanus, vt Armenius Alexandro Tralliano, in aqua communi tritius, vel quadragies mutata: deinde aqua buglossi, vel rosarum decies lauatur, vt in antidoto cocci baphicæ, & in catapotiiis ex his lapidibus.

Calx aqua marina bis terue lota per æstatem sub æstu caniculæ, puncto neruo medicamentum est vtile, cum oleo. Gal. lib. 6.
method.
Diosc.

Chrysocoliam tusam infusa aqua mortario, expansa manu eidem vehementer affrica, & vbi confederit cola, altera quoque affusa aqua rursus tere. Hæc vicissim prosequere, donec pura sinceraque spectetur, deinde siccata in sole, ad vsus reconde.

Terrā Lemniā sic lauabat Dianæ sacerdos in Ephestiade Lemniū vire. Hæc aqua macerabat, & in lutum reducta valenter cōtur

turbabat, deinde paulum quiescere sinebat, tunc aquam supernatantem auferebat, & mox quod sub ea erat lutum, tollebat relinquens tanquam inutile lapidosum & arenosum illud, quod in imum subsederat, lutum illud pingue siccabat, dum mollis ceræ consistentiam acquirebat, tunc in paruas huius portiones sacrum Dianæ sigillum imprimebat Gal. libro nono, simpl. & paulò post, Terra autem omnis lauatur eodem modo: primum enim maceratur aqua nullam qualitatem medicamentosam habente. Vbi lutum confedit, effunditur quæ innatat aqua, quod lutosum est separatur à lapidoso & arenoso, quæ ad imum resederunt. Gustatus autem tibi index est acuratus, quam oporteat terram lauare, & quam non.

Quædam enim non solum terra, sed alia quoque corpora lauari non postulant: quædam semel, vt terra Lemnia, quædam bis, vt quædam terra Eretrienfis.

Bolum Armeniã similiter lauabis. Sunt tamen qui aqua rosarum ter lauant, totiesque siccant. Potest sine lotionē usurpari cum nullam qualitatem manifestam præ se ferat: sed facultate occulta valeat: & vi siccatrice.

DE PLVRIBVS SIMVL PRAE-
parationum Differentijs.

QUANTVAM in prædictorum plurima, multæ simul præparationũ differentia cadunt, tamen visum est seorsum de his quæ multis præparationũ modis egēt. Lapis, quo vitra dicta lapidea fiunt, concretus ex cineribus herbæ (quam vulgus sodam vocat) in fossa terrea vstæ, tritus, cribratus, aqua tanta mergatur, vt digitis duobus aut tribus superet, misce, permitte fæces residere, claram partem per filtrum, vel licium destilla: quod clarum est clibano, vel igni sicca. Salem coagulatum, allæali Arabicus dictum, albissimum, inuenies multis medicamentis vtilem.

Eryngium intus & foris purgatur, in frustra secatur, caryophyllis, & cinnamomo facitur, percoquitur. Sic etiam satyrii radix quibusdã.

Amylum ex tritico delecto, crassius confacto, nocte vna macerato aqua pura, quod postridie exprimes, cunq̃ue amyllum subseciderit, inclinato vase aquam clementer effunde, sicca cito, igni, vento, sole, gossapio, præsertim hyeme, ne ace scat: siccatum repone vase mundo operculato. Paulo diuersius hodie fit, sed nulla virium differentia. Ex hordeo, oriza, & aliis similiter fieri potest.

Agaricum tritū cum vino, cui zingiber infusum sit, in trociscos fingitur, siccatur, reponitur, vtendi tempore teritur, aliis miscetur. Sic colocynthis, scilla in trociscos formata mitescunt.

Myrobalani multiplicē habent præparationem Mesuæ in simpli. & in E. alharil liquores, ammoniacum, galbanum, sagapenum, opopanax, & liquores alii ac gūmi aceto, vino vel alio humore, quē medicus iusserit nocte vna macerantur, dissoluuntur, cribro setaceo percolantur, vt semina, & ligna, & excrementa eorū alia in colo remaneant, percoquantur ad humoris illius cōsumptionem: aliis extra ignem miscentur.

Gossapium, bombacē & cotonē vocant, vino cui incocta sint aromata cephalica, aut stomachica, vel partialia familiaria p noctē maceratur, siccatur carpitur, applicatur loco panni quisquiliati, vel eius tomenti, quēd hęc ad infectionē aliena quædā recipiant.

Sunt qui hęc epithemata similibus quoque medicamentis farta, & vtrinque recta densius interurunt.

Cerebellapasserum vere occisorū lauantur, purgantur. Ex his decem cum vitello cui subacta, parum igni friguntur, deinde sole vel igne siccantur, adiecto si libet parco melle ad venerem incitandam parantur alii vt
adi

adipes & medullas parant.

Pulmo vulpis lauatur à sanguine, clibano ficcatur, reponitur, teritur, cum aliis miscetur vtendi tempore.

Tunica interior gallinarum lixiuio calido hora vna maceratur, ter lauatur, deinde vino ter maceratur, & ter lauatur: iterum lixiuio, post vino, & ficcatur clibano ex quo panis extractus est. Viribus tamen nullis valet Galeno in simpl. libr. 11.

Hepar lupi ad hepatis affectus quosdam vino albo optimo lauatur, inspergitur puluere tenuissimo santali flauo, ficcatur, absynthio in scutella inuoluitur, octauo quoque die mutatur, absynthium reponitur loco sicco.

Intestinū lupi ad cholicā efficacissimū vino albo optimo lauatur, inflatur, ficcatur, extrafumū & puluerē, absynthio inuoluitur.

Obserua hic & mox in coagulo inuolutionem & in Mesue simpl. & compositis saepe præparationis quandam speciem: quam sciens omitto, quia rarior est alijs.

Cutis pedum & rostrorum bouis & ouis igni lento diu coquuntur, donec veluti coagulum remittat. Id exēptum siccatumque in aëre perflatili, ad hernias commendatur.

Coagulum ex recens occiso animali tenello, sale inuoluatur, inoletur, feruetur.

Hircus quadrimus, sanus, bene habitus, canicularibus diebus saxifragia, apio, petroselinio, fœniculo, pulegio, hedera, schœnântho, genista, adiantis, lupulis, & cæteris calculum frangentibus nutritus, vino optimo & tenui potatus, in sole dies. 40. versatus, donec urina nigrescat: tunc decolletur, & sanguis non primus nec postremus, sed medius excipiat. Olla pura, aut patina, foliis prædictis instrata: dum concreuerit, incidatur per latum in partes duas. Siccetur sole vel luna tectus retri aut panno raro, vitetur ros & pluuia.

Diosc.

Adipes recentes aqua pura aliquoties loti in vase semipleno, liquantur sole vel aqua calida in vase duplici, tepore, aut cineribus: & quod liquatum erit, sensim effundatur in vas aliud. Vel igni liquentur & colo tenuissimo transfusi feruentur. Sic adipēs liquatos colando à membranis & aliis purgat. Gal. in emplastro diachalciteos.

Diosc.

Cantharides vere forpiculis præhensas, & immixtas phialæ oleo obruæ, & insola, donec putrescant, vel vase fictili non picato cōde linteo raro, vasis os subliga, eoque deorsum verso excipe halitum aceti quam acerrimi feruentis, donec æstu exanimentur, postea lino transfixæ reponuntur.

Transfixio hic & in scilla, in radicibus eligatis seruādis, etiam est præparationis specie

cies: sed cuique perspicua, & saepe ad siccationem & repositionem necessaria.

Carnes ericii leonis & aliorum quorundam animalium seruandæ in vsus medicos, ante quater quinquies, semper tamen per horam lauandæ vino calido dulci, in furno leuiter siccatae seruantur.

Caro cancrorum ad antidota analeptica secreta, ter lixiuio, vel aqua salsa lauatur, donec odor teter abierit ex aqua hordei, aut sero butyri coquantur.

Ceram in aqua liquabis, extrahes autem impositis ipsi phialis vitreis aqua prius tin-

ctis, quibus quantum adhærebit forma scintillæ in sola Iulio mense, do-

nec albescat. Vel ceram ex

aqua dum nigrum mu-

tanda, coque do-

nec sit al-

ba.

Hæc de medicamentorum præ-
parationibus suf-
ficient.

DE MODO MI-
SCENDI AD COM-
POSITIONEM MEDICA-
MENTA, LIBER
TERTIVS.



V M finis omnibus iis, quæ ipsum præcedunt, & ipsius gratia sunt, sit præstantior, hunc librum tertium medicis & pharmacopœis nō vtiliorem modò: sed etiā magis quam prædictos duos necessarium faciliè iudicaueris. Cū neq; medicamēta huic affectui idonea delegisse magni sit momenti (nisi affectus ipse simplex simplici remedio curabilis est: aut sit compositus simplici quidem nobis, sed natura composito) neque hæc præparasse, nisi compositio succedat, quā illa duo spectabant, & in quam deligebantur, & præparabantur medicamenta.

De modo igitur seu industria, & arte medicamēta cōponēdi, & miscēdi sumus dicturi: non tamē omnia, sed ea præcipuè quæ Parisiis, aut vsu, aut paratu sunt frequentiora. Quæ verò vrbes aliæ alia in vsu composita hab

habēt medicamēta, ex horū imitatione paruo negotio substituent. Porro in his omnibus Meiue ordinē sumus sequuturi, vt scilicet doceamus. Primum, quo modo condita sint cōponenda, deinde sapa, iulepi, syrupi: tertio loco eleginata: quarto decocta, & infusa sū qua hodie vsurpātur, quinto antidota, sexto pilulæ: septimo trocisci, octauo pulueres: nono olea: decimo vnguenta, vndecimo cerata, duodecimo emplastra. His tamen passim, sed locis suis ex Nicolao, & aliis similia, sed vītatoria nobis ascribemus. Quæ verò vrbes aliæ vsurpāt, si libet ascribāt, vt Lugdunēses cōseruam menthæ, athanasæ vulgaris, eupragiæ, scolopēdri, oxalidis, iteos, itœchados, hyssopi, saluiæ, saluiæ vitæ, myrobalanorū, limonū, priuulæ veris, sigilli beatæ Mariæ, summitatum mātis, cucurbitæ, cucurbitā cōditam syrupū luporū, calaminthes, violatū decoctione cucurbitæ, electariū de bolō cōtra pestem, E. Indum maius. E. rosatū Mesuæ loco. E. de succo rosarū. E. lenitiuū quoddā. E. de psyllio. E. laticitē. Gal. E. laticitās Cōsiliatoris, auream alexandrinā, cōfectionē anacardi. nā, hierā Ruffini, Logadii, Hermetis apud Mesuē, Miletā, requiem magnā Nicolai, rubiā trocischatā eiusdē, trypheram persicam in febribus continuis vsu patissimam,

& sarracenicam, philoniū Persicum, & Romanum, & alia per multa vrbibus aliis consueta ascribant alii si volent.

DE CONDITIS SE-

ctio Prima.

Mesues.

Humectatur, ut docet Mes. in Zingibere condito & myrobal. cepulis.



RYNGII radix cōdienda, sit ampla, alba, tenera, intus ligno & foris cortice purgata, deinde secta in frusta pollicem æquantia, intus, unde lignum expurgasti, sarta uno caryophyllo bu meſtato, & particula Zingiberis humectata. Hæc sic præparata coquitur in saccharo equali & melle duplo, uel melle solo triplo. Coctis additur iustum pondus aromatum.

Mel & saccharum deſpumen- tur & cū his radici- bus perco- quatur cin- namomi & Zingiberis ana- drach. duæ in lib. sin- gulas.

Quoniam radices hæ quantumuis tene- ræ etiam subduræ apparent, & coctione in saccharo & melle dureſcunt, non tenerẽſcūt, ſatius fuerit purgatas, & ſectas, aqua eas re- gente ſuper cineres calidos nocte macera- re, poſtridie ſemel feruefacere, & ex aqua illa, ſi pura apparet, ſin minus, alia dulci ſac- charum ad electarii ſolidi, aut penidiorum conſiſtentiam coquere, illi tum radices hæ ſic emollitas parumper incoquere, caryo- phylorū vel cinnamomi, & zingiberis ſic- corum mediocriter pulueratorum ana vnc. dimidiam in conditi libr. duas, vel miſce- re, vel nodulo ſuſpendere ſine aliis aroma-

tub

tibus. Similiter condies radices fisci, cari, dauci, pastinacæ, apii, raphani, & similium prius scilicet lotas, & intus ac foris purgatas elignando, deiradendo, decorticando, sectas, fartas, melli, aut saccharo incoctas. Acorus autem nostrâs non est condiendus, nisi medicus aliquis doctus iusserit, vt in Mesue docui. Alii bene purgatas radices, in melle despumato, & saccharo clarificato mediocriter coctis, igni lento percoquunt, ex aqua tamen non præcoquentes, ne aromaticam vim auferant: radicem tamen helenii præcoque, vt amaritudinẽ deponat: ari, dracontii allii, cæpæ, porri, & similium, vt acrimoniam deinde vt prædictas cum melle, & saccharo percoque.

*Diasatyrium alterum accipit libram unam radicum eryngii coctarum in aqua cicero secundam, radicum satyrii plenarum & recentium unc. octo, radicum raphani domestici unc. tres, radicum dracontii unci. duas, quæ omnes simul tritæ in lactis uaccini quantitate sufficiente, & butyri uaccini olei sesamini ana unc. quatuor, igni lento coquantur ad iustam crassitiem, * tunc * & cernâ adde mellis despumati libras * sex, succi cæpæ retur. centis libram unam & dimidiam, ubi omnia * tres tantum sunt perfectæ cocta, & ab igni deposita, adde tum hodie*

banc puluerem scinci caudarum & lumborum
drachmas octo, seminis erucæ, nasturij, pastina-
ræ napi, asparagi fraenix, piperis longi, becn
utriusq; zingibetis, cinnamomi ana drach. qua-
tuor prædictis misce. Postremò adde strabillorū
depellatorum libram unam & dimidiam, pistla-
tiorum depellatorum uncias decem, cerebrorum
passeris uncias duas, misce omnia probè, aroma-
tiza drach. una * moschi boni.

*aque ro-
sarum se-
milia so-
luta & cū
alijs mista

Radices raphani cum etiam duriores
sint radicibus eryngii, cum his præcoquen-
dæ videntur, radicis dracontii acrimonia,
lacte, butyro, oleo obtunditur. Potes co-
quere ex lacte ouino, muliebri, caprino, &
etiam asinino pro variis medici scopis, qui-
bus etiam calidiora interdum auferre co-
gimur. Pro oleo sesamino iam desito su-
mitur oleum amygdalarum dulcium: qua-
le postea describam, vt in diasatyrio ana-
leptico. Iusta crassities est cataplasmatidis,
opiatæ, cassiæ purgatæ, sordium auris,
mellis vetusti, aut probè despumati, quod
signum quoque est perfectæ coctionis cui-
us post meminit. Nam mel despumatum,
& succus capæ prædictam crassitiem eli-
quabunt, & velut incrudabunt: absum-
pta deinde per coctionem reliqua mellis
humiditate, & ea que largior est in succo
cap

capæ recuperatur prior consistentia, tunc-
 que perfecta est coctio. Cicera eadem ra-
 tione infundit vel incoquit lacte, in pulue-
 re impinguante sectione octava. Sunt quæ
 in rem præsentem quo voles tempore (nam
 semper vna radix vegeta est, licet magis
 & minus) lotam radicem ex secundo ci-
 cerum decocto coquunt, deinde caryo-
 phyllis & cinnamomi frustillis configunt,
 & cum saccharo clarificato, & colato pa-
 rum diu percoquunt, dantque dormitu-
 ris radicem vnam, aut duas nec infocli-
 citer.

Aquam cicerum secundam cur capiamus
 in Mesue dictum. Radices plenas capit ex
 agro præsertim sabuloso, quia flaccidæ sunt
 exanimatæ, & vide ne varietas satyrionum
 tibi imponat, lactis quantitas sufficiens, vt
 digitis duobus supernatet, quo absumpto, si
 nondum hæ sunt percoctæ nouum lac, buty-
 rum, oleum affunde. Pro capæ bulbum asca-
 lonitem nobis dictum, cur ponendum pu-
 tem in Mesue docui.

Been, zingiber primò terantur, semitritis
 adde semina, deinde cinnamomum, postre-
 mò scinci sicci.

STROBILOS aqua tepida per semi- *Mesues.*
 horam prius macerari volunt ad acrimo- *Conserua*
 niam tollendam, quæ cum tam exigua sit, in *rosarum*
 ali

aliis magna, frustra id causantur.

CEREBELLA passerum præparata, vt libro secundo docuimus, in pluribus præparationum modis.

* Hodie
extinguan-
tur nõ sic-
centur.

* Duplum
plerique.

* Non ple-
no, ut sit lo-
cus seruo-
ri etiã sine

insolatu,
dies trigin-
ta quidam
insolant,

male aliij
coquunt
igni.

Mesues cõ-
serue uio-
larum.

* Buglossi
utriusque

i. uulgaris
borra-

gini.

Saccharum rosatum sic fit folia rosarum ru-
brarum nondum omnino apertarum in umbra

* siccantur, donec ipsorum humiditas superfluat
resoluatur, teruntur tunc in mortario lapideo,
additur sacchari albi, triplum * reponuntur * ua-
se uitreo aut uitriato pergamena operculato, mē-
sibus tribus insolantur, in dies sæpe mouentur, so-
li auferuntur, seruantur.

Sit saccharum, & mel triplum, vt florum,
parum ficcatorum vnciis duabus mellis de-
spumati, aut sacchari puri, puluerati, vnc. sex
miscant.

Saccharum autem rosatum aliud hodie
nobis appellatur, quod aqua rosarum alba-
rum, aut succo rubrarum pari solutum ad ele-
ctarii solidi crassitiem coquitur, & puluera-

tur, vel in marmor butyro superlitum inii-
citur, ibique latefcit, dum cohaluit in tessel-
las secatur. Saccharum rosatum tabulatum

vulgò dicitur.

Saccharum uiolatum fit, ut rosatum, nisi quod
i. uulgaris uiolæ paulo diutius, & in umbra siccanda, & cum
& borra- saccharo insolanda, sic fit saccharum * buglossa-
tum & rosmarinatum.

Rosmarinatum malè anthosatū vocant, cum anthos florem omnem significet non speciatim florem rosmarini. Sic etiam conferuæ, vt vocant, fiant ex floribus Persicorum, arantiorum, genistæ, sparti, maluæ, althææ, & similitum florum.

Sunt tamen qui flores integros, & sacchari puluerem vicissim vasi inspergunt, & insolant, aiuntque sic suas qualitates propè integras flores seruare. Alii saccharum clarificatum infundunt.

Similiter quoque fiunt herbarum quarundam natura exuccarum conferue, vt adiantorum omnium quibus ad analepticum destillatum vtimur, & conferua asplenii, saluiæ vitæ, phyllitidis, & similitum. Herbæ enim hæc recentes in mortario lapideo teruntur saccharo duplo miscentur, insolantur.

Mel rosatum sic fit, succi rosarum recentium libra una cum mellis albißimi & purißimi, & despumati libris decem coquitur igni in lebetes. Vbi feruere hæc incipient, adde rosarum uiridiū forpicibus, uel cultello incisarum libras quatuor, coque ad succi consumptionem, continenter mouendo in fistile aliquod transuasa, & diu eodem contine, nam tempore præstantius euadit. Eodem modo fit mel uiolarum.

Nicolaus
Alexādrinus.

Mel

Mel cum libris aquæ tribus mediocriter despumetur : vbi deinde feruebit , super ignem aut extra misce rosas & succum , & insola dies quadraginta aut circiter : coque ad succi consumptionem, cola percoque in syrupum.

Sunt qui mel clarificant cum mel rosarum ore exeiendum est, illud enim clysteribus magis idoneum est.

Matthews Mel myrtinum fit ex succi myrtorū lib.
Gradi. in 1. mellis lib. 2 igne lento simul percoctis.
consil. de Mel vuatum passulatum vulgò , fit ex
lepra. vuis passis intus purgatis aqua calida. 24. horas maceratis, probe coctis, valenter expressis, expresso tandem ad mellis crassitiem percocto.

Mel emblicarum, scilicet myrobalanorū est quo ipsæ sunt conditæ & seruatae.

His mellis differentiis vtimur in alijs compositionibus.

Anacardi triti diebus 7. aceto sufficienti macerantur, octauo coquuntur ad dimidias, colantur linteolo. Succus cum melle sufficienti coctus ad spissitudinem mel est anacardinum. Fœx verò siccata anacardi sunt preparati. Nicolaus Alexandrinus in Theodoro ex melle anacardino, alii mel leum id quod aquæ innatat, cui incoquantur anacardi.

Fructus aut saccharo, aut melle, aut utroque condiuntur, interdum integri & cum seminibus, sed ferè imperfecti, interdum seminibus purgati.

Fructus nostrates condiuntur poma, pyramos chatella, cydonia, persica præcocia, armeniaca, pruna, præsertim dactylina, nuces virides, cerasa, corna, baccae ribes, & oxyacanthæ, omphacæ, omnes integri præterquàm magni, vt cydonia, persica, hi enim foris & intus purgati, & in partes secti condiuntur. Nuces verò depellatæ diebus nouem aqua pura in dies ter, quater mutata macerantur. Postea coquuntur aqua, donec tenerescant, siccantur vento aut lin-

ces si aqua flumiali multa & sæpè mutata macerent, tot autem diebus inspiciant, & uadūt, & semis putres. Saccharū si purum aqua pauca ut libra una in libr. duas sacchari coletur impurum & pingue clarificetur cū aquali aqua.

Sic

Sic enim virides, & puræ magis permanent. Cydonia quoque purgata ex aqua coquantur, donec tenerescant postea condiuntur. Modus autem condiendi omnibus est vnus, saccharo enim ad syrupi consistentiam cocto immixti incoquantur, donec syrupi consistentiam saccharum recuperarit quam amisit fructuum humore solutum. Quin & præcocia si prætereà saccharum retrudant, id exemptis interea præcocibus recoquendum, deinde præcocibus reddendum. Si enim cum saccharo recoquerentur durescerent. Aliæ cydoniorum amborum conditura docentur in Mesuæ, sectione prima.

Gelatinam cydoniorum sunt qui ex succo cydoniorum coquunt, alii ex cydoniati parte liquidiore, affuso utrobique pauco succo ribes, aut oxyacanthæ, ad ruboris gratiam.

CONDITURA SEMINVM,

& aliorum quorundam.

CORIANDRVM in tabula polita decliui, crebro succussu purgatur. Rotundius enim ac integrum delabitur. Quæ verò sunt quassa grana, & cum his alienæ quædam materiæ in via ferè hærent, vel in ipsis seu carceribus pigra cessant. Aceto id inter sum horis circiter octo sine igni maceratur,

tur, igni frigitur ac siccatur, eius libra vna saccharo sic tegitur ac incrustatur. Aquæ in lebetem stannatum impositæ libris nouem albumina ouorum tria iniiciuntur, scopularum agitato multo in spumam tolluntur, mox sacchari, si impurum est (purum enim partius satis est partio remque aquam requirit) libræ nouem miscentur igni, omnia simul feruendo parum diu, & iudicula confunduntur, donec spuma nigrescat, quod aquæ sexta parte consumpta ferè accidit, per pannum laneum colatur. Eius propè dimidium in syrupi ferè consistentiam recoquitur. Interea semidolio focum alterum habenti superpositum in magna pelui area coriandrum manibus ad siccandum ducitur. Dum siccum est sacchari eius vncia circiter vna cochleari affunditur, multum diuque manibus in ea confricatur, id velut tectorium dum apparet siccatum, inieccto nouo saccharo, iterum vt prius confricatur, idque opus repetitur, donec totum illud saccharum induerint grana coriandri. Tunc reliquum sacchari dimidium in syrupi crassitudinem percoctum, similiter affunditur & confricatur.

Perlatum verè fit (sic enim vocant, quando eius corpori saccharum accrescit in formam paruorum vnionum, quos vulgus per-

fas appellat) si vbi iustam incrustationē, sed
laxē & politam est assequutū, è vase subli-
mi inferno foramine saccharū sic percoctū
paulatim tanquā filo perpetuū in peluim co-
riandrum sic tectum habentem continenter
defluat. Peluim verò continēter in omnem
partem dimoueas. vel ansis apprehensam, &
super corpus rotundum lineo circulo inter-
posito facile mobilē, vel facilius multò mo-
bilem si ansis funes sic ex solarii tigillo ali-
quo innexi, vt vterque alternis nunc tolla-
tur, nūc deprimatur. Sic cortex cinnamomi,
& aranciorum cōditur, si negligētia frictio-
nis, aut imperitia saccharum fundo peluis læ-
ferit, semina exime, & vasi aquam infunde,
igni trade, donec saccharum remollescat, &
rudicula ferrea deradēti cedat. Vbi tertium
erit fundum vasis, aquā illam saccharatam
effunde in vsus aliquos seruituram, vas lin-
teo mundo, & igni sicca, semina tūc illi red-
de, & opus perface.

Quanto autē est semen minutius, tantò
egrius saccharo integitur, & maiore iniuria
manuum nullius propè interuētū calidario
occurrentium: sed vbi iam auctius tectoris
aliquot est redditum, tum tutius & facilius
manibus cōfricātibus perficitur. Talia sunt
semē anisi, fœniculi, apii, cari, seriphii, quod
cōtra vermes vocant, papaueris albi in cer-
nic

niculo rariore, aut de fiore pro seminis quantitate, purgatum accuratius confricandum: Strobili, pistacia, auellanae, amygdalae dulces, & si vis amarae, similiter ficcatae eodem modo, sed citius incrustantur. Caryophyllorum furculi cinnamomum, cortex arancii, li-
monis, cucurbitae.

Tragema, moschatum ex puluere ireos saccharo aqua rosarum, & paucos moscho sic fit. Pulvis ireos velut compositi basis, in peluim missa affuso paucos saccharo tribulatur: ubi in granula minima partim concreuit, partim in maiora cribro exiguo cernitur, quod transit deligitur, iterum si opus est tegitur, donec seminis papaueris (quod etiam nonnulli loco pulueris ireos supponunt ad operis celeritatem) rotunditatem & magnitudinem sic assequatur. Tunc moschus aqua rosarum pauca, ut drachma una uncia semisse solutus, paucos saccharo miscetur quo postremum fit tectorium, sunt qui aceruo huius conditurae moschi pyxidem biduo aut triduo tantum obruant, ut moschi odorem trahat, substantiam non dissipet manifeste.

SECTIO SECVNDA DE

sapis & syrupis.

Sapa est succus à nobis tantum purgatus, & Mesues. crassatus solis aut ignis calore.

Sapa nobis sola paratur ex acinis vuæ albæ maturis, in lebetæ sine vlllo liquore coctis, per mantile colatis & expressis. Id autem expressum percoquitur ad mellis consistentiam. Sunt qui vt fœlicius seruetur, saccharo pari condiunt: sunt qui ex vuis etiam nigris sapani coquunt.

Iulepus rosatus fit ex aqua rosarum cum pari saccharo cocta propè ad syrupi consistentiam: aut multò minus si mox vtendus est, nec aër ita calet.

Iulepus violatus fit ex aqua florum, & foliorũ violæ nigræ, & pari saccharo similiter coctis, suprà apozematũ cōsistentiam infra syrupi formã. Quanto enim perfectius coquitur, tãto diutius seruatur: sed est ingratus. Parantur in rem præsentẽ, aut si non licet, eorum loco syrupi vsurpantur. Quia verò violas non destillamus ex siccatũ infuso coquimus. Alii magna violarum ad syr. violatum ex multis infusionibus faciendũ infusarum parum expressum destillant, hacque aqua inique vtuntur ad iulepi violati compositionem.

Materia syruporum omnis est à plantis, radices apii, petroselini, fœniculi, asparagi, rusci, cichorii, intybi, ireos, pirethri, spinæ albæ, & Arabicæ, glycyrrhiza, polypodium, agaricũ, rha barbatũ, belleborus niger, asarum,

rum, galanga, zingiber.

Herbæ, buglossus vtraque, hyssopus, mentha, calaminthe, eupatorium, absinthium, adiantum album, origanum, thymum, epithymum, cassutha, oxalis, fumaria, chamædrys, chamæpitis, folium. Harum item multarum succus, præsertim buglossi, menthæ, eupatorii, oxalydis, fumaricæ, intybi, portulacæ.

Fructus poma, pyra, cydonia, cucurbita, granata, citrea, pruna, dactyli, thamar Indi, myrobalani, myxa, zizypha, ficus, vuae passæ mundatæ, capita papaueris albi, nigri, rubri, folliculi sennæ. Horum multorum, succus tantum, præsertim pomorum, pyrorum, cydoniorum, cucurbitæ granatorum, citreorum, & horum cortex, vuarum acerbarum & maturarum, vinum album bonum, antiquum, odorum, acetum, sapa. Ad hæc myrtharum, prunorum, persicorum, ribes, oxyacanthæ, cannarum sacchari, saccharum, penidia: & his affinia, manna, mel crudum, & coquendo despumatum.

Semina, cydoniorum, melonum, papaueris albi, nigri, rubri, lactucæ: portulacæ, apit, petroselini, intybi, fœniculi, anisi, ligustici, dauci, cari: piper omne, cardamomum, hordeum, maluæ, lini, fœnigræci.

Flores, crocus, rosa, viola, stæchas, schœ-

nuanthos, epithymum, cassutha, spica nardi, caryophillum, gummi Arabicum, tragacantha, mastiche, & liquor scammoniū. Et præter hæc aqua ferè fontana pura illimis, ac omnis alienæ qualitatis experts, interdū pluuiæ quæ additur, vt in eam vires medicamentorum simplicium macerando, & coquendo trahantur : deinde saccharo tradantur, vt etiam medicamentum diu coqui possit, & qualitates alienas exuat, nouas acquirat : vt etiam promptius syrupi despumentur, clarificentur, colentur, & in corpus distribuuntur : & sint accipienti gratiores. Aquæ vires sæpè succi sustinent, sed hi sunt, vt dicam, clarificandi.

Succi, herbarum, & fructuum ad syropos bis coquuntur. primò ad dimidias, vt syr. de pomis, & alii propè reliqui : interdum ad partis tertię consumptionem, vt syr. acidus ex succo citri, & alter ex succis fructuum : interdum ad libr. vntus consumptionem semel feruefiunt, vt in syr. bizantino : deinde colantur, postea quiescendo residere sinuntur, alii biduo, alii triduo, alii minus aut magis diu, donec scilicet quod in eo crassum & fœculentum est, subsederit, & reliquum tenuetur, clarumq; ac purum euadat : id quod paulatim vase inclinato colatur, iterum & cum saccharo ad syrupi consisten-
tia

tiam coquitur.

Subsident verò aliis citius, aliis tardius, aliis largius, aliis parcius, ut vinis quæ genere sunt succorum, & vrinis. Vina enim alba, quia non ferbuerunt plurimam fæcem reddunt: nigra quia multum feruendo crassum deponunt, minus: in medio sunt media: sic succus pomorum, cydoniorum, limonum, multa parte subsident: succus granatorum minus, ut illis pars sexta ferè subsideat, his pars octava, ut ex syr. de succo acido citri apertè deprehendes.

Deinde cum saccharo propè pari percoquantur in syrupum, ut succi puri libras 4. 5. sacchari libras 3. 4. recipiant, ut in syrupo succi pomorum, cucurbitæ, succi lib. 7. sacchari lib. 5. in syrupo ex succo citri libræ 10. humoris, lib. 8. sacchari in syrupo acido ex pomis, interdum minus sacchari miscet, ut in syrupo. Saporis succorum libræ circiter 6. in libr. tribus sacchari syrupi corticum citri libræ tres post coctionem relictæ cum sacchari libra vna coquantur.

Quin syru. acidus ex cidoniis in succi libris vndecim, habet tantum sacchari libras duas. Est quando modus sacchari incertus est, ut in syrupo acido ex succis fructuum succi libras tres coqui cum Iulepi lib. duabus,

vel pluribus, vel paucioribus. Si mannā paucam acceperit syrupus, nihilominus sacchari postulat, ut syr. acidus ex manna eius vnc. tres capit, succorum libras, 4. sacch. lib. tres, succus tamen cannarum sacchari, aut penidia ponuntur loco sacchari in syr. de canis sacchari nisi pro, aut, &, legas.

Quin & Iulepus clarus & purgatus sacchari vice præstantissimus est in syr. præsertim ex succis frigidis aut aromaticis, ut fit à Mesue in syr. acido ex succis fructuum, & in syr. corticum citri. Saccharum autem optimum ex aqua æquali coquunt, albuminibus purgant, colant, recoquunt ad penidiorum, aut sacchari rosati, aut electarii sicci consistentiam, & succos mox ubi extracti sunt, sine vlla coctione, colatione, residentia colant, per spumam in colo relictam ex saccharo iam colato purissimiq; hi transfluunt, & æqua portione baculo multum tribulando electariorum siccorum ritu paulatim miscentur saccharo sic percocto, quem Iulepum vocat Mesues, quomodo & syr. acetosum simplicem Mesuæ, & oxyfaccharum Nicolai, & alios multos syropos ex succis plerique hodie componunt, ut vires eorum sint integrior, nec ita promptè cadescent, quod vitium paucò melle misto quidam effugiunt. Id quod probò maximè, modo
do

do non canescant, & situm non ducant ob succorum cruditatem. Quod vitium cauetur in solatur: quæ coctio his potior est, quàm quæ ab igne. Hoc autem modo syr. acidus citri, limonum, aceratus simplex albissimus fit, granatorum autem ribes oxyacanthæ syrup. cum debeat esse ruber, minus diu debet tribulari, ne coloris sui gratiam amittat. Est quando saccharum simul cum penidiis miscetur, vt in syru. papauerum ad catarrhum sacchari & penidiorum ana vnciæ quatuor in decocti selibra: & in syr. papauerum ad tussim, sacchari & penidiorum ana vnc. 8. in decocti lib. duabus, sed in illo saccharum est parcius, vt in syru. adianti, sacchari clarificati, & aquæ adiati ana vnc. octo cum lib. duabus decocti.

Coquuntur autem in vase terreo plumbeo potius quàm æreo stannato, igni prunorum lento, aut flamma exigua, sed sine fumo, vt carbonēs antè sint omnino accensi quàm vas igni tradatur: qui si coctioni non sufficiant, alii ex foco semiuisti substituantur, vt diximus in methodo medicamenta componendi lib. 3. ne carbonum nouorum teter vapor coquenda vitiet.

Coquuntur syrapi ad iustam crassitiem, seu donec portio eorum refrigerata digitis tractatu hæret, ac fila ducit, & iniecta mar-

Nicolaus Alexandri in syr. rosaceo. mori aut scutellæ stat & durefcit non fluitat, seu donec immiffi humoris seu decocti, seu fucci vnciæ circiter duæ in libris fingulis facchari superſint. Id quod depræhendes bullarum modo & numero: nam quoad fucci multum ſuperest in medio bullam excitat vnā, eamque maximā in ambitu paucas & paruas: dum verò in fyrupi confiftentiam coctum propè est pro bulla illa maxima, plurimæ vbiq; mediocres tolluntur.

Qui verò fyrupi decocto conſtant, non ſuccis: pro ſeminum aut radicū libra vnā requirunt aquæ libras circiter quatuor, pro herbarum manipulis quatuor, ſiccarum quidem, aquæ libras duas: viridium verò libram vnā, aliorum autem ſimpliciū quia pauca ſunt parua habetur ratio. Meſues tamen, radicū ſimul & ſeminum libram vnā coquit in aquæ libris decem ad dimidias in fyrupo acetato cum radicibus.

Cum item hordeum, vel aliud diu coquendum eſt, aut per ſe eſt macerandum, aut tanto largior aqua eſt affundenda, quanto coctio longior eſt futura: ſic dum ficca, rara, lenta, & glutinoſa coquis, a quam auge, vt in fyrupo hyſſopi, zizyphorum, alioqui colari non poterit, niſi nodulum ex glutinoſis eam colato incoquis, aut muccaginem ex his cum portione decocti

extractam coctiori iam saccharo misces. Incocta enim hæc glutinosa decoctum incolabile reddunt, quia substantia emplastica viam sibi præcludunt, poris coli obstructis. Idem vitium est si penidia miscentur ex saccharo pinguiore, impuriore cum amylo multo tractata. Sunt qui libræ camentorum multam coctionem sustinentium tribuant aquæ lib. 6. paucam, selibram, mediocrem. 3. lib. aquæ.

Simplicia primum deliguntur, & in ferri-
niola papyracea, vel similia digerantur. Si *Diosc.*
qua seorsum maceranda sunt, aut simul ante
macerentur: coquenda verò in lebetem
in quo aqua iam caleat non tamen fer-
ueat, iniciantur, primum coctu contuma-
cia, seu quæ viribus suis adhuc integris, lon-
gam sustinent coctionem, qualia ferè sunt
radices, semina, fructus, cortices lignorum: *Diosc.*
deinde illa quæ mediocriter: postremò
quæ ob essentiæ tenuitatem, aut virium im-
becillitatem, etiam mediocri coctione ex-
animantur. Id quod odore, sapore, colore
natio mox perduto ferè declarant. Quan-
quam color viridis in adiantis, ruber in zi-
zyphis magis intenditur: quia in his valen-
ter est mistus, & adianti perpetuò virent. de
quibus omnibus abunde libro præceden-
te, de coctionis ratione diximus, hæc dum
car

carbonibus accensis coquantur, quæ spuma supernatat, cochleari foraminulento deditur, & simplicia, præsertim graua, identidem rudicula tolluntur à fundo, ne vrantur, & leuia merguntur: vt coquantur, & vires suas aquæ tradant. Vbi quantum satis est cocta erunt omnia (quod ferè fit hora vna) & vim suam omnem in aqua tam quantum satis est consumpta deposuerunt (quod in multis simplicibus sapor propè aqueus relicto proprio declarat) igni aufer, & si vis in stanneam peluim, aut stannatam transuasa: tege disco mundo, horis quinque, sex, noctem, diem, macerari permitte. Post id tēpus igni parum diu redde, vt recalescant tantum: tūc per stamen cola, & exprime. Expressum vel procul ab igni vel potius igni redditū, ouorum duorum infectis albuminibus in libras 9. 8. 10. scopulis agita diu, & permisce donec quantum potest spumescat. Mox saccharum in frustra comminutū, immitte, aut penidia, aut mel, & si qua sunt seorsum infusa, aut soluta, vt thamar Indi, cassia, agaricū. Postea coque, donec feruendo parum absit à supernatando & effluendo, et flataq; modice spuma decoctum sub hac clarum appareat. Tūc vt calet panno laneo puro cola, si est glutinosum, & quod primum permearit rursus cola, & si vis totum bis, aut ter cola, mutato

etiam colo, si propter prioris sordem opus est. Nam quæ ita calida colantur, igni multum tenuata, permeant impuriora: si lento-
re carent, modicè refrigerata colentur: Panno etiam digitis molliter expresso, nequid utilis materiæ in eo & fœcibus maneat, ne tamen adeò exprimas, ut sordis aliquid simul elicias, tunc enim iterum foret colandum. Vbi colando iam purum erit expressum, purgato intereà & siccato lebeti redde, & igni lento percoque ad syrupi consistentiam, seu donec decocti vnciæ duæ, aut tres in libris singulis super sint.

Si autem muccosa quædam sint incoquenda, ut semina maluar, cydoniorum, lini, scœnigræci, mastiche, tragacantha, gummi Arabicum, nodulo raro ligata filo longo & forti colato iam decocto incoque. Sūt qui tantum ante clarificationem incoquūt, alii ante & post. Postremò cum absoluta est coctio expressum nonnulli abiiciunt: alii nulla ratione in decocto retinent, cū vires suas ea iam tradiderint omnes, non etiā aliquas retinent, ut nodulus aromatum, rha barbari, scamonii, hellebori nigri, & aliorum de quibus libro superiore in expressione.

Si verò ex infusione simplicium post coquenda fiat syrupus, omnia simul infundantur, deinde coquantur. Sic enim vis eorum
hum

humori firmitus, & diutius impressa, coctione iusta dissipari non videtur. Aqua autem infunduntur largiore sicca, rara quam viridia densa, vt in syru. stœchados simplicium, verbi gra. parum tritorum lib. vna maceretur horis 24. libris septem aquæ, si aridiora sint libris octo, quarum vnâ vel paulo plus ebibent: coquantur deinde igni lento ad partis tertiæ consumptionem, quod etiâ citra infusionem coquendo, faciendum est: postea exprime, & reliquum, & lib. quatuor percoque cum mellis despumati, aut sacchari puri libris quinque ad syrupi consistentiam, & syrupi habebis lib. 6. & dimidiam, aut si hyems est, ad libras sex: si æstas, ad lib. quinque & dimidiam. Nam æstate syrupi magis coquendi quàm hyeme ne ferueant humore excrementoso feruoris & putredinis causa relicto accedente externo calore hâc excitante, sacchari aut mellis purgati pondus par succo aut decocto quidam misceri volunt: alii verò etiam paulò plus ob nostrarum plantarum cruditatem, ob quam etiam diutius syrupi nobis sunt coquendi, vt propè solum sacchari aut mellis pondus maneat percocto iam syrupo. Diutius etiâ coquendum: sic succi, aut decocti plus est quàm sacchari, aut mellis. Paulus tamen mellis partem vnâ succi, aut aquæ partes tres coquit ad

ad partim duarum consumptionem in rho-
doſtaſte ſucci roſarum ſextarios duos, mel-
lis ſextarium vnum coquit ad quartæ par-
tis consumptionem.

Coquantur ſyrupi in vaſe quouis, ſed qui
acetati ſunt in vaſe lapideo vel terreo, ſed
plumbato, quod etiam Meſues rectè mo-
nuit in ſyrup. acetato ſimplici, ne acetum ex
ære æruginem eliciat quæ ſyrupum vitiet,
niſi vaſ æreum ſit ſtannatum, quale eſt quo
vtuntur ferè in oſſicinis. In quibus coctio-
ne perfectæ ſcopus eſt ſyrupi conſiſtentia:
ſi verò antequam mel recipiant, cocta erant
parum, vt ad tertię partis consumptionem,
poſt mel acceptum inãgis ſunt coquenda,
vt oxymel de radicibus. Minus autem quæ
cocta erant donec tantũ pars tertia rema-
neret, vt in oxymelite de calaminthæ me-
diocriter, vbi ad dimidias erant cocta, aut
mel perfectius coctum illis minus coctum,
ſecundis mediocriter coctum, poſtremis mi-
ſcendum eſt.

Si operis ſpecimen edis, aut etiam tecum
componis, aquæ libras quindecim cum Me-
ſue, aut potius viginti, libras ſex roſarum
macera horas octo, expreſſis roſis nouas
immitte, idque opus nouies repete: aut
ſi libras aquæ tantum quindecim miſces,
expreſſum pende, quod ſi diminutum eſt,
qu.

quod deest suffice alio expresso trium aut quatuor infusionum.

Nicolaus.

Hic pra-
sertim re-
cens me-
diocriter
purgat ma-
gis ex in-
carnatis,
ut in Me-
sue docui.

Syrupus rosatus sic paratur, rosas recentes aqua feruente macera uase operculato, ubi haec refrixerit expressis rosis & abiectis, iterum seruati fiat, & easdem rosas recentes aliis macera. Id opus toties repete, donec aqua rubeat. Haec albuminibus purgata cum pari saccharo percoquatur in syrupum.

Parari omnino hic debet aut iulepus rosatus Mes. in syrupum coquendus, non autem eius loco semper (quod hodie fit) substitui syr. ex rosarum siccarum infuso simplici, vel duplici cum pari, aut paulo parciore saccharo cocto & colato, qui syr. rosarum siccarum est. Alius autem ex succo rosarum rubrarum fiat purgatio, cum pari saccharo, tertius ex infusionibus nouem rosarum, praecipue incarnatarum purgatorius.

Nicolaus.

Syrupus uiolatus, & nymphaeae, & alij ex floribus eodem modo fiunt.

Mesues.

Syrupus ex cydonijs fit ex libris decem succi cydoniorum coctis ad dimidias. Deinde biduo residere permittis donec clarescant. Tunc colentur, & cum libris tribus sacchari fiat syrupus.

Si saccharum est purum, eius lib. vna aequa uncis quatuor soluta tribus feruescationibus

bus in electarium coquitur, tunc succus cydoniorum pistillo valenter commiscetur, sunt qui parumper saccharo propè percocto incoquunt: si impurum est saccharum, eius libra in aquæ lib. vna coquitur, clarificatur, colatur, percoquitur in electarium, fit vt prius. Sunt qui succos citra coctionem residendo, & insolando purgant, deinde cum saccharo clarificant, colant, percoquunt. Alii aliter, vt ante diximus.

Syr. de granatis acidis, syr. de granatis dul- *Mesues.*
cibus, syr. de omphacio, syr. ex succo oxalidis,
eodem modo fiunt, & de ribes, & uua oxyacan-
thæ.

Similiter ex fructuum omnium, & herbarum succo fieri syrupus potest si ad dimidias coquatur, biduo residere permittatur, coletur, cum saccharo propè æquali percoquatur, in syrupi consistentiam.

Alii in his omnibus saccharum aqua pari solutum coctum modicè cum albuminibus purgant, colant, percoquunt in electarii, aut penidiorum consistentiam. Tunc ubi frigescit, succos ipsos per albumina in colo relicta colatos, & claros paulatim baculo miscant, qua componendi ratione succorum vis, præsertim frigida, vel aromatica integrior manet quàm si ipsi coquantur. Alii suc-

cos hos residendo, & infolatu purgatos, saccharo, vt dixi, percocto cōprehēdūt. Quam componendi rationem omnino præfero ei quæ succos ad dimidias coquit.

Mesues.

SYRUPUS COMPOSITUS.

SYRUPUS saporis de pomis recipit succi pomorū redolent. ũ lib. tres, succi buglossi domestici & sylvestris ana libr. duas, folliculorum sennæ unc. quatuor, croci drachm. duas, sacchari albi libras. tres. Fit autem sic, senna contrita horis 24. succis maceratu, semel aut bis feruescat, coletur: expressum post cum saccharo percoquatur in syrupum: crocus autem pannolino ligatus inter coquendum infricetur.

Mesues.

Syrupus portulacæ accipit seminum portulacæ tritorum lib. unam, horis 24. macerandam in

* Alij sex succi intybi cocti & purgati lib. * quatuor post- uel etiam eā igni lento coque ad dimidias, & colatum cum octo, ut co sacchari lib. duabus percoque in syrupum.

lari possit, Syr. adiantinus recipit glycyrrhizæ unc. succus e - duas, adianti albi unc. quinque, tempera cum nim per se aquæ fontis lib. quatuor horis 24. coque ad dimidias, expressum percoque cum sacchari clarifica lætescit ad ti, aquæ adianti albi ana unc. octo.

hūc infuso Ex adianti albi lib. vna, & vncis duabus semine. glycyrrhizæ purgatæ & tritæ, decoctis in aqua

aquæ libris sex ad consumptionem tertiæ partis cum sacchari libris tribus. Hîc percoquimus, adianti albi, recentis penuria, alii cum sacch. libra, aut sesquilibra coquunt sine aqua adianti, alii adiantum album recens multum sine glycyrrhiza aqua macerant, exprimunt, cum saccharo clarificant, percoquunt.

Syr. ziziphorum fit ex zizyphis sexaginta, *Mesues.*
 uiolarum, seminis maluæ, ana unc. quinque, adianti albi, glycyrrhizæ, bordei mundati, ana unc. una, semi. cydoniorum, papaueris, melonis, lactuæ, tragacanthæ, ana drach. tribus, coctis cum aquæ fontanæ lib. quatuor, & lib. sacchari duabus.

Aqua est parcior quàm ut possit colari, ob id vel augenda est, vel semen maluæ & cydoniorum, & gummi tragacanthæ nodulo ligata clarificato syrupo immitantur, vel dimidium nodulo coctioni ante clarificationem immittatur: reliquum iam clarificato, si autem muccaginem ex his extractam non clarificato immiseris, ægerrimè ob horum lentorem colatur: si colato, turbidus & impurus, ob id ingrator sit syrupus.

Syr. papaueris fit ex capitum papaueris albi & nigri, ana drachm. sexaginta coctis in lib. quatuor aquæ pluvialis ad consumptionem lib. 2. *Ibidem.*

& dimidia, tunc percoquantur cum sacchari albi, & penidiorum anauncijs quatuor.

Largiore saccharo si condias, vt lib. vna, aut etiam duabus gratius erit, & citra multam coctionem facultati refrigeranti inimicam diutius seruabitur, cum paucis autē saccharo puro, si diu non erit seruandum est efficacius. Capita cum seminibus magnorū & paruorum fliccorum & humidorum media macerentur 24. horis: & si sint sicciōra, pluribus deinde coquantur, donec tabescāt: exprimantur cum saccharo, vel melle pro variis medici scopis, percoquātur in syrupum. Vide diacodium in Mes.

Ibidem.

Syr. acetatus simplex recipit aquæ fontis lib. quatuor cum sacchari lib. quinque coquendas in uase lapideo, ad dimidias semper despumando, tunc adde aceti albi clari lib. duas.

Sunt qui saccharum aqua solutū mediocriter coquāt, albuminibus purgant, colant, percoquant in electarii cōsistentiam frigescenti, paulatim baculo miscent acetum purum, vel per albumina in colo relictā colatum, idque ne candescat. Alii Nicolaum sequentes aceti albi partes duas cum saccharo purissimo coquunt & despumant, neque aliter clarificant. Hic quanquam minimum, tamen compositus est.

Syr.

*Putatur inuentus, uel usu multo celebratus bizantiij unde illi nomen alijs à pretio denarij bizantini qui quibusdam bo die etiam

*Syr. acetatus cum radicibus recipit radicem bisantius apiij, fœniculi, intybi, ana unc. tres, seminum apiij, dicitur, un fœniculi, anisi, ana unc. unam, sem. intybi unci. de & syr. dimidiam. Hæc omnia igni lento coquantur ad quoq; hũc dimidias in aquæ fontanæ lib. decem, tunc addi- denarij uo tis sacchari lib. tribus clarificetur, deinde ace- cant. tum additur.

*Syr. Bizantinus recipit succi intybi, & *Syr. bi- apiij ana lib. duas, succi lupuli, buglossi hortensis, rātinus uel syluestris ana lib. unam, feruefiant semel & solute sine purgentur. Eius succi clarificati libras quatuor aceto est. igni lento coque in syrupum cum sacchari libr. Syr. bizā duabus, & dimidia interdum additur * ace- tinus ace- tum mensura succorum purgatorum dimidia: tatus. interdum rosarum unc. duæ, glycyrrhizæ, unc. Syr. byzā dimidia: spicæ nardi drachm. duæ sem. anisi, tinus cum fœniculi, apiij, ana drachm. tres succis inco- additioni- quantur. bus.

*Syr. de quinque radicibus accipit radicem apiij, fœniculi, petroselini, asparagi, rusci, ana *Incerti unc. duas, coque libr. sex aquæ fontis, ad tertiæ est auctoris partis consumptionem expressum percoquitur cum sacchari lib. tribus, addendo sub finem ac- ti unc. octo.

Oxymeli simplex fit ex aceti parte una, mellis partibus duabus, aquæ partibus quatuor coctis in syr. consistentiam despumando.

Hodie sic coquunt quod diu seruandum est. Oxymeli autem Galeni ex aceti parte vna, mellis partibus duabus, aquæ partibus hyeme octo, æstate etiam duodecim. Mel cum aqua primùm despumatur, vbi spumare desinit, cum aceto iterum despumatur, refrigeratū albuminibus clarificatur, igni redditur parum diu, cū tollitur, cinnamomū ad drach. vnam in libr. singulas: dum refrixit, per pannum bis, ter colatur: addito si vis etiam tum cinnamomo iucundissimum, dies paucos loco frigido seruatur ex albo aceto melle pulchrius.

Acetum scillinum sic fit, scillæ laminas inter corticem & cor medias, aculea filo confutas tanto interuallo ne se contigant siccabis in umbra dies quadraginta, postea concisam cultello ligneo lib. unam dies alios 40. insolabis, in aceti boni lib. 8. in uase uitriato, strui orificij bene obstructi, postea colabis, & seruabis.

Sunt qui inter scillæ laminas ne se tangent, & ad odoris gratiam intersuunt fœniculi viridis, aut sicci stipites.

Ibidem.

Oxymeli scillinum fit ex aceti scillini libr. dua

duabus, mellis despumati, lib. tribus decoctis despumando.

Ante mel sit despumatum, vt in melle rosato, sed quam spumam vi aceti scillini expuit, eam derade.

Oxyfaccharum fit ex aceti unc. quatuor, sacchari lib. una, succi granatorum acidorum maturorum lib. dimidia. Nicolaus saler. aliter ser Nⁱ

Saccharum si purum est aceto solutum, cophar. duabus aut tribus feruefactionibus coquitur in electarium, postea cum parum refrixit, pistillo miscetur succus granatorum. Si autem saccharum est impurum, ex aqua coquitur & clarificatur, deinde aceto & succo percoquitur.

Syr. absynthij recipit absynthij Romani lib. dimidiam, rosarum rubrarum unc. duas, spice nardi drachm. tres, uini antiqui boni & odori, succi cydoniorum ana lib. * unam & dimidiam. * Alij, lib. duas & dimidia, ut
In his macera horis 24. prædicta coque igni lento ad dimidias cum mellis lib. duabus, fiat syrupus. facilius coletur & ua-

Absynthium, rosæ, spica minutim concisa vino & succo macerantur, coquantur, expressuntur, expressum cum saccharo clarificatum percoquitur in syrupum. Satius stringat. fuerit absynthium per se infundere, & rosas, & spicam simul, deinde infuso absynthii parum cocto addere alterum, & parum

simul coquere, exprimere. In expresso libr. sacchari dissoluti albuminibus clarifica, cola, tunc adde libr. reliquam sacchari, sed purissimi, vel per se clarificati. Si enim decoctum id cum duabus simul libris sacchari clarificas ob succi paucitatem non percolabitur, nisi succū, vt dixi, auxeris ad libr. duas & dimidiam.

* Sunt qui pomorum acido dulcium, ut ramburū, & granatorum acido dulciū, tantū ana lib. duas & dimidiam miscent.

* minutim concise.

* quæ succos macerando oportet coquendo reddis.

* Syr. menthae recipit succi cydoniorum acidodulcium & dulcium, succi granatorum acidorum dulcium, acido dulcium, ana, lib. unam, & dimidiam * foliorum rosarum unc. duas, coque igni lento ad dimidias, * cum mellis uel sacchari lib. duabus fiat syrupus, aromatizetur cum gallia.

Succos potes sole, igni, quiete purgare, & his reliqua macerare, vel, citra purgationē. His cætera macerabis horis. 24. igni lento coque, exprimè, recoque, clarifica cum saccharo, vel saccharum clarificatum misce, cola, exprimè cum saccharo, expressum clarifica, colatur panno agre & lente, sed tandem aut pannum muta, aut saccharum, vt prius partire.

Loco syruporum fumarie maioris & minoris hodie coquimus syr. ex succo solius fumarie cocto residendo, purgato, percocto in syrupum cum saccharo æquali.

Syr.

Syr. epithymi recipit epithymi boni hortensis drach. uiginti, myrobalanorum Indarum, citrearum ana drach. quindecim, cassuthæ, fumarie ana drach. decem, thymi, calamintes, buglossi, stæchados, glycyrrhizæ, polypodij, agarici, myrobal. emblicarum, & belleric. ana drach. sex, rosarum, semi. fœniculi, anisi, ana drach. duas & dimidiam, pruna uiginti, uuarum passarum purgatarum unc. quatuor. Thamar Indorum unc. duas & dimidiam, sacchari libr. quatuor, sapa lib. duas, fiat syrupus.

Pruna, uuæ, semina, polypodium in aquæ libris octo coquantur, postea glycyrrhiza, buglossus, fumaria: post myrobalani, calaminthæ, thymus: deinde propè coctis epithymus, cassutha, stæchas, rosæ, agaricum, addantur, ubi aquæ dimidium erit consumptum, aufer igni macerari noctem vnâ sine, recalfactum exprime, expressum clarifica cum saccharo, & cola. Thamar Indi cum decocti vnciis duabus creti & pensi, ut purgatis pondus iustum expleant, syrupo addantur, minimum coquantur ad decocti scilicet consumptionem, & sapa syrupo soluta misceatur: recoqui enim non debet. Sine his duobus sapore iucundo præditis consistentia fuerit liquidior, clarior & gratior, & efficacax syrupus ad ea quæ promittit. Sunt qui

rectius agaricum, & myrobalanos seorsum infusos exprimūt, & aliis miscent, paulò ante collationem.

Mesues. Syr. stœchados recipit florū stœchados drach. triginta, thymi, calaminthes, origani ana drach. decem, anisi, pyrethri, ana drach. septem, piperis longi drach. tres, zingiberis drachmas duas, uuarum passerarum pargatarum uncias quatuor, mellis libr. quinque condiatut cinnamomi, calami aromatici, spicæ nardi, croci, zingiberis, piperis nigri & longi ana drach. una & dimidia, ligata in panno raro & appensa in syrupum.

Coquitur in aquæ libr. 7. vel octo ad libr. circiter duarum consumptionem, colatum cum sacchari libr. quinque clarificatur, colatur, propè percocto immergitur saepe nodulus, & radícula comprimitur: postremò in percocto appenditur. Vuæ, origanum, calaminthe, pyrethrum, zingiber, piper, thymus, stœchas hoc ordine coquantur.

Syr. glycyrrhizæ recipit glycyrrhizæ unc. duas, adianti albi unc. unam, hyssopi sicci unc. dimidiam, boris 24. macera, aquæ libr. quatuor coque ad dimidias, expressum percoque cū * mellis, sacchari. penidiorum ana unc. octo, aquæ rosarum unc. sex.

* Despu-
mati.

Hodie coquunt plerique sine maceratio-
ne

ne, quòd ex his facultas in aquam coquendo promptè trahi possit. Hæc rosarum aqua percocto iam syrupo addenda, sed coquendo consumenda, nisi cum quibusdam drach. tantum sex misceas, tunc enim recoqui non oportet, quia aqua tam pauca saccharū non recrudad. Sunt qui manè macerāt, post meridiem coquunt, penidia hæc fiant ex saccharo purissimo (nam impurum ægre colatur) hoc est, saccharum ad consistentiam penidiis debitam coctum, & pertritum pistillo ligneo in vase non autē manibus oleo, inunctis etiam cum amylo, tractum in penidia nempè illo saccharo impuriora.

Syr. hyssopi, recipit hyssopi mediocriter sicci, Mesues. radicū apij, fæniculi, glycyrrhizæ, ana drach. decem, hordei mundi unc. dimidiam, semi. maluæ & cydoniorum, tragacanthæ ana drachm. tres, adianti albi drach. sex, rizophæ, myza ana triginta, uuarum passarum purgatarū drach. duodecim: ficus siccas, dactylos pingues ana decem, penidiorum alborum lib. duas: fiat syrupus.

In lib. aquæ sex calidas iniice hordeum hora post dimidia radices si dantur recentes, elignatas tamen & cōcisas, horæ quarta parte post, fructus omnes, mox semina, & tragacantham linteo raro ligata, filo lōgo,
post

postremò adiantum, penidia vt prius.

Ibidem.

Syr. praßij, recipit praßij unc. duas, hyßopi, adianti albi, ana drach. sex, glycyrrhiæ, unc. unam, calaminthes, anisi, radicum apij, fœniculi ana drach. quinque, ireos, semi. malue & fœnigræci ana drach. tres semi. lini & cydoniorum ana drach. duas, uuarum passarum purgatarum unc. quinque, ficus passas pingues quindecim, penidiarum mellis boni despumati ana lib. duas.

In aquæ libris octo radices primum, deinde anisum, vuæ, ficus, post prassium, hyssopum, calaminthe postremò adiantum coquantur ad dimidias, horis sex macerentur, recalfiant, exprimantur, cum penidiis & saccharo clarificentur, colentur, percoquantur in syr. interea identidem in id colatum, & si vis expressum immerso & confricato nodulo semina maluæ, lini, fœnigræci, cydoniorum continente.

Ibidem.

Syrupus intybi recipit succi intybi una seruatione, deinde residentia purgati lib. octo, affunde paulatim, saccharo, si impurum est clarificato. Si uerò minus est purum, succo dissolutum coquatur, cum albuminibus purgetur, coletur, percoquatur in syrupum, nam hic succus prompte corrumpitur, cum succus limonum, granatorum, cydoniorum, etiam per se seruari possint, & mul

tò magis parum costì cum saccharo.

Intybum accipe cicorium syluestre non lactucam syuestrem vulgi endiuia seu intybum. Ne sit opus prætereà syr. duobus de cichorio simplici, & de endiuia simplici. Quod si in aliquibus scripturis intybus & cichorium requirantur, vel ipsum auge, vel satium & erraticum, angustifolium, aut latifolium, vel alias cichorii species misce.

Syr. arthemisiae Matthæi Gradi in cap. de mē sibus ciendis lib. 9. ad Almanforem, recipit arthemisiae manipulos duos, pulegij, calaminthes, origani, melissophyli, persicariae, sabinae, sampsuchi, chamædryos, hyperici, chamæpitjos, matricariae cum flore, centaurij parui, rutæ, bethonicae, buglossi.

Radicum fœniculi, apij, petroselini, asparagi, rusci, saxifragiae, enule, dictamni, cyperi, rubiae, iridis, paeoniae ana manipulum unum.

Seminis iuniperi, libystici, petroselini, apij, anisi, melanthij, carpobalsami, costi, asari, pyrethri, cassiae lignae, cardamomi, calami aromatici, pbu, ana unc. semissem. Quassata infundantur aquae fluuiali sufficienti horās 24. post coque ad aquae dimidia consumptionem. Tunc aufer igni, dū aqua tepuerit, frica manibus omnia &

Et cola expressum percoque in syrupū cum mel-
lis & sacchari quantitate sufficienti. Additur
interdum acetum acerrimum, uel scillites lar-
gius, partius pro scopis uarijs, aromatizatur cin-
namomo & spica.

*Alius sim-
plicioris
est in usu.*

In aquæ libras octo coque primum radi-
ces nostrates, deinde semina, post herbas,
postremò pyrethrum, & aromata. Co-
ctum, asarum, cassiam, cardamomum, ca-
lamum aromaticum, phu ubi libræ qua-
tuor supererunt, fiat ut in cæteris, & cum sac-
chari & mellis ana libravna, & dimidia per-
coquatur, ut sit efficacius, quanuis plurima
multum amara recipiat, pauco melle & sac-
charo dulcoratur, persicariam astringentem
& frigidam, quæ maculato est folio nonnul-
li miscent: ego autem acrem & non macula-
tam vsurpandam censeo, ut acria & menses
mouentia sint omnia nulla temperantia.

*Idem ple-
risque fit
simplex a-
blato rha
barbaro.*

Syr. cichorij ex Gulielmo Placentino, recipie
cichorij manipulos duos.

Foliorum buglosi utriusque, lactuca, cicho-
rij bortenensis, oxalydis, uiolæ nigrae, sereneos tri-
caricæ ana manipulum unum, rha barbari drach-
mas duas.

Herbæ trite coquantur in lib. duabus, aque
ad partis terciæ consumptionem, colentur. Adde

exp

expresso saccharo libras duas, clarificetur, & iterum coletur, reddatur igni, adde rha barbarum pulueratum panno lineo ligatum, & saepe confrica, donec syrupus erit percoctus.

Syr. cichorij aliter ex Nicolao Florentino, recipit iuybi satini & erratici ana manipulos duos cucurbitæ, lichenis, lactuca sylvestris, & sativæ, fumariæ, lupulorum, ana manipuli unum, bordei integri, haliacabi ana unc. quatuor, glycyrrhizæ, adiatii albi & nigri, & vulgaris, asplenij cassuthæ, ana drach. sex, radicum saniculi, apij, asparagi, ana unc. duas, coque in aqua sufficienti, cola, cum saccharo clarificatum & rursus colatum percoque in syrupum confricando in eius libris singulis rha barbari, drach. quatuor, panno raro ligatis cum spice nardi scrupulis quatuor. Dantur uncia tres cum emulsione seminum quatuor frigidorum maiorum.

Hi duo syrapi hepatis obstructionibus, & intemperaturæ calidæ destinati, quia nominibus Barbaris & nemini intellectis constant, pelagus opinionum pepererunt. Nā endivia sylvestris & domestica, taraxacon, batissosere, scariola, cichorium, quid apud hos sit Barbaros nunquam possis ex ipsorum scriptis didicisse tam sunt ea plena crassa ignorantia. Propterea mihi videtur satius
cum

cum cichorii seu feridis genus omne eadem sit facultate, cichorium autē quod sylvestre est stomacho vtilius & efficacius sit, vt syrupus hic ex solo fiat cichorio, aut cichorii succo, sed largiore, vt sit simplicissimus, cui si ad pompam voles alias feridis species miscere, & lactucam satiuam & agrestem, & sohelum vtrunque, & hieracium vtrunque, & chondrillam luteam, ac ceruleam, & si quid aliud tam satiuum quā agreste lacteū est, ac cichorii generis, nihil repugno, modo tā nō sis anxius in harum vocum Barbaris cum re corruptarum inquisitione. Assuesce igitur vocibus Dioscoridis, nec te afflicta desiderio barbararum vocum, quæ quid significant ne ipsi quidem qui hos syropos scripserunt, nec ipsorum alius quisquam vnquam pernoui, aut certō definiuit.

Endiua (quod nomen ex intybo corrupterunt) Barbaris est quæ lactuca sylvestris Dioscoridis videtur. Thuscis autem vulgō endiua est intybus, seu seris, lato folio: scariola verō ex feride etiam deprauatum est, intybus est satiuus angustifolium.

Taraxacon seu altaracon, etiam Gatina-riæ aut cichorium est, aut dens leontis seu cichorium erraticum, latifolium Plinio dictum. Batissoferis Hermolao corruptum videtur ex baptifecula, quæ illi cyanus est, rub

ribus sic dicta quod seculam, id est, falcem
messoria remoretur. alii malunt baptisose-
rim esse ferim, id est, cichoriū quoddam er-
raticum: in tritico frequens store cyanum re-
ferente, quibus magis accedo.

SECTIO TERTIA DE

Elegmatibus.

ELEGMATVM seu lintuum materiæ
ferè sunt Mesuæ partes plantarum. Ra *Lohoc.*
dices, ut glycyrrhizæ, scillæ, iridis, bryoniæ:
allii, ari, dracontii, cānæ vstæ, quod spodiū
Arabibus dicitur.

Herbæ, hyssopus, prassium, adiantum al-
bum, calaminthæ, brassicæ. Flos croci. Fru-
ctus, vuæ passæ, ficus passæ, dactyli, myxæ,
zizypha, capita papaveris albi.

Succi radicum glycyrrhizæ, scillæ.

Succi herbarum, brassicæ, prassii, fœnicu-
li, cannarum sacchari id est, saccharum, & ex
hoc penidia, mel.

Succi fructuum, mororum, batinorū, nu-
cum, myrtarum, pulpa calsiæ, sapa.

Gummi, tragacanthi, arabicum, myrrha.

Semina, papaveris albi, & inde syrupus,
psylli, cydoniorum, maluæ, melonum, cucu-
meris, citreoli, amygdalæ dulces, amaræ,
strobili, auellanae, lactucæ, portulacæ, lini,
fœnigræci, fœniculi, anisi, nasturcii, amyli,
farina fabarum.

cydoniorum, psyllii.

Huius verò tempestatis elegmatum materię, magis sunt penidia, pilulę albę, bechicę, electarium, vel pulueris E. diatraga- cāthi fri. diairis simplicis, & Salomonis dia- calaminthes, dia hyssopi, diaprasii, saccha- rum cādefactum, succus glycyrrhizę, cassia, cum syr. adianti, glycyrrhizę, zizyphorum, vel alio thoracico magis & minus calido, tergente incidente, pro medici indicationi- bus. Quibus misceri possunt etiā alia sim- plicia prius dicta dulcia, amara, acria.

Tamen ex veterū elegmatis hodie qui- dam retinēt elegma sanū, ex pulmone vul- pis, diacodiō, diamorō, diacariō. De quibus quia est abundē nobis dictum sectione ter- tia Mesuę, frustra hic repetenda nō fuerūt.

Sunt etiam qui compositum hoc medica- mētū elegina cassię pro enematibus vocāt, & sic parant. In libra vna decocti violarum, mālūx mercurialis, betę parietarię, absyn- thii coquunt mellis lib. dimidiam, & sub fi- nem iniiciunt pulpę cassię fistulę purgatę libram vnā.

SECTIO QVARTA.

SECTIO quarta de apozomatibus, & infusis est: quia tamen horum nullum hodie in vsu est, satius fuerit si quem vten- di cupiditas cœperit, Mesuę consulere.

Quæ autem infusa & apozemata in rem præsentem, hodie facimus, longè sunt ab illis diuersa, & tam paratufacilia, vt vel pueris perspicua sint. Quapropter de his supersedere malui quàm parum necessaria, etiam intelligentibus inculcare, præsertim cum statuerimus aliquândo dare typographis commentarium quendam nostrum de remediis medicis omnibus sumendis & admouendis: inter quem multa congerimus exempla apozematum, & infusorum hac ætate consuetorum, quæ ad medicum magis quàm ad pharmacopœum pertinent.

SECTIO QUINTA.

SECTIO quinta de antidotis seu electis. Riis quorum materiæ ex omni medicamentorum simplicium genere petuntur. Hæc formis quatuor præcipue parantur, sicca seu puluere, melle excepta, vel saccharo, vel alio humore.

Quoniam verò puluis horum est materia reliquarum trium formarum de puluere prius mihi fusius dicendum, quoniam hic vario fit modo, vt mox audies.

Vt autem planius intelligas, pauca quædam capita ex tritura ratione mihi sunt leuiter perstringenda, ne in compositionibus singulis hæc sint inculcanda.

Teruntur primùm radices acori, cyperi,
cof

costi,phu,gentianæ,glycyrrhizæ,mei,zingiberis,& similia,& interdum coquuntur, si electarium præsertim molle est futurum, sed ante leuiter fractæ.

His mediocriter tritis semina fœniculi, apii, petroselini, anisi, dauci, ameos, seseleos, amomi, cardamomi, & similia adduntur.

Semina autem cucumeris, cucurbitæ, melonis, citreoli, cnici, vt nuclei pinei, amygdalæ inciduntur cultello per se, aut etiam saccharo paucò, ne pinguescant adiecto.

Posteà herbæ siccæ, cassia, cinnamomū, aspalathum, calamus odoratus, caryophylla, spica nardi, schœnuanthos.

Postremò flores rosarum, croci, epitymii, forpicebus ante confecti.

Vuæ, dactyli & similes fructus, vel per se triti cernuntur impulsu manuum, aut cochlearis, vt cassia, thamar Indi: vel secti cum siccioribus teruntur.

Bdellium, opopanax, ammoniacum, opiū, myrrha, vino, melle, vel alio humore soluantur, vel parua portione cum aliis siccioribus multis teruntur minutim prius secta, sic os ordi cerui, rasura eboris. Turbith modice quassatum vbi erit in diaphœnico, electario Indo vtroque & similibus, tunc sicciora misceantur zingiber, piper & similia, vt puluerari possit. Nam per se latefcit non

pulueratur si sit legitimum. Quæ industria scammonio, opio, & liquoribus, gummis, resinis terendo lateſcentibus confert: vel piſtillo & mortario calfactis illa ſiccare: ſed id multum virium à medicamento dig-
gerit.

Terenda prætereà tenuiſſime calida cū vrinas mouere ſtudemus, vt thymum, aſarum, cuminum, vt in aurea, athanaſia, eſdra, hæmagogo, diacurcuma, dialacca maiori-
bus E. aromatico: cratiſius verò cum purga-
re ſtudemus, vt in antidoto hamech vtraq;,
in electario Indo maiore.

Per ſe teruntur rha barbarum, ſcammo-
nium, niſi quòd oleum amygdalarum dul-
cium vtriſque à quibuſdam miſcetur, & po-
ſtrema miſcentur ac è propinquo, & clemen-
ter ne euolent, aut exhalent. Seorſum quo-
que thus maſculum, myrrha, maſtiche, ſuc-
cinum, gummi Arabicum, tragacantha, mo-
ſchus, caphura, ambra: ſed hæc tria ferè cum
pauca aqua roſarum, & poſtrema miſcentur
etià è propinquo, qua ratione rha barba-
rum, & ſcammonium. Priora autem minu-
tim ſecta in mortarium ſiccius poſtulant, vt
euphorbium, ſtyrax calamites, ſal gemma,
ſericum, anacardi etià per ſe terantur.

Vniones, corallium vtrumque, lapidum
pretioſorum fragmenta in mortario lapi-
deo

deo vel areo primum crassius teruntur, postea super marmor, porphyrium, vel alium lapidem durissimum ducentur, friantur, affusa identidem pauca aqua rosarum, aut buglossi.

Lemnia terra, ut bolus armenia per se est friabilis, & humore aliquo soluta mox liquescit modo calcis.

Multa alia huc pertinentia ex modo componendi theriacem scripto nobis. lib. 4. methodi medicamenta componendi possunt huc transferri, quale est illud quod mortarium in quo prædicta omnia teruntur, & cætera alia præsertim præciosiora, est tegendum etiam duobus operculis, ne quod est tenuissimum exhalet ac euolet, eadem ratione quod iam est cretum curiosè inuoluatur. Si electariis succi, vel humida alia ascribuntur, tollenda sunt si hæc sicca & puluere seruaturus es pyxidibus vitreis, ut ferè hodie fit si verò electarium formare libet molle, sunt vsui quæ forma veteribus magis placuit, nam quæ hodie est electarii sicci, & solidi forma, minus est vsu frequens, nisi ad palati gratiam.

Si etiam dactylos, vuas, ficus recipit medicamentum, tollantur, si puluerem vis, nisi pauca cum magna siccorum copia puluerari

posse videantur, si autem electarium mole conaris purgentur, secentur, terantur, cernantur, & aliis misceantur.

Si pulvis ante electarii solidi compositionem amygdalas, strobilos, semina frigida maiora, & similia recipit. Hæc utendi & electarium parandi tempore misceantur, quia diebus rancida fiunt, & compositum vitiant.

Pulveris vnc. vna, vel etiam drach. sex, vni libræ sacchari ferè miscentur in electario solido: sunt qui parcius iniciunt, non ut grassius sit electarium, sed ut ipsis cõstet minoris, præsertim cum pretiosa recipit, ut electarium de gemmis, diambra exhilarans.

Pulveris verò vnc. 3. ferè traditur libræ vñi mellis despumati: sic tamen ut saccharum, penidia, dactyli, amygdalæ, strobili, & similia. pulveris appellatione tunc non veniant. Mel tamé crudum quadriplum omnium puluerum miscet Mesues in antidoto diamoschu.

Cum verò pulveres miscentur, sit mel tepidum adeò, ut digitos admittat mel ipsum vel fundum sartaginis, quæ mortario vel alterius manibus firmata sit oportet, quando pulveres pistillo ligneo sunt commiscendi. Id quod etiam seruandum est, si electarium solidum es facturus, quod primum in offas mæxæ modo cogunt, deinde manibus & pistil-

lo ligneo super papyrum puram complanāt in flaminicæ placentæ figuram, mox cultello secant in bucellas, & tessellas, nunc rhomboides, nunc quadratas, nūc triangulas (quas lozengas vocant) nunc longiores digitorū formas quas ob id manus Christi vulgus vocat. Quibus prætereā pondus circumscribunt, vt drach. vnus vel plurium.

Porrò in antidotis mollibus, vt catholico, diapruno, antidoto, hamech cum cassia & thamar Indi, cum humore aliquo soluta cernuntur, thamar Indi ante per horam sunt macerandi quam cernantur, vtræque verò antequam soluatur, humor est pendendus, vt intelligas an cum eo pondus iustum thamar Indorum & cassia postquam creuisti, retinueris. Eodē modo in manna & aliis eiusdem generis, quod etiam in pilulis seruandū audies, dum lachrymas humore solutas cernes, aut colabis.

Antidotus diambra M. sue recipit cinnamomi, doronici, caryophyllorum, macis, nucis moschatae, solij, galangæ ana drach. tres spicæ nardi, cardamomi maioris, & minoris ana drach. unam, zingiberis drach. unam, & semissem, santali flauī, ligni aloës, piperis longi ana drach. duas, ambrae aureum unum, moschi drach. dimidiam. Ani. de geminis Mesue recipit fragmen-

torum saphyri, hyacinthi, sardinis, granatorum,
 smaragdi ana drach. unam & semissem, zedoar-
 rie, doronici, macis, corticis citri, sem. ocyini ca-
 ryophyllati, ana drach. duas, corallij rubri. succi
 ni, limaturæ eboris ana script. duo been albi &
 rubri, caryophyllorum, zingiberis, piperis lon-
 gi, spicæ, folij, croci, cardamomi minoris ana
 drach. unam, trocischorij, diarbodon, ligni aloës,
 ana drach. quinque, cinnamomi, galangæ, zutun-
 bet ana drach. unam & semissem, foliorum ar-
 genti & auri ana aureum dimidium, moschi bo-
 ni drach. semissem, ambre drach. duas.

Ambra moschus per se terantur, corallij
 & pretiosi lapides, aut per se singuli, aut o-
 mnes simul quo dixi modo, cætera simul te-
 renda, sed ordine seruato.

Ant. exbilarans Galeno ascripta recipit à
 pud Nicolaum, succi pomorum dulcium & odori-
 ferorum. succi cydomorum, succi florum borragi-
 nis, *florum basilici.

*seminis
 alij.

Vini ueteris

Croci, macis, zedoaris.

Xylobalсами, caryophyllorum.

Corticis citri, galangæ.

Nucis moschatae, styracis cala-
 mitæ.

} ana drach.
 } quinque.

Caphura, ambræ, moschi ana drac. unā, anisi, thymi, pithymi, rasuræ eboris ana drach. duas, margaritarum, ossis à corde cerui ana drach. unam. auri & argenti puri ana scrip. unum, sacchari quantum sufficit.

Antidotum hanc non esse Galeni plane conuincunt macis, zedoaria, caryophylla, galanga, moscho cariō, caphura, ambræ, moschus, simplicia Galeno ignorata, & ebur, margaritæ. os à corde cerui, aurum, argentum, saccharum, sumi nondum cœpta Galeni seculo, aut saltem infrequentia. Saccharū cum succis coquendum, cui percocto & refrigerato pulueres miscendi sunt.

Sacch. lib. 7. in aqua dissolutæ & coctæ, additis ad postremum his succis coquantur quantum satis est ad comprehendēdas vncias circiter septem huius pulueris. Electarium lætificans Nicolai Alexādrini ab hoc est diuersissimum.

Hi pulueres tres antidotorum præcipuè nobis sunt in vsu, quamuis Mesue & Nicolao humore aliquo excipiantur in electariū molle, vt nobis tempore vtendi in electarium solidum saccharo per humorem idoneum, sed paucum soluto percocto, vt pulueris vnc. vna habeat sacch. vnc. 12. vel pul. horum iuribus & cōdimentis miscetur.

Præter hos autem alii, quia usu rari à nobis consultò prætermittuntur, præsertim ea fusi-
us in Mesue & Nicolao interpretatis, unde poterit pharmacopœus corrogare, si quâ-
do parare imperetur. Tales sunt antido-
tus diacalaminthæ, diatrion pipereon, dio-
spoliticum, diahyssopum, diasennæ, diaco-
stum, diairis Salomonis, diapenidion, diaco-
meron, diatragacanthū calidum, diamarga-
riton calidum, alia eius generis permulta.

Ponderi-
bus uariat
Nicolau
Alexā dri
nus, ex quo
Salernita
nus scri-

Nunc de antidotis dicendum quæ ob id
opiata vocantur, quod harum multæ opium
recipiunt, quibus aliæ consistentia similes
nomen idem vulgo sunt sortitæ.

psit, nec Antidotum catholicum Nicolai, Galeno a-
Galeni me scriptum, recipi folliculorum sennæ, castæ fistu-
minit. le purgatæ, thamar Indorum ana unc. octo, rha-
*recentes barbari, uiolarum, polypodij, anisi ana unc. qua-
à quo tan- tuor, glycyrrhizæ, rasæ, penidiorum, sacchari can-
tum humi de facti ana drac. quatuor, seminum quatuor fri-
ditas ex- gidorum, purgatorum ana unciam unam. Poly-
cremento- podij* alterius lib. unam, tritam, in aqua coque
sa exhala diu, colatum percoque in syrupum cum libris octo
rit aque sacchari. Castā & thamar Indos in colati parte
libris 12. dissolue, cola, syrupo iam percocto adde, postre-
ad lib. 4. mo pulueres adijce.

cōsumptio Senna, polypodiū, glycyrrhiza, anisum,
nem. violæ simul terantur, rha barbarum per se

*se

* Nihil tamen tenuiss. quia purgatorium est medicamentum

non ureti-
cum.

* semina. 4. frigida maiora excorticata scal-
pello minutim concidantur cum saccharo
& penidiis. ne pinguescant. Cassia & si re-
centes sunt thamar Indi per se cernantur po-
tius, quàm cum decocti portione solvantur,
ne sint ad accepti humoris consumptionem
coquenda. * Vbi ex decocto polypodii sy-
rupus erit percoctus, & ab igne depositus,
iam modicè refrixerit, cassia & thamar In-
di creta parte syrupi dissoluantur, mox sy-
rupo misceantur. postea pulvis prædictorū,
postremò rha barbarum & concisa semina
paulatim addantur pistillo ligneo probè
permiscendo. Si verò cassiam & thamar In-
dos decocti portione, vt vnc. duabus solue-
ris & colaris, probè percocto ipsi syrupo mi-
sceantur, vt coctione acceptum humorem
deponant. Hodie sunt qui delicatius, & effi-
cacius componunt, sed sumptuosius, sennæ
enim vnc. sexdecim in libris quatuor, rha
barbari vnc. octo, in libra dimidia decoctis
radicis polypodii infundunt, senne expres-
sum cum sacch. coquunt in electarii prope
consistentiam, expressum rha barbari mi-
scent paulatim extra ignem, deinde cassiam
thamar Indos creta & pulueres,

* Si uerò
thamar In-
di decocto
soluuntur
& cernun-
tur, id pen-
dendum, ut
intelligas
si cretorū
thamar In-
dos pon-
tus quasi-
tu habes.
Diadama
scenon dici-
tur Nico-
lao Alexā
drino & ui-
ridia da-
mascena
eligit.

Diaprunum simplex Nicolai recipit pruna

Da

Damascena matura centum. Hæc aqua ad dissolutionem percocta ubi modicè refrixerunt, exempta inde & manibus confricata per cribrum cernuntur, cortices & ossa abijciuntur. Aqua

* & cola- hæc cum dimidia uncia uiolarum recocta * cum
ta. sacchari libris duabus in syrupum percoquitur.

Vel potius addendo pulpæ prunorum prædictæ libram unā.

si potes si- Hæc ubi coquendo crassescere incipient, cassiæ
ne humore recenter extractæ, thamar Indorum ana uncia

cernendo una in portione parua prædictæ aquæ dissolua-

purgetur, tur, coletur, admisceatur, semper spathula mo-

ut in catho uendo, dum perfectè omnia hæc erunt cocta, au-

lico dixi. fer igni & adde spathula semper miscendo pul-

uerem sequentem santali albi, & rubri, spodiæ,

rha barbari ana drach. tres: rosarum, uiolarum,

seminis portulacæ, intybi, oxyacanthæ, succi gly-

cyrrbizæ, tragacanthi ana drach. duas: quatuor

seminum frigidorum maiorum purgatorum

ana drachnam unam. Si uerò purgatorium

uis medicamentum ab igne uti abstuleris, adde

scammonij præparati unc. dimidiam in libris

singulas.

Nicolaus
alexandri.
scammonij
drach. 7.

in lib. sin-
gulas mi-
scet.

Sunt qui scammonii drach. sex, alii vn-

ciam vnā miscent libris singulis, sicque ne-

scientibus medicis imponūt, fit enim, vt me-

dicamentum valentius purget, quod tamen

clementius existimabat in medicis instituisse.

An

*Ant. diaphanicon Mesue recipit phænicon
cirrbon, id est dactylorum fuluorum aceto per
triduum maceratorum partes centum, peni-
diorum cum aqua hordei coctorum partes
quadraginta, turbiti partes triginta quin-
que, amygdalarum purgatarum partes tri-
ginta, scammoni partes duodecim: Zin-
giberis, piperis longi, cinnamomi, macis, ga-
langæ, ligni aloës, foliorum rutæ siccorum,
anisi, fœniculi, dauci ana partes duas & semis-
sem. Probe trita hæc omnia melle despumato
excipiantur.*

Lib. tribus

Dactyli intus & foris purgati quo sunt,*nam lar
sicciores, eò diutius & largiore aceto sunt gius antè
macerandi, quo recentiores & humidiores, trituram
minus diu & parciore aceto macerentur. effunden-
Quin si præhumidi sunt citra maceratione dum facul
teri possunt aceto paucio interim affuso: fe tatis dacty
re autem nobis sunt passi, purgati igitur, & lorum ali
particulatim secti aceto parciore* sine igni quid secum
macerentur, triduo in vase siliceo, vel vitria trahit.
to tecto, pistillo ligneo in mortario lapi-
deo curiosè terantur, manu cernantur per
cribrum setaceum, vel stamen, vel reliquæ
pelliculæ eximantur. Potes cum his amy-
gdalas depellatas terere & cernere, aut cul-
tello minutim concidere, uti & nucleos pi-
neos (quos nonnulli penidiorum loco adhibet)
sed

sed cum culpa dactylorum ad acetum consumptionem sit parum coquenda amygdalæ pinguescerent, ob id melius inciduntur & cum puluere reliquo miscentur. Mellis lib. sex aqua dupla despumata dum aqua consumpta ad libras tres* redierint, & cydoniati liquidi consistentiam habeant, dactylos misce, parum diu coque, ut acetum exhalet. Quidam saccharo excipiunt in electarium solidum, ut & diacnicum bene tamen coquantur, & loco sicciore reponatur, ne rancidum fiat. Nicolai Alexandrini diaphœnicon carniū dactylorum drac. centum recipit, cætera multum ab hoc diuersum est.

* sunt enim pulueris uncia nouem si drac. partem accipis.

Ant. hamech apud Mesuen, recipit myrobalanorum flauarum unc. quatuor, cepularum Indarum, rha barbariana drachmas duas, agarici, colocynthidos, polypodij querniana drac. sexdecim, absinthij, thymi, sennæ ana unc. unam uiolariū drach. quindecim, ephthymi unc. duas, anisi, rosarum, sceniculi ana drach. sex, succi sumariæ lib. unam, pruna numero sexaginta, uuarum purgatarum unc. sex, macera omnia sero lactis dies quinque in uase uitreato, oris angustis, obturatis.

Hodie me Post hos semel seruesac, cola, in colato dissolue lius expres cassiæ fistulæ purgatæ unc. quatuor, thamar Insusum cū sac dorum unc. quinque, mannæ unc. duas, frica macharo insynibus, uerum cola, colato adde sacchari lib.

una

unam & dimidiam, scammonij unc. unam & di-
 midiam, coque ad mellis crassitudinem, tunc pau-
 latim puluerem hunc insperge. Myrobalano-
 rum flauarum, cepularum Indarum ana unc. di-
 midiam, bellericarum, emblicarum, rha barba-
 ri, seminis fumariæ ana drach. tres, seminis ani-
 si, spicæ nardi, ana drach. duas.

rup. per co-
 quitur &
 refrigera-
 to miscen-
 tur cassia
 & thamar
 indi cretæ

Polypodium, senna, myrobalani, anisum
 crassiuscule terantur, agaricum raptim minua-
 tur, colocynthis, rosæ, thymus, epithymus,
 absynthium, minutè forpicibus incidantur, & scam-
 rha barbarum cultello: vel forcipe in taleo-
 las, pruna, vuae intus purgentur: violæ inte-
 græ, agaricū, rha barbarū, colocynthis cum
 cæteris: quinque dies macerentur succo fu-
 mariæ, residētia, & insolatu etiam post vnā
 feruefactionem purgato, & sero lactis cola-
 to quātum omnia tegat, vt libris tribus: sed
 agaricum, & colocynthidem nodulo ligare
 præstiterit. Sexto die id totum leuiter co-
 quatur, coletur mediocriter exprimendo.
 (Fortis enim expressio ex materia illa ma-
 cerando & coquendo velut putrefacta ter-
 reum quoque extrahet.) Colati portione
 idonea dissolutā cassiam & thamar Indos,
 alia portiuncula mannam cocto ex reliqua
 colati parte syrupo, cum sacchari lib. vna &
 dimidia misce minimum coque: his enim

cum parte
 decocti,
 postea pēst
 & scāmo-
 nium co-
 lum.

coctio longior, aut vehementior vires ad-
mit, quapropter ne omnino coquantur, qui-
dam sine humore purgatam cassiam, & tha-
mar Indos percocto & repenti syrupo mi-
scent, quo scilicet tempore adduntur pul-
ueres aliorum & scammonium coctum. Se-
rum sit lactis caprini recēs mulcti, & in rem
præsentem coagulati iminisso semine car-
dui beatæ Mariæ contracto. Eius feri lib.
sex semel feruefiant, albuminibus duobus
purgentur: vbi refrixerint, colentur: aut si
celerandum est, ter colabis etiam calidum.
Capræ autem nigræ, & ex cornis serum hîc
quidam expetunt, vt lacpræctici ad calculû
frangendum.

*Ant. benedicta Nicolai recipit turbith ele-
cti, sacchari ana drachm. decem, scammonij co-
cti, hermodiactylorum rosarum ana drachmas
quinque, caryophyllorum, spice nardi, zingiberis,
croci, fixi fragiæ, macropiperis, amomi, carda-
momi, seminis apij, salis gemmæ, galangæ, macis,
cari, fœniculi, sem. asparagi, rusci, lubospermi
ana drac. unam, mellis quantum sufficit.*

Turbith, scammonium, hermodiactylos
trita negligentius, vt purgent magis: reli-
qua tenuius, vt in corpus magis ferantur, ex
trituræ disciplina rectè quidā volunt. Tur-
bith, esulæ, sacchari ana drach. decem, scam-
mo

monii drachm. quinque, quædam exemplaria habent, cum esula in Nicolao Alexandrino taceatur, in eodem scribitur turbiti saccharique ana drach. viginti, scammonii drach. decem, sed reliquorum omnium ana drach. duæ, quæ pondera omnia dimidio diminuit Nicolaus Salernitanus, sunt qui etiam scammonii drach. duas, alii drach. duas & semissem miscent.

Hierapicra, id est *sacra amara Galeni*, recipit cinnamomi, mastiches, asari, spicæ nardi, xylobalsami, croci ana drach. sex: aloës drach. centum, mellis quantum sufficit.

Sic Galenus Romæ componi solitam suo tempore scribit: & aloën, nunc lotam, nunc illotam, nunc largiorem, nunc parciorem miscendam pro variis medicorum scopis: & croci sufficere drach. quinque. Plura de hac antidoto leges in *Melue*.

Ant. hiera diacolocynthidos Praetij recipit stachados, marrubij, chamædrysos, agarici, colocynthidos ana drachmas decem, opopanacis, sagapeni, petroselini, aristolochiæ rotundæ: piperis albi ana drachmas quinque, cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ, polij, croci, ana drac. quatuor. *Opopanax* & *sagapenum* mortario terantur adiecto melle tenui, id est quâ liquidissimo: trita cætera & cribrata melle ad comprehendendū sufficienti excipiuntur.

*Scribo-
nius lar-
gus.*

Quæ ad hanc hieram hodie celebrari cœptam magno mortalium commodo pertinent, fusissimè in Mesuè docuimus. Si puluerem & siccam hieram cupis, liquores fractos purgatos aliis particulatim iniectos, cum his puluerantur. Si autem vis electarium molle, liquidissimo melle dissoluti colantur.

Ant. Philonis recipit piperis albi, hyoscyami albi ana drach. uiginti, opij drach. decem, croci drach. quinque, spicæ, pyrethri, castorij ana drachmam unam, mellis despumati quadruplo omnium excipe. Addunt aliqui moschi scriptulum unum.

De philonio Romano & Persico lege Mesuen, mihi satis est hæc veterum descriptio. In hac antidoto pulueris vnciæ tres mellis libr. singulis miscentur, vt in aliis plurimis, à Philone Iudeo philosopho Platonico doctissimo, vt scribit Nicolaus Alexandrinus, dicta.

Ant. de baccis lauri Rasi recipit foliorum ruta siccorum drach. decem, seminis ameos, cumini, melanthij, ligustici, origani, cari, dauci, amygdalarum amararum, piperis nigri & longi, mentastri, acori baccharum lauri, castorij ana drach. duas, opopanax drachm. tres, sagapeni drachm. quatuor, mellis costi pondus omnium, tritis terendis fac electarium molle.

Hoc electarium pilularum consistentiam habebit ex tam paucō melle, nisi sagapenū & opopanax alio melle liquidissimo dissoluantur & colentur, vt in hiera diacolocynthidos. Hodie mel pulueribus quadruplum miscent, sed puluerum nomine opopanaxem & sagapenum non censent, sic est gratius, sed imbecillius.

E. diacnicū Arnaldi uillanouani recipit pul. Diacar.
E. diatragacanthi frigidi unc. semissem, carnium thami.
cydoniorum unc. unam, medullæ cnici, hermodactylorum ana drachmas quatuor, Zingiberis albi drachmas duas, scammonij cocti drachmas tres, turbiti albi drach. sex, mannae, granatæ drach. duas, mellis rosati colati unc. unā, sacchari unc. octo cum saccharo sufficienti fiat electarium.

Caro cydoniorum siue cydonia in partes. 4. plures pauciores diuisa, & vt sunt integra saccharo condita terantur, & per stamen colentur, cuius loco si cum nostratibus cydoniatum capias in drach. eius duabus vna erit sacchari, aut mellis drach. vel etiam largius. Tunc verò id vt manna melle rosato soluta colatur per stamen, semen cnici ex-corticatum, vel inciditur, vel cum saccharo teritur, & pulueri turbiti, hermodactylorum & zingib. simul tritorum miscetur,

scammonium verò per se. Vbi saccharum paulò vltra quàm electario conuenit est coctum, (quia liquida mox addenda ipsum vt sic dicam recrudabunt) adde cydoniũ, mannam, mel rosatum simul trita & colata. Sũt qui pul. diatragacanthi omittunt, & cydoniatum cum melle subactum immittunt in sacchari lib. vnã percoctam cum aquæ vnciis 4. vel sex, si impurius est saccharum, & ob id despumandum, postea pulueres reliquos. Alii aliter.

Elec. de succo rosarum Nicolai recipit sacchari, succi rosarum rubrarum perfectarum analib. unam uncias quatuor santalorum alborum & rubrorum & citreorum, ana drachmas sex, spodij drach. tres, scammonij cocti drach. duodecim, caphuræ script. unum, ad excipiendum, succus cum saccharo in syrupum percoquatur.

Cui misce santala & spodium puluerata, postremò scammonium & caphuram, vtrũque per se tritum.

Cum Mesuæ sit solenne vnciis singulis compositionum scammoniatarũ dare scammonii cocti circiter scriptulum vnum, hinc Nicolaus dat propemodum scriptula duo, ob id rectè quibusdam videtur scammonii drach. octo, huic composita sufficere, tamẽ etiã drach. duodecim scribit Nicolaus Ale-

xandrinus cap. 309. lib. de cōpositione medicamentorum secundum locos, ex quo Nicolaus Salernitanus & alter Nicolaus præpositus sua descripserunt. Succo partiori cōmodius fieret. Alii etiam componunt E. rosatum colagogum Mesuæ.

E. diarbodon abbatis Nicolai recipit, santali albi & rubri ana drachmas duas & semissem, tragacanthi, gummi arabici, spodij ana scriptula duo, asari, mastiches, spice nardi, cardamomi, succi glycyrrhizæ, croci, xylaloës, caryophyllorum, galliæ moschatæ, anisi, marathri, cinnamomi, rha barbari, seminis basilici, oxyacanthæ, cichorii, portulacæ, cucurbitæ, cucumeris, melonis, citreoli, ana scriptulum unum, margaritarum, ossis à corde cerui ana scriptulum dimidium, sacchari candefacti, rosarum ana unciam unam, drach. tres, caphuræ grana septem, moschi grana tria & dimidium, confice cum syrupo facto ex aqua rosarum.

Pulvis huius vt aliorū vitrea pyxide operculata seruetur, & vtēdi tempore excipitur syrupo rosato percocto. Vel sacchari delicti lib. vna dissoluitur, lib. dimidia aquæ ex rosis albis recentibus destillatæ, vel rosarū siccarū decocti, vel succi rosarū rubrarum recentū, & coquitur ad iustam crassitiem.

Vbi refrigerando iam multum concreuit, pulueris prædicti drach. sex iniiciuntur, raro plures: & curiosè pistillo ligneo, vt prædixi, miscentur: semina quia cito rancefcunt & cætera corrumpunt, misce tantum vten- di tempore. Moschum plerisque abomi- nabilem, & cephalagicum, ne misce, vti ne- que caphuram, nisi doctus est medicus qui imperet.

E. aromaticum rosatum Gabrielis apud Me- suen recipit rosarum rub. drachmas quatuorde- cim, glycyrrhizæ rasæ drachmas septem, ligni aloës, santali flui ana drach. tres, cinnamomi drachmas quinque, macis, caryophyllorum ana drachmas duas & semissem, gummi Arabici, tra- gacanthi ana drachmas duas, & partes duas drachmæ unius, nucis moschatæ, cardamomi ma- ioris, galangæ una drach. unam, spicæ nardi, am- bræ cineritiæ ana script. duo, moschi scriptulum unum, syrupi rosati quantum sufficit.

E. diamargariton frigidum recipit santalo- rum omnium florum uiolearum, seminis melonum excorticati, trocischorum diarbodon ana drach. duas, serici crudi ossis à corde cerui, spodij, doro- nici Romani, been albi & rubri, spicæ nardi, cro- ci ana scriptula duo, margaritarum integrarum & pertusarum, rasuræ eboris, saphyrorum, bya- cin

cinthorum, smaragdorum, iaspidium uiridium, ligni aloës, seminis intybi & oxalydis, ambre cineritie ana drachmam semissem, auri optimi drachmam unam, caphure scriptulum unum, moschi grana duo.

Aliter Nicolao, aliter aliis, sed hoc nobis est in usu frequentiore.

E. diatrion santalon Nicolai recipit, santali albi, rubri, flauī, rosarū, psylli ana solidos duos, rha barbari, spodi, succi glycyrrhizæ, seminis portulacæ, ana solidum unū & dimidium, amyli, gummi Arabici, tragacanthi, seminis melonis, citreoli, cucumeris, cucurbitæ, cichorii domestici ana solidum unum, caphure scriptulum unū & dimidium, syrupi rosati quantum sufficit, alij pondus rosarum quadruplum miscent.

Dimidium est descriptionis Nicolai Alexandrini, nisi quod saccharū habet pro psyllio, & cichorii domestici non meminit loco syrupi: fit cum saccharo in aqua cōmuni aut rosata soluto.

E. Diatragacanthon frigidum Nicolai recipit, tragacanthi albi unc. duas, gummi arabici unc. unam, drachmas duas, amyli unc. unam, penidiorum uncias tres, glycyrrhizæ, semini melonis, cucurbitæ, cucumeris, citreoli ana drachmas duas, caphure scriptuli semissem, syrupi uio-

rosatum, syrupus rosatus vel similis, interdum muccago tragacanthi, ita ut omnino sit glutinosum, quod pilulas debet comprehendere, ut melius velut in mazam misceantur, & mista cohæreant, ac ne simplicium facultas promptè exhalet, si offa siccitate interhiet, sed intus probè conclusa melius firmetur. Ob eā causam quas pilularum species aqua, aut succo vult comprehendere Mesues aut Nicolaus, hodie nos excipimus melle, in quo succus hic ad sui consumptionē sit percoctus. Quod succo cōprehensæ non cohærent, sed hordeacei, aut furfuracei panis modo promptè friantur, mox siccantur, & canescunt situmque ducunt putredinis indicē & autorem. Ob eam rem videtur Nicolaus pilulas sine quibus, fœniculi succo exceptas manibus oleo rosato, aut communi inunctis formari, & nos alutam, aut pergamenam offæ inuoluendæ debitam oleo quoque oblinimus.

Si tamen in usum præsentem fiant pilulæ, possunt succo excipi, quod in multis videntur scriptores innuisse, dum ciceris scilicet orobei, aut orobi, aut piperis magnitudine pilulas formandas imperant. Est tamen quando succi emplasticam efficiunt materiam, quando scilicet his emplastica alia solvantur, ut aloë, scammonium,

sag

sagapenum, ammoniacum, gummiarabicum, tragacantha. Tunc etiam pilularum massam recte comprehendere. Omnia in pilulis crassius terenda quam in electariis, nisi quod utrobique lapides pretiosi, & congeneria tenuissimè sunt pulueranda, & colocynthis, ne partes quas permeat vlceret.

Quæ verò lachrymæ, siue liquores suis, siue gumi, siue resinæ, si sunt adhuc molliculæ, pistillo calido, in mortario calido terentur & puluerabuntur, aut humore idoneo dissoluetur, ut alia capiant. De succis recentibus iam diximus, de siccatis seu sapis idè iudiciū quod de lachrymis, interdū tamē prædictæ lachrymæ, si puræ sunt, pistillo calido in mortario calido humore pauco superdato subiunguntur, fiuntq; idoneæ pulueribus aliis comprehendendis, ut in pilulis scetidis, sagapeni & similibus. Si autem sint impuræ, dissoluitur humore quæsito, colantur, coquuntur ad humoris consumptionem, pulueres tunc adduntur & permiscuntur.

Magdalia seu ossa, seu massa inuoluitur, ubi siccata est quantum satis est, aluta, alba, potius quam rubra, ut vires illas infectricū materiarum pilulæ in se non trahant, aut pergamena, sed utraque, oleo rosato, aut cōmuni est ante subigēda, ut massam diu mollem seruet & transpirare vires eius prohibea

beat, obstructis oleo emplastico poris, non tamen ita quin humiditas, si qua adhuc superest excrementosa digeratur. In vsum autem non veniant pilulae si potes, nisi iam fermentatae, non tamen vetustate exuccae, & exanimatae: sed nec ita molles, ut in ore diffuant, sed consistentia mediocri fiant, aut plures, pauciores, maiores, minores pro eius, qui sumit natura, & aliis medici scopis. Si autem deuorare nequit, minimae fiant, & syrupo aliquo inuolutae cochleari aliquo simul deuorentur. Alii ne ingratum earum saporem percipiant, syrupo remollitas saccharo tegunt, alii foliis auri aequius, quam nonnulli membrana prunorum, aut vuarum, aut cerato liquido. Nam carne prunorum, aut pomorum coctorum inuolui non magis prohibeo, quam pane missali in vinum merso. Os quoque ante & post ablui potest vino, aqua, alio, ut lingua hoc imbuta saporem tetrum non sentiat: & si quid ei haerit, tergeatur, potest etiam vini loco pomi buccellam mandere & succum deglutire, aut aliud aliquid iucundum praesertim astringens. Sunt quoque qui os vino vel alio implent, & pilulam ori immittunt, cum vino illo deuorandum, idque toties repetunt, donec omnes deuorarint: quod ad celeriores pilularum actionem facit, non ad diuturniorem, &

& ventriculum lædi pilularum præsertim durarum contactu vetat, & quibus friget venter confert, vt quibus is aut hepar insigniter calet, cum ptiffana, vel humore alio deuorari possunt, manus etiam ligare, & eas ac nares aceto, aut frigida aut oxycrato madefacere est vtile. Quæ præcepta sunt communia etiã his qui medicamenta alia quauis forma sumplerint, quando vomitus eorum timetur, Et præter hæc alia multa doctè à Mesue descripta libro primò.

Pilule aureæ Nicolai recipiunt aloës, scāmōniis cocti ana drach. quinque, rosarii, seminis apij ana drachmas duas, et semissem, anisi, fœniculi, mastiches ana drach. unam, et semissem, croci, pulpæ colocynthis ana drachmam unam, cum aqua infusionis tragacanthi fac massam.

Tragacanthi drach. vna aquæ vnc. duabus maceretur ad dissolutionem super cineres calidos coletur panno raro: hac muceagine paulatim affusa cōprehende pulueres, hodie tamē syrupo vel melle rosato cōprehendūt omīssa tragacantha, neq; mea sentētia in foeliciter aloë, scāmōniū, colocynthis, mastiche seorsum quo sæpe dixi modo terētur, simul autem semina, rosæ, crocus, ambo hæc prius minutim concisa dimidium est compositionis Nicolai Alexandrini, in quo etiã
ma

mastiche non scribitur.

Pilule coctiæ Rasii & Mesuæ recipiunt, pulueris hieræ picræ Galeni drach. decem, colocynthidis drachmas tres, & scriptulum unum, scammonij drach. duas & semissem, turbith, stæchados ana drach. quinque.

Syrupo vel melle rosato excipe, turbith, & stæchas simul teruntur, cernantur. Nam stæchas ægre teritur licet florulenta sit, nisi inter papyros siccetur, antè, quomodo etiã vis eius facilè exhalat.

Alij ex Nicolao Galeni coctia sic parant, pil. Gal. aloës, absynthij, colocynthidos, scammonij ana ex aloë li. partem unam, mastiches partem dimidiam, cum I. c. pb. p. succo fœniculi uel absynthij, uel solani, forma massam.

Nicolaus Alexandrinus Galeni non meminit, & vocat pilulas diacolocynthidos, hisque miscet aloës, scammonij cocti ana drachmas quatuor, colocynthidos, mastiches ana drachmas duas, bdellii drachmã vnã cum succo absynthii fac orobea catapotia.

Pilule sine quibus esse nullo apud Nicolaũ recipiunt, aloës lotæ drachmas quatuordecim, mirobalanorum, flauarũ, & pularum, bellericarii, emblicarũ, Indarũ, rha barbari, mastiches, absynthij, rosarum, uulgarum, sennæ, agarici, cassiuhæ ana drach. unã. Tẽperentur scammonij bene tritæ &

pu

pulueratæ drachmæ sex & dimidia succo fœniculi, quantus scammonio per pannum colando, & pulueribus alijs ad pilulas comprehendendas sufficere uidebitur, quæ manibus unctis oleo uiolato uel communi, sed arte dicta loto formentur.

Senna myrobalani, absynthium, rosæ, violæ, casuptha simul: rha barbarum, aloë, scammonium, mastiche per se puluerentur, licet autem succo fœniculi purgato parua coctione & residentia, in quo dissolutum sit scammonium comprehendendi possint, tamen ferè scammonium per se tritum & cretum alijs pulueribus miscent, omnesque simul mistos excipiunt melle, cum quo succus fœniculi coquendo sit consumptus.

Succus ab
synthij sic-
catus ho-
die nõ ser-
uatur, i-
gne tamen
in rē præ-
sentē sicce-
tur.

Pilulæ rha barbari Mesuæ, recipiunt rha barbari drachmas tres, succi glycyrrhiæ, succi absynthij, mastiches ana drachmam unam, myrobalanorum flauarum drachmas duas & semissem, seminis apiij, fœniculi ana drachmam semissem, trocischorum diarhodon drachmas tres & semissem, biære pieræ drachmas decem, forma cum aqua fœniculi.

Schi ex Succo fœniculi, hîc ut in alijs cum melle Mesu. se- coquendo est consumendus, myrobalani, etioe 7 re succi concisi simul terenda, rha barbarum, petendi. mastiche, trocisci per se.

Pilule aromaticæ Mesuæ, recipiunt cinna- Elephāgi-
 momi, cubebæ, ligni aloë, calami aromatici, ma næ aqua
 cæ, nucis moschata, cardamomi, caryophyllorum, sextupla.
 asari, mastiches, schænu.ithi, spicæ, carpobalsami Mesuæ in
 ana ucciam unam, absynthij sicci rosarum ana aloë.
 drachmas quinque, trita crassius coque ex aquæ * Aloës
 libris duodecim ad partium duarum cōsumptio- unc. sex
 nem, frica, cola, exprime. Expressi huius libris seu seli-
 duabus macera libram unam aloës, prius aqua bræ dat
 pluuiæ sepe lotam & siccata tribula, sicca. Illi ibidē ex-
 misce myrrhæ, mastiches ana drachmas quinque, pressi lib.
 croci drachmas * tres, omnia macera, reliquo unā, ergo
 expresso, tribula, sicca. aloës unc.

Siccatur aloë primū in vmbra, post in 12. seu lib.
 sole Mesuæ cap. de aloë. Hæc verò omnia, rectè dat
 vel seorsum quassanda, vel dura crassa cum expressi
 duris crassis, mollia tenuia cum mollibus te lib. 2. unc.
 nuibus, postea in aquā mittenda omnia hæc semissem.
 tantum confracta, vt promptius aqua per- Mes. ibi-
 meet, & vires ipsorum in se trahat, macerari dem.
 tur, igni lento coquuntur ex aquæ libris octo
 ad dimidias (nam tam larga aqua longā po-
 stulat coctionem, quæ his aromatibus vires
 aut minuit aut adimit) reliquarum quatuor
 librarū dimidium aloë primum per se ebi-
 bet, prius tamen aqua fontana lota & sicca-
 ta, reliquum dimidium cum puluere tenuis-
 simo myrrhæ, mastiches, croci semel aut po

tius paulatim cōbibet eadem aloë, & priusquam siccetur, massa fingatur, æstate potius fiant, quàm parte anni alia, vt pr̄optius siccetur aloë.

*Pilule lucis maiores Mesue, recipiunt rosarum, uiolarum absynthij, turbith, colocynthis, cubebarum, calami aromatici, nucis moschate, spice, epithymi, carpebalsami, xylbalsami, schœnuanthi, mastiches, asari, caryophyllorum, cinnamomi, cassie, croci, seminis rutæ, anisi, apij, fœniculi ana drach. duis, myrobalanorum quinque, rha barbari ana drachm. quatuor, agarici, semina ana drach. quinque, *euphrasie drach. septem, aloës bonæ pondus omnium, excipe succo fœniculi.*

* Surculi summi cū floribus siccati.

Colocynthis, agaricū, aloë, mastiche per se terantur cætera simul misce omnia & cōprehende melle cocto, cum succo fœniculi ad ipsius cōsumptionem, seu donec mel valde glutinosum euaserit.

*Pilule fatidæ maiores Mesue recipiunt sagapeni, ammoniaci, opopanax, bdellij, colocynthis, *rutæ agrestis, aloës, epithymi ana drachmas quinque, hermodactylorū, esule ana drachmas duis scammonij drachmas tres, cinnamomi, spice croci, castorij ana drachmam unam, turbith drachmas quatuor, zingiberis drachmam unam & semissem, euphorbij drach. unius partes du*

* Eius par-
nuria hor-
tēsem sub-
stituimus
siccam.

duas, dissolue lachrymas succo porri, & colato Mesues. comprehende omnia.

Liquores quatuor primi succo porri calfacto dissoluti & colati, coquuntur ad consumptionem multi succi, deinde cætera mista comprehendunt. Scamoniū tñ & euphorbiū liquores per se puluerantur, nisi recentia sunt, & mollia: talia enim etiam dissolui possunt.

Pilule de hermodactylis maiores, recipiunt hermodactylorum, aloës, turbit, colocynthidos, myrobalanorum flauarum, bdellij mollis, sagapeni ana drachmas sex, opopanax, euphorbij, sarcocollæ, castorij, rutæ agrestis, apij ana drachmas tres, croci drachmas duas & semissem, comprehende succo brassicæ.

Melle cui incoctus sit hic succus, excipiuntur omnia hæc puluerata: nam etiam puluerari possunt hi liquores pauci & sicciores cum multis fideis: vel potius ut prius, liquores hi succo brassicæ calfacto soluti, colati, recocti omnia alia comprehendant.

Pilule arthriticæ Nicolao recipiunt hermodactylorum, turbit, agarici ana drachm. quatuor, *Vulgaris cinnamomi, cassiæ lignæ, spicæ, caryophyllorū, xylobalsami, carpobalsami, zingiberis, mastiches, farniculi. Seminis in li, seminis lubospermi, seminis asparagi, rusci, ro bacca eius sarū, salis gemmæ ana drach. semissem, aloës pon rubra condus omnium, comprehende succo farniculi. diu.

Succus in melle coquendo consumitur, quo melle vires succi adepto cætera excipiuntur, pilulas ex semine cucumeris agrestis & alexandrinæ podagricis & arthriticis vtilis scribit Nicolaus Alexandrinus, hanc verò descriptionem non habet.

Pilulæ fumarie Auicennæ recipiunt myrobalanorum flauarum, cepularum nigrarum, scammonij ana drachmas quinque, aloës drach. septē, omnia ter imbuantur succo fumarie, & toties siccantur, postremò fac massam.

Imbui debent succo fumarie non excipi, sed in melle cui succus hic incoctus fuerit, multò facilius ob myrobalanorum siccitatem, sole siccantur quàm aromaticæ.

Pilulæ asseieret Auicennæ recipiunt pulueris hieræ picræ unciam unam, mastiches, myrobalanorum citrearum ana unc. semissem, aloës unc. duas, cum syrupo stæchados, forma offam.

Hic syrupus aut cæteris ob lentorem idoneus est his pulueribus comprehendendis & seruandis à situ ac putredine.

Iris Illyrica aut florenina.

Pilulæ ex agarico Mesuæ recipiunt agarici drachmas tres, radicis ireos, prassij, myrrhæ ana drachmam unā, turbiti drachmas quinque, hieræ picræ drachmas quatuor, colocynthidos, sarcocollæ ana drachmas duas, excipe sapa.

Vinū ad dimidias aut tertias coctum, id est sapa crassitie & lentore est idoneum his cōprehendendis, & à putredine ac transpiratione in aërem vindicandis.

Pilule ex hiera recipiunt, pulueris hieræ picræ Galeni unciam unam, cum melle rosato, fac massam.

Similiter ex omnibus hieris & antidotis aliis fieri possunt massæ pilularum, sed melle opus est tanto parciore ad pilulas quàm ad electaria, quanto pilulas electariis esse oportet duriores.

Pilule mastichinæ consiliatoris recipiunt mastiches drachmas quatuor, aloës drachmas decē, agarici drach. tres, cum succo artemisiæ, finge massam.

Hæc tria seorsum trita mastichæ, si vis cum pauca aqua dulci, melle excipiuntur, cui succum arthemisiæ incoxeris.

Pilule stomachicæ Mesuæ recipiunt aloës drachmas sex, mastiches rosarum ana drachmas duas, syrupo rosato excipe. Pil. ante cibum.

Pilule rufæ, seu communes recipiunt croci, myrrhæ ana unciam unam, aloës uncias duas, cōprehende uino aromatico. Aloë æsta-
te, & sta-
tu pestilē-
ti lauāda.

Pilule bechicæ Mesuæ recipiunt succi glycyrrhizæ, sacchari ana aureos sex, amyli, tragacanthi, amygdalarum dulcium, ana aureos quatuor,

comprehende mucagine seminis psyllij, aut cydoniorum.

Possunt comprehendi mucagine tragacanthi, vt sequentes.

Pilulæ albæ fiunt ex sacchari libra vna, in vncia mucaginis tragacanthi soluta, & diu tribulata.

SECTIO SEPTIMA DE
trocischis.

QUID trociscus & cur hoc nomine, & aliis appellatus, abundè nobis dictum est sectione septima Mesuæ. Horum autem vel compositio hic fieri nō potest vt trocischorum theriacorum, vel vsus intercidit, vt iam paucissimi sint in officinis cōpositi. Quia verò componendi rationē habent pilulis finitimam (in ambobus enim pulueres humore aliquo excipiuntur) longo sermone mihi egere non videtur. Ob id paucis eos perstringam, quòd adhuc sunt vsu quotidiano, quibus verò aliorum erit necessitas. Mesuen & Nicolaum Alexandrinum consulant.

Trocischi de gallia moschata Mesuæ recipiunt ligni aloës crudi partes quinque, ambre partes tres, moschi partem unam, glutinis, tragacanthi, cum aqua rosata extracti, quantitatem illam comprehendere sufficientem: fiant tro-
cif

cischi magnitudine foliorum myrti, sigillentur, reponantur in uase uitreo, alij ambra oleo balanino in uase uitreo soluunt, & hoc oleo cetera comprehendunt.

Trocischi de gallia moschata Nicolai Alexandrini recipiunt mastiches uncias duas, gummi unciam unā, caphura scriptulum unum, quod trita molliſſimè, cum aqua rosarum formentur in trociscos, in umbra siccentur, terentur subtiliſſimè oleo iasmino, sambaceum uocant, incoquantur, adde cinnamomi, caryophylorum, nucis moschatæ, ana semiunciam, fac trociscos, illine moscho aqua rosarum soluta.

Deben & mustelinū uocant.

Malè in Nicolao, olei sambucini vncie quatuor & malè coquit ad dimidias, hodie mastiche trita super cineres calidos ex olei drach. vna soluitur, pul. gummi & caphuræ additur affusa pauca aqua rosarum.

Trocischi aliptæ moschatæ, recipiunt ladani Nicolai purissimi, unc. tres, styracis calamite unc. unam Alexandrini. & semissem, styracis rubri unciam unam, ligni aloës drachmas duas, ambre drachmā unam, caphuræ script. unum & dimidium, moschi script. dimidium, aquæ rosarum quantum sufficit.

Ladanum per se negligentem & crassius teratur, styrax vterq; simul parum teratur, & per cribrum rarū cernēdo purgetur: deinde tria hæc catino imposita solē æstiuo vel

sine hoc vase duplici liquetur potius, quam mortarii, aut pistilli caliditate vehementi, mox vt liquata sunt pistillo in mortario, sole vel igni probè siccatis, diu tundantur addendo paulatim puluerem ligni aloës. In mortario alio tere amygdalas aliquot oleo sas, easque vbi mortarium, & pistillum illeuerint, abiice: ibi tere primùm ambram, deinde caphuram, & moschum aqua rosarum pauca affusa, misce reliquis, & forma trociscos. Hæc parandi ratio propè tota ex eodem Nicolao est sumpta.

**assa fæti da.* Trocisci de myrrha Nicolai recipiunt myrrhæ, foliorū rutæ, mentastri, pulegiij ceruini, rubiæ, *opi Partici, sagapeni, opopanax, ana drachm. tres, lupinorū pertritorū, drach. quinq; fiāt trocisci cum succo rutæ ponderis drach. duarū.

Trocisci de agarico Mesue recipiunt agaricum electum pulueratum, qui cum uino cui infusum sit zingiber formatur in trociscos.

Trocisci de spodio recipiunt spodij drachm. quatuor rosarum rubrarum drach. septem, seminis portulacæ, succi glycyrrhiæ. ana drac. duos, mucagine seminis psyllij comprehendere in trociscos drach. unius.

Spodium arabū sit verum nō ebur vstū, ne autem accipe spodium Græcorum rem fornicariam pompholygi affinem nunquam
fu

sumendam: sed solùm adinouendam.

Trocischi de terra sigillata Mesue recipiūt ** in troc. Mes.*
 sanguinis dragonis, gūmi Arabic i assi, * ramich,
 rosarum, seminis rosarum, amyli assi, spodij, aca-
 ciæ, hypocisthidos, balaustij, boli armenie, terræ
 sigillatæ, id est sigilli Lemnij, corallij, unionum,
 succini, tragacanti, papaueris nigri ana drach.
 tres, & semissem, sem. portulacæ assi, cornu cerui
 usti, thuris, nucum cypressi, ana drach. duas, cum
 aqua arnoglossi fac trociscos.

Trocischi de succino Mesue recipiunt succi- *Diaele-*
 ni aureos sex, cornu cerui usti, gummi Arabici *tra seu di*
 assi, corallij usti, tragacanthæ, acaciæ, hypocisthi *acarabe.*
 dos, balaustij, mastiches, cancamini loti, papaueris
 nigri assi ana aureos duos, thuris, croci, opij ana
 aureum unum & semissem, fac trociscos cum
 muccagine seminis fsslij.

SECTIO OCTAVA DE pulueribus.

PULVERES initio antidotorum non
 nihil attigimus, vbi horū pulveres py-
 xidibus vitreis ferè seruari diximus, & inter-
 dum præsertim vtendi tempore in electa-
 rio solida formari. Sæpe etiam initio mel-
 le, vel alio excipi, seruari, coqui, ea suo calo-
 re natiuo, seu (vt cum vulgo dicam) fermenta-
 tari. De pulueribus aliis si quid es sollicitus:

ex Mesuæ sectione octaua repete, tantum addam pulueres condimentis destinatos.

Puluis minutarum specierum recipit zingiberis albi lib. vnam, piperis boni vnc. quatuor, nucis moschatae vnc. duas, caryophyllorum, granorum paradisi ana vnc. vnam, cinnamomi electi semiunciam fiat puluis.

Puluis albus recipit zingiberis albi & purgati lib. vnam fiat puluis. Puluis eximius finis vulgò dictus, recipit zingiberis albi semi libram, granorum paradisi vnc. duas, tritis his simul misce croci drach. duas, & acetum paulatim affunde, vt croci colorem induat, diu & multum tunde simul omnia.

Librae vni sacchari misce cinnamomi vnciam vnam, habes puluerem ducis.

SECTIO NONA

de oleis.

OLEI genera quatuor demonstraui-
mus in Mesue, quorum primum est
oleum ex oliuis maturis, aut immaturis ex-
pressum, quod oleum absolutè dicitur,
aut cum vulgo oleum commune. Alterum
est quod ex seminibus oleaginis expri-
mitur. Tertium quod vi ignis tollitur aut
descendit. Quartum quod oleo constat:
sed qui plantarum partes ac animalium sunt
in

incoctæ.

Primum genus tanquam cuius perspicuū sciens omitto, reliqua tria persequar.

Oleum igitur amygdalarum dulcium *Secundum genus.* fit ex amygdalis non depellatis, in mortario lapideo pertrititis, in offas collectis, quæ calentis aquæ vapore, in quo diu subiguntur manibus, vbi calent calathio spartaceo, aut sacco cannabino calenti inuolutæ, torculari calido exprimuntur in oleum clarissimum & dulcissimum. Aliter quoque fieri in Mesue docuimus.

Sic fit oleum ex amygdalis amaris, pista-
tiis, strobilis, nucibus auellanis, Indicis, bala-
no myrepica, nucleis persicorum, ceraso-
rum, seminibus cucurbitæ, cucumeris, melo-
num, ricini, staphidos agriæ, cnici, cannabis,
lini, papaueris, hyoscyami, & cæteris olea-
ginis, quæ etiam per genus tertium extrahi
possunt.

Oleum laurinum fit ex baccis lauri maturis *Mesues.*
recentibus, tritis in pila, incoctis aquæ, & torcu-
lari expressis.

Sic ex baccis recentibus myrti, iuniperi,
terebinthi, lentisci fieri potest oleum sim-
plex. In vsu auté frequentiore est cōpositū,
de quo in quarto genere. Laurinum autem
id ex Gallia Narbonensi vbi magnus est
ha

harum baccarum recentium prouentus, ad nos mittitur.

Tertium genus. Oleum ouorum fit ex uitellis ouorum elixando duratis triginta aut circiter, qui manibus

Mesues. friati in sartagine plumbata frignantur igni mediocri, mouendo cochleari donec rubescant, & oleum ab his resoluator & profluat.

Alios huius olei modos lege in Mesue, alii sacculo & torculari exprimunt.

Mesues. Oleum iuniperi fit segmentis ligni iuniperi, uase solido conclusis, incenso circa id igni luculentissimo, ut in uas subiectum descendat oleum.

Cætera ad hoc oleum pertinentia & ad alia, quæ eodem fiunt modo ex Mesue repetite, item quæ ratione fiat oleum philosophorum, tartari, & alia eius generis permulta, quæ, quia ibi fusius sunt explicata, neque multo usu non celebrata, nunc putauì pluribus verbis explicanda.

Quartum genus. Olea quarti generis ex plantarum, & animalium quorundam partibus, ubi harum vires macerando, & coquendo traxerunt, collantur, exprimunturque, & humor si quis in oleum largior transit, coctione absumitur. Et quæ olea cum succis liquidis fiunt, aut siccis quidem vel liquoribus: sed humore, ut vino solutis ad humoris consumptionem percoquantur, ne humor ille excrementosus

sus oleo putrendi, & situm ducendi occasionem afferat, succi consumptionem indicat oleum spathula iniectum igni, nam si ardet, purum est: si crepitat succum habet adhuc reliquum. Ad hæc feruendo in lebete crepitat cum succo, & bullas egerit: vbi absumptus, tranquillum est, & gutta in manu succum subiectum ostendit oleum supernatans.

Olea quibus flores miscentur æstiuo insolatu magis coquuntur, aut igni lento, aut vtroque.

Olea ex animalibus facienda viua ipsa recipiunt, vt in his moriantur scorpiones, serpentes, ranæ, formicæ, vulpes.

Oleum rosatum Nicolao sic fit, Rosarum tritarum sesquilibra coquitur diu in olei loti libris duabus vase duplici, tela alba exprimaturne torculari.

Hodie rosas recentes, etiam non exunguatas oleo omphacino: aut loto, dies, aut etiam menses aliquot in sole macerant vase vitreo, aut siliceo. Postcà hyeme, aut vt edictum tempore pauco succo rosarum aut vino adiecto coquunt in vase duplici ne vrendo graeuolentiam acquirat, sicque reponunt. Similiter ex floribus violarum chamæmeli fit Mesue chamæmelinum cum oleo dulci, etiã in vase duplici coquendum, & ex floribus meliloti, anethi liliorum, iridis, leucii lutei nymphaeæ:

*Quantum
genus olei
per impres-
sionem.
Mes.*

phatæ: sed à liliis apices crocati tollendí.

Oleum cydoniorum. Oleum melinum fit ex cydonijs acerbis tritis, in oleo omphacino sufficienti insolatur dies quindecim, dein cum succo cydoniorum coctis in uase duplici ad horas circiter quatuor. Carnem & succum muta, rursus insola, & coque ut dixi, idque bis aut ter repete, cola, repone.

Cydonia sunt qui cortice & semine purgent, purgatione tamen nihil opus est, nisi impura sint aut semiputria.

Mesues. Oleum mastichinum recipit olei rosati unc. duodecim, mastiches unc. tres, uini boni unc. octo, coque ad uini consumptionem.

Fit hodie ex oleo vulgari cum tamen aut rosato, aut omphacino, aut saltem loto confici debeat in vase duplici. Cōsumpto-que propemodum vino mastiche pertrita paulatim affunditur continenter mouendo, donec erit liquata & permista. Coctiōe longiore examinatur.

Oleum myrtinum recipit myrtarum recentium selibram, olei omphacini, aut loti sesquilibram: insola, aut coque cum uini albi austeri uncis quatuor ad uini consumptionem. Fit etiam per expressionem, & per decoctionem in aqua, donec oleum supernatet quod concha separandum est.

Oleum nardinum Mesue recipit spica nardi uncias tres, uini & aquæ ana uncias duas & dimidiam, olei sesamini selibram, coque in uase duplici lento igne horis circiter quatuor, sæpe mouendo.

Seu ad aquæ & uini consumptionem: sed prius infundatur spica aquæ & uino. Fit etiam sæpe oleum nardinum descriptione Nicolai Alexandrini efficax: sed sumptuosum magis, à quo etiam componendi modus abundè explicatur.

Oleum costinum recipit costi amari unc. duas, castæ unciam unam, extremitatum sampsi-
chi unc. octo, uini odori quantum * sufficit in-
fundere hoc biduo, olei sesamini lib. duas, coque
horis septem, seu ad uini consumptionem, expri-
me, repone.

Mesues.
*unc. octo.
aut circi-
ter.

Aut costum verum, galanga maior hodie dictum, sumendum, aut eius loco radix enulæ campanæ, aut silphii, aut similis, potius quàm quæ vulgò est in officinis qualitatum insignium expertis.

Oleum rutaceum fit ex folijs rutæ recentibus, oleo maceratis, & æstate tota insolatis, quæ exacta coquitur, exprimitur, reponitur, sic fit oleum menthæ, absynthij.

Oleum euphorbij fit ut oleum mastichinum.

Eup

Euphorbium enim tritum, aut si recens & molle est, minutim confectum oleo cum uino feruenti paulatim immittatur, & ad uini consumptionem semper mouendo coquatur.

Oleum castorij Nicolai fit ex castorij una, cocta in olei lib. una, ad consumptionem tertie partis castorem retinenda.

Coquitur etiam id oleum cum paucio uini, ut vnc. duabus Nam si per se coquatur, & oleum vrendo nigrescit, & castorium vane scit. Potest tamen sine vino in sole coqui saepe mouendo.

Oleum uulpinum Mesue sic fit, Vulpes integra tantum exenterata coquitur in aque fluuiialis & marine aut salse, ana sextario uno, olei antiqui clari sextarijs duobus & dimidio, coque ad aque consumptionem, & uulpis carniuum dissolutionem exprime & repone.

Oleum lumbricorum fit ex lumbricis in uino albo diligenter lotis, & oleo, & paucio uini rubri incoctis ad uini consumptionem, deinde colatur & exprimitur leuiter oleum, ac reponitur. Sunt qui tritos deinde lumbricos eidem oleo permiscant in unguenti formam, nec inuuliter.

DE VNGVENTIS SE-

ctio decima.

Paulus. c.
20. lib. 7.

VNGVENTVM, quia partibus inungitur, di etn, crassius est oleo, liquidius

cerato, vt ex vnguentis Galeni, & aliorum cōstat, huius materiæ sunt plātarum partes, & multæ animalium, metallica etiam & terrea quædam in his succi recētes, & fluidi coquendo absumuntur, vt in oleis, iidē si sunt sicci, aliquo sunt humore dissoluendi.

Si herbæ in vnguenta recipiantur, vel puluerantur si sunt siccæ & aliis miscētur, vt metallica & terrea, & alia plurima: vel humore aliquo, vt vino macerantur, etiā virides coquuntur, exprimuntur: deinde reliquis vinū id vel aliud incoquitur, ad sui consumptionem. Liquores sicci, & gummi, & resinæ, vel teruntur quādo sunt sicciora: vel pistillo calido soluuntur, vel humore idoneo, quādo præsertim sunt humidiora.

Fiūt aut vnguēta nūc igni, nunc sola subactione, sed longa, vt vnguentum ex lithargyro nutritū cū oleo, aceto, aliis, & quæ alia similiter nutriti diximus lib. 2. Sic argentū viuū citra ignē aliis miscetur, quod in vaporem promptè totum abeat.

Vnguētis, ceratis, emplastris, æstate minus olei, ceræ, & similium corpus dantium miscemus: hyme plus quod huius frigiditate etiam liquidiora cogantur, & duiora appareant, æstate contra etiam sicciora per colliuationem mollescant.

Cera cum oleo liquata igni aufertur, &

refrigerando continenter mouetur, vbi iam modicè coiuit pulueres paulatim permiscen-
tur, idque ne fiat grumosum vnguētum. Alii
vbi refrigerādo coiuit in sartagine cochlea-
ri, aut spatha ferrea in bracteolas deradunt,
in mortarium imponūt, & adiectis paulatim
pulueribus diu tribulant. Quod præceptum
plurimis his vnguentis est commune.

Vng. regis Vnguentum aureum Mesuæ recipit ceræ fla-
uæ unc. sex, olei boni lib. duas & semissem, tere-
binthina unc. duas, resinæ pineæ & colophonie
ana unc. unam & semissem, thuris, mastiches, ana
unc. unam, croci, drach. unam.

Cera ex oleo liquata pulueratæ resinæ
affunduntur, his liquatis terebinthina mox
igni aufertur, vbi refrixit, puluis reliquo-
rum adiicitur.

Vnguētum pompholygos spurium recipit olei
rosati unc. decem, ceræ albæ unc. quinque, cerusæ
lotæ unc. quatuor, plumbi usti, pompholygos ana
unc. duas, thuris unc. unam. Coque oleum rosatum
cum succo solani ad ipsius consumptionem, tunc
adde ceram: deinde reliquorū puluerem tenuis-
simum misce in mortario, ubi refrixit, quo di-
xi modo.

Ceræ vnc. duæ, aut vnc. duæ, & dimidia
satis sunt vnguento. Hæc enim quantitas
emplastrum fecerit, pompholyx vera mi-
sce

steatur non vt hodie cadmia.

Vnguentum basilicum minus Mesue recipit resinæ, picis, ceræ, ana olei quantum sufficit.

Tetrapharmacum hoc Galeno & Paulo aliter fieri docuimus in Mesue. Cera in oleo liquata, pix & resina puluerata iniiciuntur, quibus liquatis igni aufer. Si verò crassius tritam picem immittras, quia tardius liquatur, ob id diutius ignem tolerat, & velut vritur, nigrumque facit tunc vnguentum. Ceræ & resinæ vnc. dimidia, olei vnc. duæ, picis vnc. vna.

Vnguentum Aegyptiacum Mesue recipit æruginis aureos quinque, mellis aureos quatuordecim, aceti acerrimi aureos septem coquenda igni ad iustam crassitiem.

Mel cum aceto primùm aliquandiu coquitur, deinde additur ærugo & percoquitur. Iusta autem crassities ex notis prius dictis intelligitur, hoc est, si eius portio vasi stanneo, aut marmori imposita & refrigerata coëat, nec adhæreat. Aerugo coctione transmutatur in rubrum, sicque minus terret vnguentum ægros quàm viride. Gal. lib. c. ph. 9.

Vnguentum album Rasii recipit ceræ albæ unc. unam, cerusæ in aqua rosarum lotæ unc. duas, *olei rosati unc. quatuor. Sunt qui addunt * Vnc. paucum aceti, alij etiam unc. unā lithargyri, alij unam.

caphuræ drac. duas, alij duo albumina ouorum, omnes rectè pro uario medici scopo.

Hodie plærique addunt omnia hæc præter lithargyrum. Alii olei vnc. 12. cerusæ, ceræ albæ ana vnc. 4.

Vnguētum desiccatiuum rubrum nothum recipit cadmiæ lapidosæ, terræ sigillatæ, ana unc. 4. lithargyri auri, cerusæ, ana unc. tres, caphuræ drach. unam, ceræ unc. quinque, olei rosati & uiolati ana uncias sex.

Præstantius esset cum solo oleo rosato, & eo factò ex oleo omphacino, quia magis stringeret & ficcaret.

Lithargyros cum oleis aliquandiu nutritur super ignem, cera deinde liquatur in his, deinde reliquorum puluis tenuiss. paulatim adiicitur.

Vnguentum enulatum spurium recipit radicis enulæ campanæ costæ cum aceto, & tritæ, & cretæ lib. unam, axungia porci, olei communis, ana unc. tres, ceræ nouæ, argenti uiui, saliuæ hominis ieiuni extincti, terebinthinæ lotæ ana unc. duas, salis communis puluerati unc. semissem.

Cera in oleo liquatur, axungia, deinde, post additur enulæ pulpa, deinde argentum viuum, & sal, post id terebinthina. Sunt qui argenti viui loco salubrius miscent sulfur, alii vtrunque omittunt.

Vng

Vnguentum populeum Nicolai recipit oculo- **A** multis
rum populi lib. dimidiam foliorum papaueris ni huic dupla
gri, mandragoræ, hyoscyami, solani, semperuiui aut tripla
parui & magni, lactucæ, personatæ, cotyledonis, cõponitur.
uiolæ nigræ, summitatum rubi tenerimarũ, ana
unc. tres axungie porci sine sale lib. 3.

In hac regione populi flores & herbæ in
idem tempus non incidunt. Nam oculi po-
puli Martio erumpunt, herbæ Iunio vigent:
ob id oculos ipsos in mortario per se teri-
mus, deinde cum dimidio axũgiæ porci pur-
gatæ (sæuum dulce vocamus) multũ diũque
tũdimus, in vase operculato recõdimus heb-
domadas 5. 6. menses duos, dum herbæ vi-
geant. Hæ incisæ & per se pistillo ligneo tri-
tæ, quia simul ob lentorem, & multitudinẽ
non possunt cum oculis populi, & sepo co-
quantur, cernuntur omniã, & si opus est pa-
rum recoquantur, reponuntur: vt tamen vi-
reat magis, super adde coctioni solani triti
manipulos duos, non maleficorum more
æruuginem.

Vnguentum tripharmacum Mesuæ recipit li **Vng. de li**
thargyrum leuissimè tritum in mortario ad iu- **thargyro**
stam crassitiem, tribulandum cum aceto & oleo **nutrito.**
uicissim & paulatim affusis: si uerò coquis ad ace-
ri consumptionem, & lithargyri fusionẽ, ut cras-
sescat magis, fiet emplastrum.

* *Dictum Vnguentum* * apostolorum Auicennæ s. c. an.
 quia sim - recipit terebinthinæ, ceræ albae, resinae, ammo-
 pliciter 12 niaci ana drach. quatuordecim, eruginis, opopa-
 constat nacis ana drach. duas, aristolochiae longæ, thuris
 quot fue- masculi, bdellij ana drach. sex, myrrhæ, galbani
 runt apo- ana drach. quatuor, lithargyri drach. nouē, bdell-
 stoli. lium si molle est, ammoniacum, opopanax cum
 aceto macerabis nocte una, postridie calefac, co-
 la, iterum pende: & ponderi horum legitimo, te-
 rebinthinam permisce, quæ tam bellè hæc, ac cæ-
 Olei libræ tera comprehendet, ut uix sis erraturus: lithargy-
 sint æstate rum autem in oleo nutries aliquandiu sine igni
 duæ, hye- friatum. Post igni trade: ubi calet, ceram immit-
 te tres. te. Hac liquata igni aufer, liquores, ut dixi, para-
 tos misce: ubi refrixit, reliquorum puluerem pau-
 latim adijce, & bdellij si est siccior, quale nobis
 est adulterinum.

Rarum usu, tamen ob componendi & miscendi magnam difficultatem sæpè ad operis specimen probandis seplasiariis parari imperatur.

Emplastrum apostolicum Nicolai Alexandrini ab hoc diuersissimum est, & constat simpl. viginti & vno.

Vnguentum martiatum cum Hermolao, vel Martianum cum aliis, & de althæa, & Arragon, & Agrippæ (quæ quatuor vulgus
 ole

olea 4. calida vocat) quia rarò componuntur, omisi, ex Nicolao petenda si componendi necessitas inciderit, & vnguentum in gratiam comitis cuiusdam ad menses cohibendos scriptum, quia omnibus & solis astringentibus constat, ut emplastrum contra rupturam, si tamen componendi cupiditas tibi incesserit, aut etiam necessitas, nobis scribitur in fine vnguentorum Mesuræ cum vnguento citreo, & aliis non paucis hodie obsoletis: quanquam & vnguentum citreum, etiam hodie quidam componunt, incerti tamè quid amentum dulce sit.

Nam sunt qui lapidem vitri (quam axungiam vitri vulgò vocant) alii gypsum lucidum, alii aliud. Forte autem corrupta vox ex amianto lapide quo adulterant hodie alumen scissille illi aspectu simillimum, sed alumen vrit, amiantus est dulcis. Eadè ambiguitate tenetur in antalli lapide, & ingerfa serpentaria quam vocem ex cerusa, syncope, n, corruptam esse est perspicuum. Est enim velut aut cerusa, aut amyllum (sic enim etiam quidam vocant) ex radice ari, vel draconculi depellata, trita, siccata citra lotionem his aliis post lotionem cum aqua rosarum.

Cerote & cerelæon Græcis nobis ceratum à cera dictum, medicamentum consistens quodammodo medium inter vnguenta

& emplastra.

Mesue.

Ceratum Galeni refrigerans recipit ceræ albæ per ablutionem unciam unam, olei rosati ex omphacyno facti uncias quatuor, fiat ceratum in uase duplici, quod dum est refrigeratum, multum diuque ex aqua frigidissima, & postremò pauco aceto albo puro subigatur.

Non esse autem ceratum hoc aqua & aceto imbuendum nisi tempore vtendi, abunde ex Galeno in Mesue sectione vndecima docuimus. Postremò aqua rosarum imbuunt hodie quod probo, sed diu seruari nolo, præsertim aëre calido, quia vires suas perdit, & graueolentiam acquirit.

Ceratum santalatum Mesue recipit ceræ albæ, drach. triginta, olei rosati lib. unam, rosarum drach. duodecim, santali rubri drach. decem, santali albi & flauiana drach. 6. boli Armeniace drach. 7. spodij drach. 4. capburæ drach. 2.

Spodium
Arabū nō
Græcorū
Calidum.

Refrigerato iam cerato & raso puluerē, in mortario miscēt, paulatim potius quā inter refrigerandum, vt antè vnguenta dixi.

Ceratum Galeni stomachicū recipit unguenti nardini optimi, ceræ odora & pinguis, & lotæ ana unc. unā. si byems est: si uerò æstas ceræ drac. septem, liqua in uase duplici, refrigerato deinde & raso adde pulueris mollißimi aloës, & mastiches ana drach. unam.

Suc

Succus omphacii aut absynthii quando *Refrige-*
addenda, in Mesue dixi. Hoc aliter Mesues *rans.*
cōponit ex Galeno, sed mutatis aliquot sim-
plicibus & ipsorum pondere.

Ceratum Galeni stomachicum alterum reci-
pit olei melini, ceræ albæ lotæ ana uncia unam,
hypocisthidos nnc. semissem, fiat ceratum.

Hæc duo cerata stomachica ex Galeno
vsurpanda potius suaserim, quàm quæ hodie
sunt ex Nicolao & Mesue, quanquam &
id clemens, & efficax fuerit. Illud calidissi-
mum quod non esse Galeni caryophylla,
nux moschata, macis, cubebæ, galanga, pla-
nè indicant.

Ceratum, stomachicum Galeni ex Nicolao
recipit menthæ, absynthij, maioranæ, stachados
Arabicæ, foliorum lauri, chamæmeli, rosarum,
ana manip. unum, cinnamomi, spicæ nardi, nucis
moschatæ, caryophyllorum, macis, cubebæ, galan-
gæ ana unc. dimidiam, thuris, mastiches ana unc.
unam, puluerata excipe ladani, ceræ ana unc.
octo, olei chamæmelini, laurini, spicini, mastichi-
ni, rosati, ana unc. una & dimidia.

Oleum laurinum, rosatum, chamæmeli,
cum cera & ladano liquantur, mox igni au-
fer, & trade mortario, cætera misce multū,
& diu tundēdo, donec erit glutinosum cum
oleo spicino, & mastichino.

Ceratum aliud Mesue recipit rosarum, mastiches ana drachmas uiginti, foliorum absynthij siccorum drachmas quindecim, spica Indæ drachmas decem, excipe cere puræ uncias quatuor, olei rosati lib. una, & semisse simul igni liquatis, mox aqua rosarum aliquoties lotis, deinde uiuo ueteri, succo, cydoniorum, & pauco aceti.

DE EMPLASTRIS.

HÆC emplastrum cum r, & adiectiuè medicamentum, emplastrum sine r, Galeno dicitur, Latinis tamen placuit potius dicere neutro genere emplastrum, quos hîc sequemur. Emplastrum autem est medicamentum corpori admouendum, durum valdè & solidum ex omnibus propè inedicamentis, præsertim pinguibus & siccis coactum.

In emplastra enim recipiuntur omnes plantarum partes, metallica itè & terrea omnia. Multæ etiam partes animalium ac interdum animalia tota.

Ex his autem quædam vires solas emplastro distribuunt, ut vinum, acetum, aqua, succi liquidi, hæc enim ad sui consumptionem coquuntur. Alia corpus tantum, & materiam emplastro conferunt, nullam verò aut minimam virtutem largiuntur, ut litha

thargyros, cera, oleum commune, recens, & frequenter resinæ. Reliqua propè omnia & corpus & facultatē aliquam emplastro impertiuntur. Ex quibus patet scopos componendorum emplastrorum præcipuos esse duos facultatem, & consistentiam crassam, duram, glutinosam. Duos verò alios odorum & colorum minus esse præcipuos, & magis in ægrorum gratiam quàm medicamenti naturam, recipit tamen ob apprehensionem, magni quoque sunt momenti, præcipuè odor. Is enim bonus cerebro, cordi, vtero, commodare possit: malus nocere, in sumendis verò coloris, & præter hos saporis magni quoque ratio est habenda, ut in methodo componendi medicamenta ostendimus.

Ex his radices, cortices, ligna, folia, surculi, flores, fructus, semina sicca, & simul puluerata, vel cum aliis, ferè postrema miscentur cocto emplastro cum aristolochia, gentiana, chamæleon remoto ab igni emplastro à Galeno miscentur: si qua verò ex his recentia & viridia sumantur, vel ex humore aliquo coquantur, cernuntur, miscentur: vel succus ex his si succulenta sint tritis expressus incoquendis aliis seruit, & in vaporem exhalat, viribus tamen relictis, ut in emplastro de genua. Id quod etiā

muccaginibus commune est, sed minus hæ ob lentorem exhalant.

Oleum tamen & mel adhuc multum absolutis emplastris superest.

Qui verò succi constantes & corpulenti (vt aloë, hypocisthis, glycyrrhizæ succus, acacia, glaucium, lycium, elaterium, meconium) in emplastra veniunt, si recentes sunt, aliquo rei propositæ idoneo humore solvantur, qui coctione prius est consumendus, quàm illi composito misceantur, aut saltem simul incoquendo cōsumetur. Si autem sicciores sunt, tamen adhuc teri contumaces, pistillo calido, & ob calorem siccante terantur, nisi si qui sint friabiles, vt aloë, scammonium, tam succus, quàm liquor. Dicti verò succi omnes refrigerari iam incipienti emplastro miscendi sunt, vel dum cerati consistentiam habet emplastrum, si illorum succorum substantiam & facultatē manere volumus in emplastro.

Sed succi sicciores, vt rarius in emplastra recipiuntur: sic liquores, gummi, resinæ, metallica omnino frequentissimè.

Liquores autem vt galbanū, opopanax, sagapenum, ammoniacum aceto vel vino vel alio competenti humore macerati dissoluantur, colantur, coquuntur ad humoris illius consumptionem, in emplastriq; consist

sistentiam coguntur, tuncque pondus illorum quæsitum in scriptura sumitur. Si verò horum duo, tres, quatuor in idem emplastrum recipiuntur: sed pondere diuerso, vt in emplastro diuino, separatim liquores singuli sunt macerēdi, dissoluēdi, colandi, coquēdi, vt cuiusq; per se pondus legitimū accipiatur id quod ante hanc per colum purgationem fieri probè non potest ob ramentorum, seminum, sordium, & aliorum largam in multis horum mistionē. Si verò puri sint, aut cultello purgati, potes initio statim pendere, & mox simul dissoluere, colare, & emplastro propemodū cocto incoquere ad humoris ascititii consumptionem. Quod si iam dissoluti, colati, appēsi, & per se cocti ad emplastri crassitudinem, vt dictum est, venerint, percocto iam emplastro iniiciuntur. Sunt qui terebinthina pauca, si hanc recipit emplastrum, percoctos prius resoluāt quàm iniiciant.

Galbanū ligneo pistillo tusum aliquādo cæteris ab igne depositis iniicitur, aliquādo parū incoquitur, raro multū: ammoniacum sæpe multū coquitur, aut separatim, aut cum emplastro, interdum minus: est quando digitis ad ignem, vel solem dilatatum mox vbi alia, sed remota sunt ab igne sublata iniicitur, donec lique scat.

Ammoniacum solum impositum squallida & arida reddit emplastra, nisi cera & resina, vel alia ad emplasticam confectionem idonea misceantur.

Vinum verò, acetum & alia id genus coquendo tota consumuntur, viribus tamē (vt dixi) in medicamento relictis pro varia aceti & vini natura. Neque enim idem potest acetum ex vino austero, & acetum ex vino valenti, adhuc tenue, purum, album valentius est, in tenuando & penetrando quàm contrarium: sic vina medicamentis varia expetuntur, nunc austera in emplastris epuloticis: nunc generosa, quale Falernum, si digerendum valentius est. Ob id à medico sunt hæc distinguenda in suis scripturis.

Oleum emplastris primà ratione miscetur ad coctionem, deinde vt emplastrum fiat anodynum, resoluens, molliens, vtque medicamenti vis acris, vel austera obtundatur.

Oleum commune emplastris miscetur, vt materiam præstet: sitque cum cera liquidum, & mistum emplastrorum corpus, cui euphorbium vel alia misceantur. Sæpe autem ad metallicorum coctionem adhibetur, vel solum, vel cum aqua, vel aceto, vel vino. Solum cum axungia in emplastro diachalcyteos ad lithargyri & chalciteos coctionem:
sol

folo item vel cum dictis humoribus lithargyros læuissima ferè veteribus coquitur ad sordium consistētiam metallicis quibusdā, vt squamma æris, cerussa, nunc initio adiectis, nunc postea, pro variis medicis scopis.

Oleum verò vetus quanquā & materiam præbeat, tamen ad digerendum miscetur: id quod quanto vetustius est, tanto in id efficacius. Eadem ratione omphacinum oleum, vel simile ad astringendum & refrigerandum miscetur: lotum ad refrigerandum, & dealbandum. Composita quoque olea omnia, & vnguenta in emplastra inmitti possunt, vt præter materiam, facultatem quoque suam inmittant.

Additur etiā oleum, vt resinarum sicciorū, & ceræ vetustioris siccitatē corrigat: id quod resinæ recentiores quoque præstant.

Oleum hyeme vnguentis quibusdā, cæ ratis, emplastris largius miscendum quàm æstate, à cuius calore semifusum, mollius reddit vnguentum ceratum, emplastrum, vt durius idem oleum ab hyemis frigore concretum. Eadem ratio resinarum, liquidarū, & siccarum, minus & ceræ, vt olei partē cotylæ quartam hyeme, æstate octauam: miscet Galenus, interdū cotylas olei quatuor hyeme, tres æstate idē miscuit. Resina tamē & cera quanto pinguior, humidior, recentior

tior, tanto paucior tam hyeme quàm æstate miscenda est: sed tamen parcius adhuc æstate quàm hyeme.

Mel panaciæ & aliis quibusdam emplastris miscetur, vt corpus præbeat emplasticum, & prætereà siccet, tergeat, digerat, à putredine vendicet.

Cera in emplastris solum materiæ locū habet nō efficaciam virtutis adiuuat, vt interdum resina, non tamen omnibus, vtpote materiam aliunde sortitis cera miscetur, aut resina. Nam emplastrum diachalciteos neutrum recipit, quod consistentiam emplastri iustam suppeditent lithargyros, chalcitis, & axungia à membranis purgata, cum oleo cocta. Ad hæc quibus ladanum miscetur si laryngum est, ceræ vicem sustinet, vt ea non sit addenda.

Quāuis enim emolliendi vis exigua ceræ adsit, tamen illius causa non iniicitur.

Porro cera vel est recēs, & ob id pinguis & glutinosa magis. Hæc quæ æstate parcius est miscenda, vt oleum hyeme, largiori manu vtrunque, & ratione eadem pices, & resinæ. Quæ verò cera est ficior, vel natura, vel tempore hæc minus diu coquenda, & sæpè oleo aliquo vel resina liquidiore humectanda. Adde, quod cera alba seu natura, seu lotionem ad candorem quoque interdum additur. Propoleos ferè eadem quæ ceræ consistentia & ratio, sed facultate trahēdi vehemen-

men

menti est prædita, quàm cera, vel nullã vel minimam obtinet, quanuis nõnihil digerit, sed inter digerens & tractorium aliquid inter est Galeno initio lib. 7. c. ph. g. Propolis ob id ferè semper remoto ab igni emplastro miscetur, ne vis eius attractrix exhalet.

Gũmi thuris omniũ frequentissimè in em *Gummi.*
plastra Græcis veteribus recipitur, myrrha & sarcocolla non rarò, bdelliũ & styrax interdum, cætera rarissimè, nisi quod caphuram, & alia quædam Arabes ac neoterici frequenter hodie suis emplastris commiscent.

Thus autem persæpe miscetur empla- *Vt lib. 5.*
stris ad obtundendam aliorum valentiorum *meth.*
violentiam nonnunquam vt materiã præ- *Manna*
beat emplasticam, præsertim quod recen- *Græcorũ.*
tissimum est ac pinguisimum, nõnunquam
vt affectus causam coquat, & modicè digerat. Rationibus iisdem manna ipsis miscetur, ac præter eas vt modicè asringat. Gummi alia ferè miscentur quo emplastris facultatem aliquam suam largiantur, ac non multò ante resinas iniiciuntur, idque quia substantia sint aquea & crassiore cū resinæ sint aeræ magis & tenuiores, vt in simplicibus diximus. Si verò gũmi sint liquida & recentia eorum quæ humiditatem multam, & virtutem in emplastro manere velimus parum diu incoquantur. Quod præceptum succis,

liquoribus, resinis, & aliis permultis est commune: quia coquendo sicciore euadunt, & viribus velut exanimantur.

Gumi liquores semper in fine misceantur, & succi sicci: quæ si humore aliquo fuerint soluenda, ad illius consumptionem prius coquantur, post misceantur, quando emplastrum incipit refrigerari. Succu liquidu in emplastro de ianua coquendi cum oleo. Herbae virides in emplastro gratia dei cum vino coquantur ad eius consumptionem. Ex oleo coquantur emplastra, vt apostolicum, ceroneum, oxycroceum, diuinum, & contra rupturam, diachylon, vel ex succis, vt emplastrum de ianua: vel lacte, vt emplastrum gratia dei.

Chalcanthum aceto solutum depositis ab igne paulatim miscetur Galeno cauenti ne effervescat. Aesustum, ærugo, chalcitis, magnes, bolus Armenica, terra Lemnia, sulfur, auripigmentum, & cætera puluerabilia in fine depositis ab igne miscentur. Adeps super ignem miscetur semper agitando, crocus humore solutus dum fiunt magdaliæ & moschus miscentur.

Resinae.

Resina lentiscina, terebinthina, laricea, pitynia seu pinea, picea, abietina, cupressina emplastris miscentur sæpè ad consistentiam ipsorum constituendam tantum, seu vt ma-

ter

teriam & corpus emplastro cum aliis præbeant, interdum vt lentorem & glutinosam qualitatem impertiantur, cum per alia emplastrum pinguis expers, nec adhærēs per se partibus est, at per se promptè excidens.

Est quando vt virtutem aliquam emplastro afferant digerendi, tergendī, siccandi, vel aliam cuique seorsum resinæ peculiarē, vt in ipsarum historia docui in simplicibus. Quantum autem vniuscuiusque sit miscendum, & quādo coctioni sit vna quæuis miscenda, postea suis locis audies.

Terebinthina quanuis valentius quàm cera emollit, ac præterea calfacit, & digerit: sæpè tamen emplastris iniicitur, vt ea tantum reddat glutinosa, non vt facultatem aliquam, vel nouam tribuat, vel augeat, Aliæ item resinæ similiter pingues eadem ratione.

Quando autem ea miscetur, & simul liquores, aut succi sicci. His humore idoneo solutis, colatis, ad humoris consumptionem coctis, rectè commiscetur terebinthina, deinde ambo percocto emplastro, & ab igni deposito permiscetur, vt ignem nullum, vel minimum sentiat terebinthina. Siue per se siue cum aliis in emplastrum veniat, vt in emplastris diachylo maiore, de meliloto, de muccaginibus.

METALLICA.

METALLICA sunt autē admodum curiosè terenda, & cribro tenui cernenda, vt promptius liquentur si liquabilia sunt, vel ne contactu nos offendant si non liquantur, etiam si liquabilia sint.

Ex his verò quæ liquantur libro superiore docui in liquatione.

Liquatur lithargyros cū aqua, vel oleo, vel vino, vel aceto, vel oleo iunctis horum aliquibus, quæ tamen coquendo absumentur, & liquandi celeritatem lithargyro afferunt, vt post audies.

Lithargyri & cerusæ ana lib. i. si cum olei & aquæ ana libr. vna, parum diu aëre puro igni splendente coquantur, album fiet emplastrum: sed vt adhæreat parū terebinthinæ, vel resinæ similis addendum, si molybdæna addatur fiet cineritium, si lithargyros & oleum sint lota, albius fiet emplastrum, albedinem præter dicta emplastro conciliat cera alba, oleum lotionē albatū, pompholyx, spodium, calx, ossa vsta, & pisciū testæ vstæ, farinæ, si plus cerusæ accipiat quàm lithargyri albius fiet: sed minus tenax.

Aerugo citra coctionē cerato mista emplastrum facit viride: melius fiet si ærugo in sole ex aceto acri pluribus diebus læuigetur, quod enim est in ea mordax, sic mitescit.

scit. Si verò æruginem cum aliis initio mediocriter coxeris emplastrum facies melinum, id est coloris mali cydonii: si liberius, rufum fiet. Rosa item & fusca efficiunt chalcitis vsta, auripigmentum, sandaracha, pix nigra, bitumen, gagates lapis, & alia ante mitionem nigricantia, quæ si largiora miscentur, nigrum faciunt emplastrum. Melinum etiam fiet si ærugo lithargyro ad spissitudinem cocto addatur, & iterum coquatur, donec vrendo rufescat.

Cadmia fornicaria, vt etiam lapidosa prius ex vino, vel alio liquore idoneo diu trita fit melior, & ad fusionem aptior.

Cerusa interdum additur emplastris, vt refrigeret, siccet.

Interdum ad albedinem conciliandam, interdum ceu apta tantum conficiendo emplastro materia, vt in emplastro heræ ex duabus aristolochiis.

Si candidum vis emplastrum lithargyri loti & cerusæ ana lib, i. cum olei vinctis nouem coquitur parum diu ob paucum liquorem (coctio enim longa nigredinem affert) sed medicamentum tunc minus est glutinosum, & adhærens: quale vt fiat quidam terebinthinam, vel colophoniam maximè perlucentem miscent, ne colorem vitient, aut medicamenti virtutē, Alii eadem ratione ceram

albam adiiciunt, vt cerusa emplastris multis ad albedinem cōciliandam miscetur : sic ad ruborem nimium sinopicum, veteres misuisse docet Gal. lib. 6. c. ph. g. vt autem sit fuscum emplastrum, squamma æris additur, & ignis fit ex tæda loco lignorum, ibidem.

Interdū per se ex oleo coquitur lithargyros ad spissitudinem, tuncque puluerata cerusa spergitur, vt fiat emplastrum album. Cerusa potest initio misceri, vt sal, & alia metallica, & terrea, & cū lithargyro coqui quando nihil ad albedinem cōferet, sed neque ad aliud quàm materiā, nisi quod valentius siccat quo diutius coquitur: sic lithargyros & metallica ac terrea alia.

Lithargyri enim vsus in emplastris duplex, si enim nō liquetur, materiæ solūm habet rationē: si liquetur præterquā quod corpus glutinosum emplastro præbet, etiā siccat, idque magis quo diutius cocta erit, sitque sic medicamentum glutinantius.

Si lithargyros ex oleo coquenda sit, & ei emplastro addantur mucagines, lithargyrū prius extra ignem pauco oleo nutrias: deinde igni trade, & mucaginē paucam, vt vnc. duas affunde, prohibebit oleum & lithargyrum vri: si non requiritur mucago igni lento diu coquatur.

Lithargyros oleo duplo incocta : satis
glut

glutinosum facit emplastrum sine resinoso, aut ceroso corpore, multò magis si triplo.

Si emplastrum recipit lithargyrum, cerum cum vino, aceto, aqua, oleo, vel succo alio fluxili, prius sine igni illa nutriantur in mortario cū pistillo: deinde coquātur igni lento, donec corpus (vt dicūt) smat, & crassum glutinosumque euadat. Lithargyros enim coquenda diu ex humore aliquo, vt siccanis magis, & glutinosum reddat emplastrum. Eadem ratione metallici reliqua, & terrea coctione longa sicciora euadunt, non tamen glutinosa, nisi quæ liquantur. Nam quæ glutinosa prius erant cum his cocta, liquores, gummi, resinae, cera, mel, siccata magis lentorem glutinumque amittunt. Oleum verò lentum, sed minus ob iunctam humiditatem multam glutinosius euadit, vt vetustate siccoctione. Adde quòd fusè coquendo lithargyros, & oleo vnita probè, olei glutinositatem auget, tum quòd in pristinam duritiem non redit, tum quod siccando liquiditatem olei consumit. Vnde etiam citra fusionem lithargyros leuissimè trita, diu cum oleo mediocri subacta, in emplastri formam perducitur, praesertim si ad in sole, vel aëre aliter calido fiat.

Contra ærugo, chalcitis, squamma aris, & similia diu coquantur, vt vires eorum

vehementes coctione longa obtundantur,

Quanti- Ladanium autem & galbanum, & propo-
tus. lis, & plurima alia vires tantas non habent:
 quæ obtundendo veniant ob id nihil, aut ni-
 mirum coquuntur.

Lithargyri libr. tres, chalcithecæ vnciæ
 quatuor cum olei lib. tribus, & axungiae lib.
 duabus coquantur: præstat tamen prius in
 mortario miscere illa omnia, quàm in caca-
 bo coquantur. Lithargyrus & cerusa ex pa-
 ri sibi oleo & aqua si coquantur, medica-
 mentum fiet fragile, cuti non hærens, si ma-
 iorem liquidorum mensuram acceperint, &
 ob id diutius coquatur, glutinosum euadet
 medicamentum. Lithargyros fusa cum aqua
 & oleo largo blandum, & glutinosum, &
 album facit emplastrum.

Lithargyri lib. vna ex aceti & olei ana
 lib. duabus, cocta ad liquationem, glutino-
 sum admodum facit emplastrum, magis si
 ex vtriusque ana lib. tribus coquatur: quòd
 si vno die toto coquatur, nigrum fiet ac
 splendens.

Eadem ratione si cū largo vino & oleo
 liquetur. Viribus tamen maximè variat pro
 coctionis mensura, & aceti, vini, aquæ, olei
 varia in differentiis suis natura: quas diffe-
 rentias medicus pharmacopæo in scripturis
 suis explicare debet. Præstantius autem fiet
 hor

horum quodque, si lithargyros ex his liquo-
ribus, vel singulis, vel coniugatis æstate so-
le calido multum teratur singulis diebus
quindecim.

Oleum hyeme largius emplastris misce-
tur quàm æstate, à cuius calore semifusum
fit mollius emplastrum, vt à frigore concre-
tum durius, eadem ratio est resinarum liqui-
darum, aut minus siccarum & ceræ.

Resina aut cera quanto pinguior, humi-
dior, & recetior, tanto parciore tam hyeme,
quàm æstate miscenda est.

Si medicamentum facturum es simile aco-
pis vnguentis, & ceratis liquidis, oleum sit
quadruplum ceræ. Si ad emplastri speciem
durum, ceram oleo æqualem misce, maxi-
mè si cera sit vetusta & sicca: si verò recēs est
ac pinguis, pauciore oleo quàm cera opus
est, vt ceratum emplastri consistentia fiat,
maximè per æstatem: vt si facis ceratū dia-
euphorbii, accipe ceræ drach. 6. olei drac. 6.
vel drach. quinque, euphorbii drachmam
vnam. Quod si resinam miscebis, vt gluti-
nosius sit medicamentum, oleum minue.
Cera enim ad liquiditatem multò pingui
eget: resinæ verò si sint aridæ, pauco: si li-
quidæ, siccam aliquam substantiam ad em-
plastri consistentiam postulant. Quantum
autem resinæ cerato misceas, coniectabis

experientia. Terebinthina enim triplicata ceræ mista, vide an emplastri habet spissitudinem, si erit ficcius, auge resinam: si mollius minue, vel ceram auge.

De propoli eadem quæ de cera ratio, si enim pinguis & recens est, parcior miscenda est ad emplastri formam, si vetus & sicca, largior potest misceri.

Si medicamentum iam cerati habet consistentiam ut emplastrum fiat, ceræ tantum tertia pars vel quarta misceatur: si adeps miscenda est, & ea humidior, ceræ dimidium addendum est.

Si ceram parem miscebis oleo, emplastrum medicamentum fiet aëre temperato. Si vero cera vetus est, & arida, & aër frigidus, paulo plus olei: si autem cera pinguis, & aër calidus, paulo minus olei quam ceræ, ut ceræ pinguis lib. vni, olei vnc. duodecim, ceræ vero siccae vnc. tredecim, pro ceræ consistentia, quantitate, & aëris in calido & frigido temperatura. Ut autem pinguedine lenta cuti adherere possit, resina additur præcipuè terebinthina liquida parte ad ceram tertia, vel quarta.

Quando ceræ miscentur liquabilia, quæ frigida ubi concreuerint solida sunt, pauca cera opus est, ut in basilico tetrapharmaco recipienti ceræ, resinæ simp. colophonix picis

cis seu taurini pares portiones.

Quando prætereà ceræ mista sicca sunt, vt metallicorum pulueres, farina, pauca misceatur, vt emp. ex semi. lini. Olei veteris lib. duæ, ceræ vnc. 20. resinæ colophonix, adipis suilli ana lib. 1. & dimid. lithargyri li. 1. cerusæ, & mucaginis seminis lini ana vnc. sex, thuris vnc. quatuor, farina tenuissi. vnc. vna. Mucaginis, sem. fœniculi, lini, radi. althææ, & oleum incoquit Paulus in diaphillo, dum bullire desierint, id est ad mucaginis consumptionem.

Ex metallicis præsertim si pauca liquida addantur, statim durissima euadunt emplastra. ob id parua quantitate paranda, præsertim si hyeme paranda sunt, ceræ, olei, adipum, medullarum, gummiū resinarum, butyri, liquorum recentium, & succorum glutinosorum misturam cum siccis, primam coniectura quadam artificiosa ex singulorum quantitate & consistentia præsumimus: non planè scientes quale crassitudine tandem medicamentum sit futurum: Sed cum mista sint omnia, clarum sit an tene-rius, vel durius æquo sit redditum: quare in secunda compositione diligentius à nobis coniectanda est legitima cuiusque quantitas.

Olei mensura est coniectanda ex his qui-
bus

bus miscetur, & coctionis quãtitate, & aëris temperie: nam metallica sunt coquẽda diutius quã siccare sine morſu volumus, ac glutinofiora eſſe, ob id largius oleum requirunt: quod ſi paucum habent, & minus diu coquenda & friabilia ſunt, niſi reſina aliqua coẽant. Quod ſi cum oleo & aceto vel vino coquitur, quo plus aceti vel olei accipit, eo magis ſiccabit emplaſtrum.

*Coquendi
modus &
ordo.* Quã ladanum accipiunt, non egent cera & contra, quia ladanum cerã loco ad ſiccorum medicamentorum vnitatem faciendam uſurpatur. Multã cerã miſtura medicamenti vim aufert, cera recẽtiſſima molliſſima, pinguiſſima, pauco humore oleoſo eget. Vnus coquendi modus in omnibus emplaſtris nõ eſt ſimiliter utilis, ſed colorẽ, & ſæpe facultatẽ immutat. Poſſis enim ceruſam ab initio cum lithargyro coquere, ſed candorem ex longiore coctione perdet, & aſtrictionem, & refrigerationem: magis tamen ſiccabit, ſi cruda iniicitur, contrã, ſi cocto iam lithargyro ad mellis conſiſtentia, omnia hæc mediocriter.

Dum lithargyrum & alia metallica coquis igni, ſpatha ferrea moue ne vrantur, quod fundum ob inſitam grauitatem promptè petunt.

Lithargyro ad conſiſtentiam cocta ad-
du

duntur adipēs, resinæ, gummi, manna, cera, dum cocta adeo sunt omnia, ut digitos non inquinēt, galbanū, & ærugo, & opopanax, aristolochia, panacis radix, chamaeleontis radix, gentiana, myrrha.

Lithargyro ex oleo liquata cera, & terebinthina adduntur, ubi cocta sunt adeo, ut manus non inquinēt, ammoniacū manibus dilatatū additur, deinde lana succida, vsta.

Quod si sepum & mannam thuris accipiat, illa ante ceram miscentur, & assidue mouentur: post ubi mutata erunt & liquata, ceram, & picem aridā, & terebinthinam, donec amplius manus non inquinēt: tunc adde galbanum, post æruginem, & opopanax aceto dissoluta.

Lithargyro ex oleo cocta squamma laeuissima miscetur semper mouendo, deinde chalcites ex vino calido acrimoniā, exuta, vel aceto trita, paulatim miscetur.

Si bitumen, pix, cera, resina, propolis spissato illi addantur, quibus liquatis ærugo, & pyritis lapis ab igni sublato, & modice refrigerato alumen, galbanum subactū manna iniicitur.

Myrrha, bdellium, thus, opopanax ex aceto teruntur, interdum & ichthyocolla minutim concisa prius, puluis lanæ succidæ, manna, galbanum, extra ignem iniiciuntur.

Ter

Terebinthina & cera adduntur lithargy-
ro ad consistentiam cocto, deinde ammo-
niacum digitis dilatatum, tunc & ærugo &
squamma æris: post hæc ipsum æs vstum, pi-
tyinam, & ceram, post hæc metallica.

*Coquendi
finis.*

Finis coctionis emplastrorū est, cum sco-
pos prius dictos attigit: consistentiam scili-
cet legitimam cum viribus expectatis, colo-
rem quoque quæsitū ac odorem. Consisten-
tia autem iusta, hoc est crassa, dura, glutino-
sa, & adhærēs cognoscitur, quādo emplastri
portio exēpta, & refrigerata in aëre, marmo-
re, metallo, vel aqua, vel alio, digitos non
inficit, & omnia in vnū probè coierunt: nec
fragile, sed tenax, ductile, rumpi cōtinuax,
duritiæ ceræ igni, vel alio calore mollitæ.

Vires autem emplastri expetitas cogno-
sces si quas frangi noluit medicus, integræ
sunt, nec igni dissolutæ, quas auctas vo-
luit, vel fractas, coctione longa, vel alio-
rum mistione auctas & fractas coniectura
quadam colligis, quæ an certa fuerit, expe-
rientia & usu emplastri probauit medicus.
& tibi postea insinuabit. Ignis ipse non mo-
dò vehemens aut clemens, sed subiectorum
ratione, & diuturnitate emplastri, vim aliā
alia mutat: nam vehementior vrit, & deni-
grat: vti & diuturnior & fumosus, & qui ex
tedis fit, vel aliis fumum multum & cras-
sum

sum ob resinofam substantiam edentibus, & in aëre crasso, & nebuloso factus. Contrà verò clementior coquit, & qui ex lignis fit ficcis, ac sine fumo, sinceram & splendidam flammam edentibus in aëre puro.

Lithargyros flamma acri & cōtinua interdum coquitur, interdū igni lento. Probè coctum est emplastrum diachylon Nicolai Alexandrini, quando in eo vesiculas ebullare & subsistere videris, cap. eiusdem. 104.

Pyxide rubra quædam, alia lignea, alia *Repositio.* pelle excepta reponuntur, ferè tamen hodie Democratis exēplo li. γ. c. ph. g. μαρμα-
ριας, manibus facimus, quas papyro circun-
damus.

Emplastrum diachylon commune Mesue sit *Diachylō*
fit, lithargyri tenuissimè triti, & à plumbo, & album.
scoria purgati unc. una & dimidia, cum olei an-
tiqui clari unc. tribus in mortario * lapideo
pistillo ferreo diu conquassetur & agitetur, * reo ho-
post igni lento coque, rudicula semper mouen-
do, donec lithargyrum crassescat: tunc igni au-
fer, ut paulatim frigescat, sine. Interim unc.
tres mucaginis ex semine lini, & semigræ-
ci & radice malue, extractæ parum seruesac,
deinde illam paulatim lithargyro & oleo pro-
bè pistillo ligneo permisce: postremò percoque
omnia simul ad iustam spissitudinem. Si vis itea-
tum

*Si puluerẽ tum facere, misce, aut oleum irinum pro com-
ireos mi- muni, aut pulueris ireos unciam unam in lib. sin-
sceas oleũ gulas, si addatur muccago, se. meliloti, anodynum
aliquot e- magis euadet.*

*tiam tum
miscendũ.*

Hodie sic paramus, sunt qui femina lini & fœnigræci purgata sordibus, & radicem maluæ mundam & contusam nonnulli tri- duo aqua macerant, super prunas clemen- tes, deinde semper mouendo coquunt ad di- midias, & colant. Eius colati libram vnã cum oleo aliquantisper coquunt, postea puluerem lithargyri miscent, & continen- ter rudicula mouentes coquunt, donec bul- las & stridorem edere desinat, seu donec marmori vel aquæ frigida infusa portiuncu- la & refrigerata idoneam habere consisten- tiam videatur.

Si lithargyros & oleum diligenter sint abluta, multò albius erit emplastrum. Ni- colao Alexandrino recipit olei veteris vnc. 42. lithargyri vnc. 36. radicis maluæ agrestis, & ibisci, fœnigræci, seminis lini ana vnc. 12. radices & semina in aquæ phialis tribus tri- duo infusas, igni lento coque ad dimidias, cola: expressi libram vnã cum oleo ali- quandiu coque, dein puluerem lithargyri quantum satis est incoque semper mouedo: dum percoctum erit, hoc est, dum vesiculas bull

bullare & subfidere videris aufer igni: dum
refruxerit, conde. Lithargyrum cum oleo vi-
di diu agitari in mortario metallico pistillo
ferreo, abluit: sed dum ignē attigit, nigrui-
t, maximē vt diachylo ineptissimū videretur.

Lithargyrum vbi in vas igni impositum
miseris, oleum paulatim affundatur, semper
miscendo pistillo ligneo vbi probē eiunt
mista, partem meliorem mucaginis affun-
de & coque, dum ea videbitur cōsumpta: re-
liquorum paulatim adice semper mouēdo.

Cum autem lithargyrum promptē vra-
tur motu per spatham ligneam latam assi-
duo est opus, qui eam a fundo vasis separet:
ignis prætereā sit blandus, & affundatur vt
dictum est, mucago.

Album autem fiet vt vulgò expetitur, si
mucago parū habeat se. sc̄nig. id enim lar-
gius flauum facit emplastrum, addunt non-
nulli. salem paucum initio extrahendæ muc-
caginis, vt clarior & albior sit. Lithargyros
item benē lota aqua cōmuni vel salia, albe-
dinē addit, & coctio mediocris. Nā multa
& vstioni propinqua flauitiem & ruborē &
nigrorem impartit. Si verò violēta est flam-
ma, etiam mox nigredinem dat lithargyro.

*Empl. diachylon magnum Mesuæ recipit li. Proportio
thargyri puri, trui & creti unc. 12. olei irini, lithargyri*

ad oleum anethini, chamamelini ana unc. octo, muccag.
 hic eadē, nis, seminis lini & sanigraci, & radicis althææ,
 quæ prius. & ficum pinguium & uuarum passarum, succi
 ireos, & scillæ, cæsypi, ichthyocolle ana drach.
 duodecim & semissem, terebinthinæ unc. tres, re
 sinæ, pini, ceræ flauæ ana unc. duas, compone ut
 diachylon commune.

*Ichthyocol
 la etiā pi
 scis est.*

Muccagines vt prius emulgeantur, oleo.
 quæ lithargyros in mortario vel vase in quo
 coquenda est diu ante coctionem nutriatur
 semper mouendo, deinde igni lēto coqua
 tur, dum crassescere incipit muccago paula
 tim affundatur, hac propē cōsumpta igni au
 feratur emplastrū, affundatur succus ireos &
 scillæ, & ichthyocolle glutinis muccago, cū
 vino et aqua simul mistis & coctis extracta.
 His consumptis coctū est emplastrū, & cera
 minutim secta & pini resina miscendæ his li
 quatis, terebinthina & cæsypus extra ignem
 miscenda, quia coctionem non sustinent.

Empl. de muccaginibus sparium recipit muc
 caginem, sem. lini & sanigraci, & althææ, & me
 diani corticis ulmi ana unc. quatuor & semis
 sem, olei, liliorum, anethi, chamameli ana unc.
 unam, Ammoniæ galbani, opopanacis, sagape
 ni ana unc. semissem, ceræ nouæ unc. uiginti, te
 rebinthinæ uncias duas, croci drachmas duas.

fac

fac emplastrum.

Muccagines vt dictum est extrahantur cor-
tice vlni medio benè prius cōtuso, eadem
oleis incoquendo consumantur, olea resi-
dendo purgentur, vel linteo sine expressio-
ne colentur: his calentibus cera particulatim
secta liquefiat, & liquores isti quatuor ace-
to * soluti, & linteo colati cerelæo calido
misceantur: postremò extra ignem terebin-
thina probeque omnia commisceantur, &
caue ne ingruos abeat. Crocus tritus ma-
iori inspergitur & manibus fingēdo mag-
dalias immiscetur.

* uel cha-
mameli
& melilo-
ti decocto.

Empl. de meliloto Mesuæ recipiunt, meliloti unc.
sex, flori chamæmeli, se. sanigræci, rad althææ,
absynthij, sampsuchi, baccarum lauri ana drach.
tres, cardamomi, cyperi, ireos, cassiæ, spicæ nar-
di, seminis apij, aneos, anisi ana drach. duas &
semissem, ammoniaci drach. decem, styracis, bdel-
lij ana drach. quinque, terebinthinæ unc. unam
& dimid. ficus pingues duodecim, sepi hircini, re-
sinæ ana unc. duas & semissem, ceræ unc. sex, olei
sampsuchini & de spica ana. q. sufficit insunden-
dis & extendendis omnibus.

Vt ana un-
ciam unā.

Sepum hirci colatum resina, cera in oleis
liquentur, ficus pingues aut parum humecta-
tæ probè tritæ per mantile, aut stamen, aut

cribrum setaceū cernantur, prædictis misceatur, deinde ammoniacum & bdellium in aceto soluta & colata, postea terebinthina, postremò ubi refrixerit, pulueres creti radicū, herbarum, florum, aromatum, & simul cum his styrax per se diligenter tritus. Si verò ficus essent pauciores, & puluis largior, nec is cernendus, possunt haminutim cōcisæ cum aliis teri, baccæ lauri excorticandæ. Sunt qui Ammoniacum & bdellium aqua (cui melilotus, chamæmelum, & fœnumgræcum sint incocta) dissolui malunt, ut emplastrū fiat emolliens magis: sed aqua illa ægrius soluuntur: quàm aceto essentiæ tenuitate promptius ipsa tota penetrante & dissolvente.

Empla- **Empl. ceroneū Nicolai recipit picis naualis**
strū cer- **colate, cere ana unc. duas, & drach. tres, sagape**
ma Nico- **ni unc. duas, ammoniaci, terebinthinae, colophonie,**
laus Ale- **croci, ana unc. unam, & drach. tres, aloës, thuris,**
xādrinus. **myrrhæ ana unc. unam, opopanax, styracis, gal-**
& primæ bani, mastiches, aluminis, sanigræci, styracis ru-
clasis dra **bri, bdellij ana drach. tres, litbargyri drach. unā**
ch. 7. 2. **& dimidiā, sagapenū, galbanum, opopanax, am-**
drac. 6. ter **moniacum fracta uel potius incisa uino testa no-**
tia. 4. **te macerentur: coquantur ad uini dimidij con-**
quartæ. 3. **sumptionem, colentur, tunc picem colatam mi-**
sce,

scē, spāihula moue, hac liquata ceram: qua fusa quintædu-
colophoniam colatā. postea styracem pistillo ca as & gal-
lido tritum frustatim adde: hinc mastichen, thus, banum, ex
myrrhā: bdellium, trita, creta aliquandiū post qua bdel-
lijce, terebinthinam, alumen, lithargyrum, scē- liū & con-
num græcum percoctum affunde in aquam frigi fitentem
dam, extracto aquam omni- in manibus exprime idest sty-
cum puluere, aloës super marmor oleo laurino riacem ru-
unctum subige, cum puluerato croco finge offas brā in sex
manibus eodem oleo unctis. tam sepa-

Sed Nicolaus Alexandrinus lithargyrū ret drach.
tenuissimè tritum, cum oleo quantum satis una utri-
est percoquit, deinde picem addit: hac liqua usque con-
ta, ceram, aqua fusa lachrymas colatas, am- teius ut li-
moniacum, sagapenum, opopanax, galba thargyri
num, styracem vtrunq; , terebinthinam, & drac. dimi-
spatula probè miscet. Hinc colophonie, thu dia.
ris, mastiches, bdellii, aluminis, myrrhæ, scē-
nigræci, puluerem paulatim miscet, vbi per-
coctum est, in aquam iniicit. Ceroma autem
propriè oleum quo luctaturi se perfundūt.

Hodie melius picem & colophoniam li-
quatam colant, ceram in ea liquant, sagape-
num, ammoniacum, galbanum, opopana-
cem, bdellium, vino soluta & collata co-
cta que ad vini propè totius consumptionē,
paulatim miscet, deinde terebinthinam,
postremò puluerem reliquorum tenuissimè

tritorum & cretorum, crocū verò inter subigendum super marmor & oleo manus vngunt, ne his emplastrum adhareat. Vel potius liquoribus, vt dixi, coctis particulatim miscetur cera, resina, colophonia liquata, vel cera particulatim iisdem miscetur: & hac fusa, reliqua duo liquata paulatim miscentur: sic enim citius & perfectius in corpus vnū coctunt. Si verò simul vel liquores ceræ, picis, colophonix, vel cōtrā liquoribus, etiam, picem colophoniam affatim iniicis, liquores fundum ob grauitatē petentes vrentur: & cū aquosi sint ægrius, aliis pinguibus summum leuitate sua petentibus miscbuntur: nisi fortè tandem iam vel vsti vel semivsti. Vide diligenter, ne aloë, & myrrha vrentur, & gruinolum reddant emplastrum.

Alii secreto quodam modo Ammoniacum, sagapenum, opopanax, galbanum, bdellium vino soluta, cocta ad emplastri consistentiam, terebinthina paulatim mista sine igni remolliunt, non modo in ceroneo hoc, sed etiam emplastro præcedenti de meliloto & aliis, deinde liquatam ceram cum pice & colophonia miscent, postremò reliqua.

Nico Ale *Empl. oxycroceum Nicolai recipit picis n-*
xā. in pri- *ualis, croci, colophonix, ceræ ana unc. quatuor,*

ter

terebinthine, galbani, ammoniaci, myrrhe, ma- ma classe
stiches, thuris ana unc. unam, & drach. tres: Gal unc. duode-
barum & ammoniacum aceto nocte una mace- cim, in se-
rentur, postridie liquantur igni, colantur, iterum cinda. 4.
coquuntur ad partis aceti consumptionem: addit aceti phia
tunc picem naualem colatam, hac fusa, ceram, lam unam
qua liquata colophoniam, deinde terebinthinam miscet.
aliquandiu post mastichen, thus, myrrham, sem-
per spatula mouendo. Cocta in aquam frigidam
immitte, manibus hanc totam exprime, super
marmor oleo inunctum cum puluere croci molli,
& offas finge.

Alii picem naualem colatam, colopho-
niam ceram liquant, his adhuc calidis galba-
num & ammoniacum in aceto dissoluta &
colata miscent. His coctis mastichen, thus,
myrrham, postremò terebinthinam, & ubi
iam refrixit manibus molleendo & subigen-
do super marmor, puluerem croci confun-
dunt: hyeme verò addi potest olei unc. una
ob emplastri siccitatem.

Nicolaus Alexandrinus picem cum par-
te aceti, in olla noua coquit ad aceti consum-
ptionem, cum reliqua ammoniacum, thus in
mortario terit & soluit, & coquit semper
mouendo, cauens ne acetum exiliat. Cum
acetum est consumptum, galbanum, myr-

ram, mastichen addit, his feruefactis crocum pulueratum miscet, deinde in mortarium fundit, & fingit magdaliones. Sed modi alii placent magis.

Oxycroceum vocatur ab aceto macerante, galbanum & ammoniacum & croco largiore. Nā eius vncias quatuor recipit, ceroneum verò tantum vnciam vnam & drachmas tres. In ceroneo præterea liquores vni no macerantur, cætera multum conueniunt, sed illud valentius, hoc propter crocum largiorem sumptu vilius, quem variè minuunt. Ob id vt vilius sit, croci vnc. tantum duas hodie miscent, dolo parum malo cum crocus vires medicamento maiores non largiatur, quam ceroneo, vt causa sit nulla, cur hic adeò augeatur sumptu parum necessario, nec viribus adeò æstimandis.

Empl. de Ianua Nicolai recipit succorum apij, plantaginis, betonica ana lib. unam: cera, picis, r. sin r, terebinthina ana lib. semissem, forma emplastrum.

In succis his reliqua tria sunt igni lento coquenda, & continenter mouenda ad succorum consumptionem, postremò terebinthina mista semel, aut bis feruefaciēda. Alii terebinthinae partem dictis simul incoquunt, reliquam extra ignem miscent, vt siccitate
ali

aliorum emēdent, sicq; formam emplastro meliorem impertiunt. Succos per se in sapas coquerem potius, deinde liquatis aliis misce rem. In neutro Nicolao inuenio hoc emplastrum, vt neq; tria sequentia: sed tantū ex his ceroneum, oxycroceū, apostolicum.

Empl. gratia dei Nicolao recipit, terebinthinae lib. semissem, resinae lib. unam, cerae unc. quatuor mastiches unc. unam, uerbenaē, pinpinellae, betonicae ana manipu. unum, herbae hae tuse ex uino albo ualenti coquantur, ad uini tertiae partis consumptionem, cola, herbarum substantiam abyce, in colato cera, resina, mastiche coquantur ad corporis idonei constitutionem, aufer igni, terebinthinā adde, spatula moue. fac emplastrū.

Herbae hae recentes incisae, tuse in vino albo potenti ad sui dissolutionem percoquantur, colentur, in colato vini reliquo cera & resina ad colati propē consumptionem coquantur: tūc mastichen adde, postremō terebinthinam, semel feruefac, aufer igni, ubi refrigit finge in offas cylindricas.

Alii in colato resinā solam coquunt: hoc propē consumpto ceram addunt, postremō terebinthinam extra ignem, & ubi refrigerari incipit, mastichen pulueratā permiscēt. Vterque hic modus, quā Nicolai est praestantior, quod mastiche coctionem non su-

stineat ob essentia tenuitatem.

Hodie ut sit albius, addita paulò largiore terebinthina trahunt modo penidiorum.

Empl. ad berniam Nicolao recipit picis naturalis, aloës ana uncias tres, lithargyri, ceræ rubræ, colophonie, galbani, ammoniaci, ana unc. duas. Vici à quercu uncias sex. Bolus armenia, utriusque symphyti, gypsi utriusque aristolochie, lumbricorum terræ, gallarum ana uncias quatuor, myrrhe, thuris ana uncias sex, terebinthinae unc. duas, sanguinis humani lib. unam. Pellis à ueruece mox ubi ablata est, horis. 24. coquatur, deinde expressa pelle & abiecta uiscum quernum in hoc iure diu coctum ubi fuerit, igni auferatur, addaturque terebinthina, lithargyros, colophonia, hinc mastiche, thus, myrrha, galbanum, ammoniacum, lumbrici terræ paulò post symphytum maius & minus, gypsum, bolus armenia: igni tunc redde, & adde sanguinem humanum, aristolochiam longam & rotundam, postremo aloën, semper spatula agitando, impone marmori, quod oleo uiolato inunxeris & manibus subige. Iterum biduo aut triduo in mortuario continenter teratur.

Aliud est In decocto prædicto pellis aretinæ recē-
Arnoldi ris visci bacca ad sui dissolutionem perco-
Villanoua ctæ, colando expressæ abiiciuntur, additur

lithargyros, aliquāto post *cera. pix, colophonia*, coquendo semper mouenda ne *vrantur*: coctis his, & aqua prope consumpta, *galbanum ammoniacum*, vino soluta & creta, *myrrha, terebinthina*, ab igne depositis, sed adhuc calentibus, thus *maftiche*, lumbrici in vino purgati & vino alio probè seorsum cocti. Tempore nimis durescit, nisi addatur oleum. Alii post colatum visciū extra ignē addunt ceram. *colophoniam terebinthinā*, aliquantò post iniiciunt liquores dissolutos, colatos, coctos, ut saepe dictū est. *Lithargyros, gypsum, thus, myrrha bolus armenia, sanguis humanus &c. teri habilia.*

Empl. diuinum Nicolai recipit *galbani, myrrhe ana unc. unam & drach. duas*, *ammoniacy uncias tres & drach. tres*, *opopanax, mastiches*, *aristoloch. longæ. æruginis ana unc. unam*, *lithargyri & olei communis ana lib. unam & semissem*, *cere nouæ unc. octo*, *thuris unc. unam & drach. unam*, *bdellij uncias duas*, *magnetis unc. tres*, misce omnia ut decet.

Lithargyrium cum oleo diu ante coctio * *Id quod*
nem nutriatur, postea ad spissitudinem usq; ei cito,
 * *coquatur: tunc adde ceram minutim con-* quia pau-
cisam: qua liquata aufer igni, & adde gal- cum est o-
banum, ammoniacum, opopanax, bdell- leum, acci-
liū, si molle est in aceto vel vino dissoluta dit.

&

& colata & cocta: deinde pulvis myrrhæ, bdellii, si est siccum, mastiches, thuris, aristolochiæ, magnetis: postremò ærugo, ne si diu coquatur, emplastrum fiat rubrum, sit tamen medicamentum adhuc valde calidum, alioqui, ob ipsius solidam duritiẽ ægre permiscerentur omnia. Si verò flauũ vis semistam æruginem impone, vel coquẽdo talem redde: si rubrũ (quale Narbonensis Gallia præfert) eius æruginis drach. duas, vel quatuor dum coqui cœpit lithargyros immitte, reliquas eius drach. in fine, si non vis ita coloratum, totam misce postremum.

Emplastri forma per coctionem fiunt hodie vnguentum tripharmacum, & vnguentum de cerusa.

Empl. apostolicum Nicolai recipit, lithargyri unc. sex, ceræ mauricæ, colophonice ana unc. duas, propoleos, uisci querni ana unc. unam, ammoniaci, cadmiæ lapidis ana drach. sex, masti-

** Prasij uiridis Nicotianæ, opopanax, galbani, myrrhæ, sarcocollæ, æris col. Alex. usti, squammæ æris, æruginis, dictamni, aristolochæ cetera cõchincæ rotundæ, * mumie ana drach. tres.*

sentit, nisi pōderibus omnibus uariaret. Lithargyrum & oleum diu simul nutrita, coquuntur, semper mouendo ad emplastri consistentiam, seu donec scutellæ imposita, ceræ, aut mellis modo coacta sint: tunc

cera, colophonia, mastiche, thus, myrrha, bdellium, propolis, viscum quernum, terebinthina in his quo scribuntur ordine liquetur. His fufis igni auferatur, adde paulatim: ne effeueant liquores, ammoniacum, opopanax, galbanum dissolutos aceto aut vino, colatos, coctos ad aceti aut vini consumptionē, vt dictum est recoque. deinde pulueres sarcocollæ, cadmiæ lapidosæ, æruginis, squammæ æris, æris vsti, dictāni, aristolochiæ, dum erit percoctum, hoc est aquæ frigidæ portione iniectum duratur, & digitos tractatu non inquinat glutinoso adhæsu, tunc totum aquæ frigidæ iniiciatur: dū refrixit, exemptum manibus, oleo laurino inunctis, fac magdalias. Nicolaus Alexādrinus lithargyro, cum oleo ad emplastrum consistentiam percocto, ceram, galbanum, terebinthinam, propolim, colophoniam seorsum, & modico interuallo addit: postea, æs vstū, cadmiā commiscet, probè semper feruefaciendo, deinde opopanax, ammoniacum, bdellium, viscum, myrrham, thus, mastichen, sarcocollam, squammam æris cum paucis aceto trita in mortario, & in lactis formā deducta miscet, & coquit ipatula certatim mouēdo.

Empl. de uigo recipit olei chamæmeli, anethi, de spica, de liliq ana unc. duas, adipis porci vitul,
an

ana lib. unam, euphorbij drach. quinque, iburis
drach. decem, olei laurini. fescunciam, adipis ui-
peræ unc. duas & semissem, ranas uiuentes sex,
lumbricorum in uino lotorum unc. tres & semis-
sem: succi radicum, ebuli & enulæ ana uncias
duas, schænuantibi, stachadis, matricariæ ana ma-
nip. unum, uini odoriferi lib. duas, coque omnia
simul ad uini consumptionem: coletur. colato ad-
de lithargyri quri lib. unam, terebinthinae claræ
unc. duas, cum cera alba, fiat ceratū, aut unguen-
tum, addendo in fine, styracis calamitæ fescunc-
ciam, & igni ablatum pistillo tribuletur, donec
tepidum erit, tunc adde argenti uui salina extin-
cti unc. quatuor, misce diu pistillo.

Hoc emplastrum ascripturus non eram,
quod argentum habeat uiuum à cuius usu
omnium maximè abhorreo, propter noxas.
à prioribus designatas, à recentioribus expe-
rientia quotidiana plusquam vellent cogni-
tas. Sed publica vtendi eius consuetudo, ne
omitterem effecit, accessit ad id Petri Gru-
sellii olim mihi in re medica condiscipuli,
nunc verò medici longè præstantissimi, elo-
gium de hoc emplastro à se non semel ma-
gnis successibus usurpato in articulorum &
reliquarum partium neruofarum doloribus
etiam hæreditariis, non solis Hispanā luem
cōcomitātibz in corporibus carnofis. Plu-

rà composita medicamēta describere, mihi
 visum nō est, quod etiam in his multa idem
 promittunt, & præstant, ob idq; ociosa vide-
 ri possint. Integrum autem cuius docto, vel
 noua adiciere, vel ex his quædam expunge-
 re, aut saltem mutare, vt simplicibus cōstet,
 vel pluribus, vel paucioribus, vel non idem
 pollentibus. Huc pertinet quod nullo nego-
 tiō quibus potest ex Mesue & Nicolao Ale-
 xandrino potius quā ex Salernitano quoties
 opus erit, aliā corrogare. Nobis hoc labore
 suffecit experiri quid hac in re aliquādo præ-
 stare poterimus. Quapropter paucis singu-
 la tantumque leuiter perstrinximus, cum
 plurima superaddere nobis licuisset, nisi vo-
 luissemus prolixitate auditorem detertere
 nouitium vel obruere. Est autem id totum
 velut imago quædam rudis tantum eorum
 quæ post scribemus: sed paulatim mihi phar-
 macopœi sunt melioribus assuefaciendi, vt
 postea non fugiāt maiora. Cū non igno-
 rem in horū facie plurimos omnino & indo-
 ctos, & rerū omnium imperitos, & stolidos,
 dicam audacius, & maleficos, & haud dubiè
 veneficos, qui hunc laborem nostrum accu-
 sabunt tanquam parū vtilem, imò noxium,
 scio calumniabuntur, quod hactenus mise-
 ris mortalibus ægris rectè esse consultum
 per Arabicæ familiæ placita plauè mentien-
 tur.

tur. Sed hi non ita multò post etiam inuiti intelligent quàm fuerit in hūc diem iniqua ipsorum conditio, & volent nō volent, sub nostra hæc præcepta cogentur, ne frugibus inuentis glandes defendere amplius illis liceat. Intereà verò quia nihil suibus his cum amaracino vnguento est, musis & purioris pharmacopœetices studiosis scribo id quātulum quantulum est: quod oro manu grata accipiant, & secum repetent, quam non fuerit facile rem hætenus intentatam excitasse. Id quod iudicare facillimum his est, qui scripta sua aliquando publicarunt multo studio, cura, industria, vigiliis, ingenii summis viribus comparata. Qui verò nihil adhuc ediderunt, ignari nostrorum laborū, ad calumnias sunt propensissimi, sed hæc seges ingratos tulit, & seret omnibus annis. Hisque ingratissimum seruire nephas est, vt est apud poëtas. Boni igitur consule: & fronte non ingrata sume lector candide nostrum hoc tirocinium, intereà dum huius medicinæ partis specimen apparamus, longè pulcherrimum, fecundissimum posteritatis memoria dignissimum.

F I N I S.

INDEX RERVM

NOTABILIVM, HV=

IVS OPERIS, NVNC

PRIMVM AD-

DITVS.

A



Cacia no-
stras qui-
bus rebus
constet

197

Acacia nostras quando
bona 74

Acetum album nigro
ualentius 71

Acetum scillinum 326

Acori radicū notæ 37

Adeps 94

Aegypto aquā nili tur
bidam uasis figulinis
crudis colari docet

Gal. 234

Aeromeli uel Mannæ
electio 72

Aerugo sincera 88

Aerugo citra coctionē
cerato mista empla-
strum facit uiridem
404

Aerugo 87

Aesustum ibidem

Affectibus hepatis pul-
uerata tenuiter de-
bentur 151

Tenuius lienis ibidem

Tenuissimè renum &
uesicæ affectibus ibidē

Agaricū quale sit oportet
38

Aloë optima 74

Aloë decocto aromatu
imbuta siccatur 179

Alumen scissile 150

Ambar describitur 84

*

INDEX.

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Ambra | 95 | Antidotus exhilarans |
| Anilum faciendi mo- | | Gale. adscripta 346 |
| dus | 177 | Antidotum catholicum |
| Ammoniacum | 78 | 348 |
| Ami | 55 | Antidotum diapheni- |
| Amomum describitur | | con Mesue 351 |
| ibidem | | Antidotum hamech a- |
| Amomum quale lauda- | | pud Mesuen 352 |
| tur | ibidem | Antidotum benedicta |
| Amygdale ut proben- | | Nicolai 314 |
| tur | 57 | Antidotum hiera dia- |
| Amygdale que impro- | | colocynthidos 355 |
| bantur | ibidem | Antidotum philonis |
| Anacardi notæ ibidem | | 356 |
| Anisum | 55 | Antidotum de baccis |
| Animalium partium | | lauri ibidem |
| tritura | 133 | Apozematum sectio |
| Animalium partes du- | | quarta 349 |
| re, usta, uel rasa, uel | | Apri dentes linandi |
| limata per se terun- | | 134 |
| tur | 136 | Lucij ibidem |
| Animal purgante me- | | Elephantis ibidem |
| dicamento de pastum | | Aquam uino mixtam |
| lac reddit pblemago- | | hederaceo uase extra |
| gum | 116 | bes ibidem |
| Antidotus di. i. bra Me- | | Aqua vini diu seruatur |
| sue | 345 | ¶ quare 247 |
| | | Aq |

INDEX.

| | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------|
| <i>Aquam Cicerum</i> secun- | <i>scriptio</i> | 58 |
| <i>dam cur capiamus in</i> | <i>Bdellium quid</i> | 83 |
| <i>Mesue dictū</i> 299 | <i>Quale eligendū ibi-</i> | |
| <i>Arborum fructus qui</i> | <i>dem</i> | |
| <i>fiant purgatrices</i> 114 | <i>Quomodo adultere-</i> | |
| <i>Aristolochiæ radices</i> | <i>tur</i> | <i>ibidem</i> |
| <i>quando legende, &</i> | <i>Bolus armenia.</i> | 93 |
| <i>quando effodiende.</i> | | |
| 39 | | |

| | |
|-----------------------------|-----|
| <i>Armenius lapis</i> | 91 |
| <i>Aromata</i> | 97 |
| <i>Aromata quedam qua</i> | |
| <i>industria humectes</i> | |
| <i>docet Mesues</i> | 181 |
| <i>Aromatizatio quid no</i> | |
| <i>bis uocatur</i> | 234 |
| <i>Aromatizatio ad quid</i> | |
| <i>ibidem &</i> | 236 |
| <i>Aromatizatio diuersa</i> | |
| <i>rum rerum</i> | 235 |
| <i>Arsenicum quid.</i> | 86 |

B

| | |
|----------------------------------|-----|
| B <i>Alaustium diu te</i> | |
| <i>ri debet</i> | 123 |
| <i>Balani myrepsicæ de-</i> | |

C

CAdmia fornaca-
ria 89

Cadmia lapis ibidem

Cadmia, lapis calami-
naris uulgo dicitur
ibidem

Eius usus ibidem

Calamus aromati. of-
ficinarum tametsi di-
uersus à uero cala-
mo aromati. easdem
habet uires 69

Calami aromatici de-
scriptio 40

Calefactionis scopi ua-
rii 175

inde ad longum.

INDEX.

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Calidas modicè damus | plenam trituram su- |
| positiones medicas 175 | stinet 148 |
| Calor moderatus co- | Centaurij magni radix |
| tionis autor esse po- | 40 |
| test 209 | Cera omnium facilli- |
| Calore mollescunt quæ | mè liquatur 173 |
| 171 | Ceræ bonæ notæ 72 |
| Cantharides 96 | Cerussa 89 |
| Cancrorum prepara- | Ceratum quid 391 |
| tio 115 | Ceratum Gale. refri- |
| Cancami 81 | gerans quæ recipiat |
| Caphura ibidem | 392 |
| Capparis flos ut in usũ | Ceratum santalatum |
| uenit 123 | Mesue ibidem |
| Carpobalsamum 60 | Ceratum Gal. stomachi |
| Cassia fistula ibidem | cum ibidem |
| Caryophyllum lauda- | Ceratum Gale. stoma- |
| tur quale 50 | chicum alterum 393 |
| Cardamomum ut opti- | Ceratum stomachicum |
| mum 56 | Galen. ex Nicolao |
| Cassutha ut lecta minus | ibidem |
| marcescat 52 | Chalcitis 88 |
| Cassie delectus 70 | Chalcanthum ibidem |
| Castorium 95 | Chaphura 138 |
| Centaurij parui flores | Chrysocolla 91 |
| 51 | Cinnamomi electio 69 |
| Centaurium paruum | Citrium & Arantium |

INDEX.

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------|--------|
| malum | 59 | ¶ inde ad longum | |
| Clarificatio quid ¶ | | Cottionis ¶ trituræ ra- | |
| quare fiat | 227 | tio propè est eadem | |
| Clementer friāda, quo | | 216 | |
| rum uirtus attritu uio | | Colatio cribationi est | |
| lento promptè exha- | | persimilis | 230 |
| lat | 143 | Colationis differentiæ | |
| Coagulum qui euadat | | ibidem | |
| efficacius | 114 | Colamus quædam citra | |
| Coccum gnidium | 60 | cottionem | 233 |
| Cottio medicamento- | | Colis tribus usi sunt ma- | |
| rū quomodo fiat | 208 | iores nostri | 231 |
| Humor cui incoquun- | | Eorum differentiæ ¶ | |
| tur ut plurimum aqua | | usus | ibidem |
| est | 194 | Colorationis causæ | |
| Cottionis aliquot exem- | | 236 | |
| pla | 211 | Coloratio multarū re- | |
| ¶ inde ad longum | | rum | 237 |
| Cottio non solum ignis | | Colocynthis ¶ centau- | |
| sed etiam solis calore | | rium plenam cottio- | |
| fit | 210 | nem tolerant | 218 |
| Cottionis instrumenta | | Quæ contra ibidem | |
| omnis generis sint ua- | | Colocynthis quomodo te- | |
| sa | 213 | ratur | 138 |
| Cottionis finis | 214 | Colocynthydis medulla | |
| Cottio diuersarum re- | | 59 | |
| rum | 215 ¶ 216 | Colocynthis septembri | |

INDEX.

| | | | |
|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| legitur | 79 | Conditura quarum re- | |
| Colo magnitudine et | | rum fit | 249 |
| textura mediocri uti | | Et quibus rebus fiat | |
| mur in presentia | 232 | ibidem & | 250 |
| Colocynthis accuratis- | | Condienda quomodo | |
| fine debet teri | 148 | cōdiantur | 250 & 251 |
| Colore iudicantur me- | | Coni optimi | 58 |
| dicamenta | 4 | Coquimus medicamen | |
| Colorum differentie | | ta cur | 211 |
| ibidem | | Conseruationem nihil | |
| Conditura multarum | | tam uiciat quam pu- | |
| rerum | 299 & 300 | tresactio | 243 |
| & 301, 302, 303, | | Cortex radicum asari | |
| 304 | | | 42 |
| Conditura seminum & | | Corticum delectus | 69 |
| aliorum quorundam | | Corallus lapis | 92 |
| 304 & 305, & 306, | | Corticum tritura | 131 |
| & 307 | | Costus | 41 |
| Conditorum sectio pri- | | Crassum quid | 13 |
| ma | 296 | Cribrationis ratio ea- | |
| Confricationis usus ua- | | dem est quæ triturae | |
| rius | 194 | | 160 |
| Confricatio rerum in- | | Cribrationis differen- | |
| fusarum aut etiam | | tiae multæ | 161 |
| coctarum colationem | | inde ad longum | |
| & expressionem ad- | | Crocus optimus | 51 |
| iuuat | 192 | Crocum nouo quodāmo | |
| | | do | |

INDEX.

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| doterunt | 139 | da | 206 |
| Cuminum unde bonum | 55 | Destillatio quid ibi- | |
| Cupressi pilulæ | 59 | dem | |
| Cnici semen | 56 | Destillata uapore a- | |
| Cucumeris agrestis fru- | | quæ calentis uires & | |
| ctus | 60 | qualitates integrius | |
| Cubebe | ibidem | retinent | 207 |
| Cydonia | 59 | Destillantur quæ plum | |
| Cyanis. | 91 | bo omnino improban | |
| | | da | ibidem |
| | | Despumatio quid | 223 |
| | | Detergens quid | 14 |
| | | Diamorū quousque co- | |
| | | quamus | 215 |
| | | Diaphænicon antido. | |
| | | Mes. | 351 |
| | | Diaprunū simplex Ni | |
| | | colai | 349 |
| | | Diasatyrium | 297 |
| | | Dictamni uires & de- | |
| | | scriptio | 41 |
| | | Dissolutio quid | 165 |
| | | Dissolutio tritura quæ | |
| | | dam esse uidetur | |
| | | 165 | |
| | | Dissolutionis cause mul | |
| | | te | ibidem |

INDEX.

| | | | |
|--|---------|---------------------------------------|-----|
| Diffolutionis plurimæ differentiæ | 167 | Elegmatum sectio ter- tia | 337 |
| Inde ad longum | | Elegmatum materiæ | |
| Doronici radix qua- lis | 41 | ibidem | |
| Dracunculi radix quæ dolegenda | ibidem | Electariorum tracta- tio | 340 |
| Duratio mollitioni cõ- traria & in quibus sit nobis in usu | 171 | Electarium diacnicum | 357 |
| Quibus fiat | ibidem. | Electarium de succo ro- sarum | 358 |
| | | Elect. diarbodon abba- tis Nicolai | 359 |

E

| | | | |
|---|--------|------------------------------------|--------|
| Laterij notæ ex quo petendæ | 75 | Emplastrum ad her- mam | 426 |
| Electarium aromati- cum rosarum Gabrie- lis apud Mesuen | 360 | Emplastrum diuinum Nicolai | 427 |
| Elect. diamargariton frigidum | ibidem | Emplastrum apostoli- con Nicol. | 428 |
| Electa. diatrionfanta- lon | 361 | Emplastrum de Vigo | 429 |
| Elect. diatragacanton frigidum | ibidem | Emplastrum quid | 394 |
| Elect. diairis simplex Mesuæ | 362 | In emplastra quæ re- cipiantur | ibidem |
| | | Emplastrum, album quo | |

INDEX.

| | |
|----------------------|--------------------------|
| quomodo fiat 404 | quid reuera sit ibidē |
| 405 | Eryngij radice condi- |
| Emplastra, quæ reci- | tum 296 |
| piunt ladanum non e- | Et quomodo esse opor- |
| gent cera 412 | teat antequam con- |
| Emplastrorum coctio- | diatur ibidem |
| nis finis 414 | Esulæ minoris radice |
| Emplastrum diachylon | electio 42 |
| 415 | Euphorbij electio 77 |
| Emplastrū diachylon | Euphorbiū Nouitijs in |
| magnum Mesuæ 417 | festum 140 |
| Emplastrum de mucca | Extinctio cur fiat 268 |
| ginibus spurium 418 | et 269 |
| Emplastrum de meli- | Expressio quid 191 |
| loto Mesuæ 419 | Expressionis diuersima |
| Emplastrum ceroneum | di ibidem et 192 |
| Nicolai 420 | Extractio succorū tri- |
| Emplastrum oxycro- | tura constat et ex- |
| ceum 422 | pressionē. 196 |
| Cur oxycroceum uo- | |
| cetur 424 | |
| Emplastrum de ianua | |
| Nicolai ibidem | |
| Epithymum Barbarum | F Artura conditu- |
| quæ lectum minus ci- | ra quedam dif- |
| tò marcescat 52 | ferentia est 291 |
| Epithymū Græcorum | Et quando fiat ibi- |
| | dem |

INDEX.

| | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|
| Figura ad medicamen | rendus | 123 |
| ti delectū maximè ne | Florum nullus coctionē | |
| cessaria | 5 recipit | 219 |
| Ficus passæ habentur | Flos capparis ut in u- | |
| præstantissime | 61 sum uenit | 123 |
| Eorum descriptio ibi | Fornacaria cadmia | 89 |
| dem | Forma medicamento- | |
| Ficus uitiosæ quæ | 62 rum | 239 |
| Fistula cassiæ | 60 Friabile quid | 14 |
| Florum delectus | 49 Frixio ferè in sartagi- | |
| Flores centaurij par- | ne fieri intelligitur | |
| ui | 51 254 | |
| Flores ubi reponantur | Et quomodo res mul- | |
| 39 | tæ frigantur ibidem | |
| Flores quando legendi | et 255. et 257 | |
| 49 | Frigendi modus | 256 |
| Flos balaustium | 50 Fructuosæ herbæ dum | |
| Flos nymphææ | 52 sunt semina prægnan- | |
| Flores uix per annum | tia, demetende | 30 |
| seruari possunt | 54 Fructuum delectus | 56 |
| Flores quomodo per an- | Fructus externi præ- | |
| nium seruantur | 248 stantiores habentur | |
| Flores siccati parū diu | ibidem | |
| terendi | 122 Fructuum cōmunes no- | |
| Florum multorum no- | te | 58 |
| mina | ibidem Fructus immaturi ad | |
| Flos camomille diu te- | maiolem astringenti- | |
| | clib | |

INDEX.

| | | | |
|------------------------|------|--------------------|----|
| clibano siccatur | 180 | ptimus ex Creta | 75 |
| Fruetus Syrupis conue- | | Græne quid | 13 |
| nientes | 309 | Gummium delectus | 80 |
| Flores ibidem & | 310. | Gummi oleæ Aethyo- | |

pice 81

Damnatur quale ibi.

Gummi iuniperi ibi-

dem

Gypsum. 90

G

G Alla quæ lauda-

tur 62

Galanga quid 43

Galbanum 78

Gal. docet, Aegypto a-

quam Nili turbidam

uasus figulinis crudis co-

lari 234

Gallus ad ius purgato-

rium 96

Gallinacius quando bo-

ni sit succi 116

Gelatina quæ fiat 205

Gentiana 43

Glandulæ mammarum

quando meliores 114

Glycyrrhiza 43

Glycyrrhiza parū diu

coquenda 218

Glycyrrhizæ succus o-

H

H Elleborus albus

qualis 41

Helleborus niger 42

Hæmatites 92

Hermodactylus qualis

probetur 44

Herbarum delectus 47

Herbarum plurimæ ui-

rides in usum recipiū

tur ibidem

Herbæ quando legen-

dæ 48

Herbæ quæ nec florem

nec semen edunt quan-

do colligendæ ibidem

Her

INDEX.

| | |
|---|--|
| Herbæ nūc uirides nūc siccæ teruntur 121 | Infundimus medica- menta quare ibidem |
| Herbæ antè secandæ aut frangendæ, quam terendæ ibid. m. | Infunduntur potissi- mum hodie purgan- tia medicamenta ibi dem |
| Herbarum radices quâ siccenitur 178 | Et humor cui insun- duntur maximè ua- rius est ibidem |
| Herbæ quot annis sunt mutandæ 247 | Infusio purgantium me- dicamentorum diuer- simoda 183 & inde ad longum |
| Herbæ ad syrupos pro- priæ 309 | Ignis alimenta coctio- ne sint sicca & odora 210 |
| Hepar ficatum 116 | Iris qualis optima 44 |
| Hirci præparatio ad calculos comminuen- dos 115 | Iuiubæ 62 |
| Hiera picra Galeni 355 | Iulepus rosatus 308 |
| Hypocistis qualis 75 | Iulepus uiolatus ibi- dem |
| Hyssopus colligēda Me- sue quando 52 | Iulepus clarus & pur- gatus sacchari uice præstantissimum est in Syrup. 312 |
| I nsusio humecta- tioni proxima 181 | Italicas plantas, & cre- ticas ad thiriacam & ali |
| Infusionis tempus ua- rium 182 | |

INDEX.

alia medicamēta præ
ponit Galenus. 32 Et post ad longum

L

L Achrymæ mul-
tū siccate frian-
do per se, aut cum a-
lijs excepta, pulueran-
tur 130

Lac uaccae, capræ &
asine 73

Ladanum quale proba-
tur 75

Lapis iudaicus 92

Lapides pretiosi sæli-
cius puluerantur su-
per lapidem 144

Lauatio purgationis
species 276

Lauantur quæ, quæ
promptè liquantur
277

Et multarum medi-
camentorum laua-
tio diuersa ibidem

Leue quid 13

Lentum quid in solidis
corporibus 14

Lentum quid in hu-
midis corporibus ibi-
dem

Lignorum tritura 131

Ligna quantum radi-
ces teri postulant ibi-
dem

Lignum Gaiaci 67

Agallochum ibidem

Ligusticum unde lau-
datur 55

Lignorum delectus 67

Liquatio quid 172
& quæ modico, &
quæ multo calore li-
quantur ibidem

Liquationis necessitas
magna est 173

Liquis medicamen-
tis uasa, quæ conue-
niant 31

Liquores solum colo-
pur

INDEX.

| | | | |
|--|-----|--|--------|
| purgantur post dissolutionem | 226 | Eorum differentia & usus | ibidem |
| Liquorum delectus | 75 | Mammarum glandulae | |
| Liquores, qui in emplastra recipiuntur | | quando meliores | 114 |
| 396, 397, 398, 399, & 400 | | Malum punicum | 63 |
| Liquores & gummi semper in fine emplastris miscantur | 402 | Malaxare quid vulgo significet | 171 |
| Lycium facienda modus | 193 | Mastiche laudatissima quae | 79 |
| Lythargiros oxaleo nutritur | 90 | Deterior | ibidem |
| Lythargiri usus in emplastris duplex | 406 | Medicamenta quaedam quomodo excipiantur seu ut vulgo incorporantur | 238 |
| Lythargiros. | 86 | Medicamenta reponenda quantum opus est sint sicca oportet | 244 |
| | | Medicamentorum varia repositio | ibidem |
| | | & 245 & 246 | |
| M Acis quomodo esse debeat | 70 | Medicamenta simplicia quare & quibus rebus humectentur | 180 |
| Magnes | 92 | Medicamenta composita | |
| Maiores nostri tribus usucolis | 231 | sita | 181 |
| | | Medicamenta quaedam quo | |

INDEX.

| | |
|--|--|
| quomodo confricen- tur 193 194 & 195 | agrè separantur sunt ualenter tundenda ibidem |
| Medicamenta compo- ta hodiè uariè nobis seruantur 249 | Medicamenta per se te- renda quæ 135 |
| Medicamenta proban- tur sapore 3. & sapo- rum nomina ibidem | Medicamenta quædam tam sunt friabilia ut etiam digitis attrita leuigentur 146 |
| Medicamentorum sim- plicium delectus sumen- dus à situ, & loco, & regione 7 | Quædam multū dur- que terenda sunt ibi- dem |
| Medicamentorum sim- plicium delectus unde sumendus 12 | Medicamentorum sim- plicium nomina 99 inde ad longiori |
| Medicamenta præpa- rare quid 112 | Medulla 94 |
| Medicamentorum sim- plicium tritura 117 | Mel sit uerni aut æsti- ui non hybernium 72 |
| Vt teruntur ibidem | Mel ab Anacardis ex- trahi potest 202 |
| Medicamentorum te- rendarum diuersi mo- di 119 | Mel aqua dupla despu- matur si alius humor non exprimitur 224 |
| Medicamenta, quæ ob duritiem, crassitiem, lentorem, densitatem | Mel sæpè per se expu- matur 225 |
| | Mellis optimi notæ 72 |
| | Metallica aërè cali- do |

INDEX.

| | | | |
|--|-----|--|--------|
| do non igne nutriun- tur | 190 | Myrobalanorum præ- paratio secundum Me- suen | 189 |
| Metallica sæpe humo- re aliquo nutriuntur | | Myrrha quid, qualis bona, & qualis peßi- ma | 82 |
| ibidem | | Myrobalanos multum tenuiter conteri iubet | |
| Metallica facilius pul- uerantur super lapi- dem | 144 | Mesues | 125 |
| Metallicorum & ter- reorum tritura | 132 | Myrobalani citrine | 57 |
| Metallica & lapides ubilibet probè seruan- tur si sordem & pulue- rem vitabis | 248 | Inde | 58 |
| Metallicorum & ter- reorum delectus | 86 | Cepulæ | ibidem |
| Mineralia per se fe- rè & seorsum terun- tur | 155 | Emblicæ | ibidem |
| | | Bellericæ | ibidem |
| | | Myrti bacca | 63 |
| | | Myxæ descriptio. ibid. | |

N

| | | | |
|---|-----|---|----|
| Misy | 88 | N ardi spicæ fa- cultas & de- scriptio | 45 |
| Mollitio solutioni & li- quationi proxima | 170 | | |
| Moschus | 95 | Nimphæam colligen- di tempus & quæ ser- uanda | 52 |
| Muccago ex gummis frequenter extrahi- tur | 204 | Nitrum | 90 |
| Mumia Serapionisibi. | | | |

Nut

INDEX.

| | | |
|-------------------------|--------|------------------------|
| Nutritio infusionis spe | dem | |
| cies. | 188 | Oleum ouorum 380 |
| | | Oleum iuniperi ibi- |
| | | dem |
| | | Olea ex animalibus fa- |
| | | cienda uiua ipsa ani- |
| | | malia recipiunt 381 |
| O Cra | 92 | Oleum rosatum ibi- |
| Odere proban- | | dem |
| tur medicamenta & | | Oleum melinum 382 |
| odorum nomina | 3 | Oleum mastichinum |
| Oesypus | 95 | ibidem |
| Officium pharmaco- | | Oleum myrtinum ibi- |
| pæi | 8 | dem |
| Olei boni præcipua si- | | Oleum nardinum 383 |
| gna | 71 | Oleum costinum ibi- |
| Oleum uirgo præstan- | | dem |
| tissimum | ibidem | Oleum rutaceum ibi- |
| Oleum omphacinum | | dem |
| ibidem | | Oleum Euphorbij ibi- |
| Oleum lauando minus | | dem |
| est uerberandum | 278 | Oleum castorij Nico- |
| Oleorum genera qua- | | lai 384 |
| tuor | 378 | Oleum uulpinum Me- |
| Oleum amygdalarum | | sue ibidem |
| dulcium & amara | | Oleum lumbricorum |
| rum | 379 | |
| Oleum laurinum | ibi- | |

INDEX.

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| ibidem | Oximellis simplicis cō- |
| Oleum hyeme largius | positio 326 |
| miscetur emplastris | Oxinel Scillinum ibi- |
| quam æstate 409 | dem |
| Oliuæ halmades, seu co- | Oxisaccharum. 327 |
| lymbades præstantio | |
| res 64 | P |
| Opiantes & rha & ri- | P Artium animalium |
| bes quando leguntur | tritura 133 |
| ibidem | Partium ab animalibus |
| Opium quale lauda- | sumptarum dele- |
| tur 76 | ctus 93 |
| Opium cum alijs siccio | Pharmacopæo non li- |
| ribus particulatim in | cet uti quid pro quo |
| iectum comminuitur | (dicto) absque medici |
| 129 | consilio 109 |
| Et cum humidioribus | Pilularum tractatio |
| dissoluitur ibidem | 362 |
| Opobalsamum 76 | Quare fuerunt inuen- |
| Opopanax optimus ibi- | te ibidem & 363 |
| dem | Pilule aureæ Nicolai |
| Et qualis improba- | 366 |
| tur 77 | Pilule coctiæ rasis & |
| Opos quid 75 | Mesue 367 |
| Optima Aloë 74 | Pilule sine quibus esse |
| Opus cyreniacus 75 | nol |

INDEX.

| | | | |
|------------------------|--------|--------------------------|--------|
| nolo | ibidem | Pilula beccicae Me- | |
| Pilula rha barbari | sua | ibidem | |
| 368 | | Pilula albae | 374 |
| Pilula aromatica Me | | Piper longum | 64 |
| sua | 369 | Piper album & nigrum | |
| Pilula lucis maiores | ibidem | | |
| Mesua | 370 | Pistacia | ibidem |
| Pilula satida maiores | | Plantae itale cretici | |
| Mesua | ibidem | non multum cedunt | |
| Pilulae de hermodacti- | | 47 | |
| lis | 371 | Plantarum radices quae | |
| Pilula arthritica Ni- | | diutius terenda | 120 |
| colai | ibidem | Plantarum partes cum | |
| Pilula fumarica Aui- | | saccharo propè pari | |
| cennae | ibidem | coquuntur, in syru- | |
| Pilula asseieret Aui- | | pum | 311 |
| cennae | 372 | Plantae calidae in locis | |
| Pilula ex agaric. Me- | | calidis ualētiores eu- | |
| sua | ibidem | dunt | 24 |
| Pilula ex hiera | 373 | Præhumide locis siccio- | |
| Pilula mastichina Cö- | | ribus castigantur ibi. | |
| siliatoris | ibidem | Polypody uim & descri- | |
| Pilula stomachica Me | | prio | 45 |
| sua | ibidem | Præparatio cæcerum | |
| Pilula russæ seu com- | | 115 | |
| munes | 373 | Præparationum plu- | |

INDEX.

rium simul multæ dif-
ferentiæ, 289, 290,
291, 292, 293

Prunapassa uel acida
65

et quæ magis ad al-
uum subducenda sint
eligenda ibidem

Psyllium quale elegit
Mesues 56

Psyllij succus quali-
ter extrahi debeat
203

Purgantia 97

Purgatio ad quid 271
et rerum diuersarum
purgatio qualiter fiat
ibidem et 272

Putrefactio coctioni
simillima est 252

Quomodo multæ pu-
træfiant res 253

Pyrethri uim et descri-
ptio 45

Q

Q Valitatum ta-
etricum nomi-
na, quid medico signi-
ficent. 13

R

R Adices quæ per
se et quæ cum
alijs teri possunt 120

Quæ diutius teren-
dæ ibidem

Quæ parum diu te-
runiur 121

Radices multæ diu ser-
uari possunt 247

Et quomodo seruan-
tur 248

Radices Raphani qua-
liter præparandæ ut
condiantur 298

Radices quæ Syrupo-
rum compositionem
ingrediuntur 308

Radices quando legen-
dæ 33

De

INDEX.

| | | | |
|--|--------|-----------|---|
| De hac re opiniones diuerſe | ibidem | 217 & 218 | Diu coqui oportet |
| Quæ citius & quæ tardius legantur | ibidem | | Rha barbarum cum amigdalis facilius teritur |
| Radices quæ longius ſeruantur | 35 | | Rha barbarum curioſè terendum |
| Radices quæ diu non ſeruantur | ibidem | | Rha pontici notæ |
| Radices exoticæ ut diliguntur | 37 | | Rha indicum |
| Radicum Beben optimæ notæ | 39 | | Rosæ ut teruntur |
| Radix Bryoniæ | 40 | | Rosæ præſtantiſſimæ quæ |
| Raphanum ut facimus purgatricem | 113 | | & ubi ſiccandæ ibidem |
| Rarum quid | 13 | | Rosarum quas præſeruat Meſues |
| Refrigeramus omnia calore præparata priuſquâ reponamus | 176 | | Rosæ quæ parum diu ſeruantur |
| Repoſitio medicamentorum | 243 | | Rosæ ſiccandi modus |
| Reſinarum delectus | 79 | | 177 |
| Rha barbarum & myrobalaños quando eſt conſilium aſtringere | | | Et in umbra ſiccare eſſet optatiuſ ibidem |
| | | | |
| | | | S |
| | | | Acchariũ quale præſtantiſſimum |

INDEX.

| | | | |
|----------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Sagapenum | 78 | Scammonium unde de- | |
| Sal fossitius seu sal gem- | | feratur & quale bo- | |
| ma | 91 | num | 79 |
| Sal armeniacus | ibi- | Schœnanthum ex Ara- | |
| dem | | bia rarissimè ad nos | |
| Sandaracha arsenico | | defertur | 53 |
| affinis | 86 | Scilla bona qualis | 46 |
| Sanguis hirci | 93 | Scilla ut siccetur | 176 |
| Sanguis draconis | ibi- | Scillæ succus optimè ex | |
| dem | | trahitur diebus qua- | |
| Santalum citrinum in- | | draginta caniculari- | |
| uentis rarum | 69 | bus | 199 |
| Santalum album peßi- | | Scoria quid | 87 |
| munr | ibidem | Semina matura deli- | |
| Santalum rubrum me- | | gantur | 54 |
| dium bonitate | ibi- | Semina diu reposita ui- | |
| dem | | res habent imbecillio- | |
| Saparum & Syrupo- | | res | 55 |
| rum sectio secunda | | Semina propè uniuersa | |
| 307 | | sa medio inter radi- | |
| Sapa quæ nobis para- | | ces & herbas puluera- | |
| tur | 308 | ri desiderant | 124 |
| Sarcocolla lacte mulie- | | Semimum multarum no- | |
| bri nutritur | 188 | mina | ibidem |
| Scammonium exactè tē- | | Semina terēdi modi di- | |
| rendum | 148 | uersi | 125 |
| | | Sem | |

INDEX.

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Semina syruporū com- | rum, in genere pro- |
| positioni decētia 309 | pinguo sumitur ali- |
| Succi 310 | quando 22 |
| Semina purgantur cor- | Aliquando in genere |
| tice 272 | diuerso ibidem |
| Semina utilius & in- | Spuma nitri 90 |
| nocentius ubi seruan- | Squamina aeris qualis |
| tur 30 | laudatur 87 |
| Senne folliculo præci- | Stæchas exotica est ex |
| puè uimur & què esse | Creta melior 53 |
| debeat 65 | Stæchas citrîa quid |
| Synapi alexandrinum | Dioscoridi, & quid |
| 55 | Galenouocetur 54 |
| Sericum crudum, inci- | Et ubi præstantissima |
| sum facîle teritur | nascatur ibidem |
| 139 | Stercus pueri ad angi- |
| Serum lactis 94 | nam idoneum 116 |
| Seseli Masiliense, Ae- | Stomachica crassius te |
| thiopicum creticum | renda 153 |
| Diosco. laudatur 55 | Styrax 83 |
| Siccatio quid 176 | Quomodo adultera- |
| Sigillatio inter præpa- | tur 84 |
| rationis differentiis nu- | Succi constantes & cor |
| meranda est 241 | pulenti recentes in |
| Similitudo & dissimi- | emplastra ueniunt |
| litudo medicamento- | 396 |

INDEX.

| | |
|---|---|
| Succi sicciiores ut rarius sic liquores, Gummi, resinæ, metallica, frequentissimè in emplastra recipiuntur ibidem | Eius notæ 90 |
| Succinum quid 84 | Syruporum materia omnis est à plantis 308 |
| Succorum & aliarum plantæ partium tritura 127 | Syrupi quo in uase coquantur 313 |
| Succorum delectus 71 | Syrupi ad iustam consistentiam coquuntur ibidem |
| Succus Glicyrrhizæ & hypocistis & lycium pistillo calfacto sic catur & friatur 129 | Syruporum compositio 315 |
| Succorum extractio tritura & expressione constat 196 | Syrupi coquuntur in quo uis uase 319 |
| Succus ex omnibus ferè folijs uirentibus per se tritis exprimi potest 196 | Syrupus rosatus qui paratur 320 |
| Suffitus quibus confectur 270 | Syrupus uiolatus ibidem |
| Sulfur unum est optimum 89 | Syrupus ex cidonijs ibidem |
| | Syrupus de granatis 321 |
| | Syrupos compositos faciendi modus 322 |
| | Syrupus saporis de pomis ibidem |
| | Syrupus portulacæ ibidem |

Syr

INDEX.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Syrupus Adiantinus | Nicolao florentino. |
| ibidem | 335 |
| Syrupus Ziziphorum | |
| 323 | |
| Syrupus papaueris ibi- | |
| dem | |
| Syrupus acetatus 324. | |
| Syrupus acetatus cum | |
| radicibus 325 | |
| Syrupus Bizātinus ibi- | |
| dem | |
| Syrup. de quinque radi- | |
| cibus ibidem | |
| Syrup. Absynthij 327 | |
| Syrup. menthæ 328 | |
| Syrupus Epithymi 329 | |
| Syrup. stæchados 330 | |
| Syrupus Glycyrrhizæ | |
| ibidem | |
| Syrup. Hyssopi 331 | |
| Syrupus prassij 332 | |
| Syrupus intybi ibidem | |
| Syrup. arthemisiæ 333 | |
| Syrup. Cichorij ex Gu- | |
| lielmo placētino 334 | |
| Syrupus Cichorij ex | |

T

| | |
|------------------------|--|
| T Amaricis cor- | |
| tex unde esse | |
| debeat 70 | |
| Tempus in medicamen- | |
| to deligendo multi- | |
| plex obseruandum est. | |
| 28 | |
| Tenue quid 13 | |
| Terreorij delectus 86 | |
| Terebinthina resina | |
| 79 | |
| Hodie unde adueha- | |
| tur ibidem | |
| Terendi modi 117 | |
| 118 | |
| Tblasti 55 | |
| Thamarindi 64 | |
| Thuris cortex 71 | |
| Thus quid 85 | |
| Thuris manna ibi- | |
| dem | |


INDEX.

| | | |
|---------------------------|---------------------------|-----|
| Tragacantha ibidem | lata | 377 |
| Thus persæpe miscetur | Trocischi de Succino | |
| emplastris 401 | Mesue ibidem | |
| Thymelææ folia ace- | Turbith qualis laude- | |
| to nutriuntur 190 | tur arabibus. 46 | |
| Trociscus quid & cur | | |
| hoc nomine appella- | V | |
| tus abundè in sectio- | | |
| ne. 7. Mesue dictum | V Iperæ quando ca- | |
| 374 | piendæ 115 | |
| Trocischi de Gallia mo- | Vnguis odoratus 96 | |
| schata Mesue ibidè | Vniones seu margari- | |
| Trocischi de Gallia mo- | ta describuntur 97 | |
| schata Nicolai Ale- | Vuarum passarum quæ | |
| xandrini 375 | præstantiores 66 | |
| Trocischi aliptæ mo- | Et damascenarû quæ | |
| schatæ ibidem | eligendæ ibidem | |
| Trocischi aliptæ mo- | Corinthiæ ibidem | |
| schatæ Nicolai ibid. | Vrendi modus non est | |
| Trocischi de Myrrha | omnibus unus 259 | |
| Nicol. 376 | Vrendi modi diuersi | |
| Trocischi de agarico | 260 & 261 & inde | |
| Mesue ibidem | ad longum | |
| Trocischi de spodio ibi- | Vstio assationis finitima | |
| dem 410 | 257 | |
| Trocischi de terra sigil- | Vstionis causæ multæ | |
| | 258 | |

INDEX.

| | |
|-----------------------------------|--|
| 258 & 259 | macum Mesue ibidē |
| Vnguentum unde dictum 384 | Vnguentum apostolorum & unde dictum. 390 |
| Vnguentorum materiae quae 385 | |
| Vnguēta quō fiāt ibi. | X |
| Vnguentum aureū Mesue 386 | X Ylobalsamum recens probatur 69 |
| Vnguentum pompholygos ibidem | X αλΩ quid significet. 196 |
| Vnguentum basilicum 387 | |
| Vnguentum egyptiacum Mesue ibidem | Z |
| Vnguentum album rasis ibidem | Z Edoaria radix cuius emula 47 |
| Vnguentum desiccatum 388 | Zingiberis radicis nota 46 |
| Vnguentum enulatum ibidem | Zingiber quale damnetur. ibidem |
| Vnguentum populeum 389 | |
| Vnguentum triphar- | F I N I S. |

Lugduni,
EXCVDEBANT
PHILIBERTVS ROLLETVS,
ET BARTHOLOMAEVS
FRAENVS,
IMPENSIS HONESTIS-
SIMORVM VIRORVM
GVIELMI ROVIL-
LII, ET ANTONII
CONSTAN-
TINI.







m

